

草木圖說前篇

草部

二

植

數冊 冊號 觀番

二 一 八

學校 縣中 滋賀

470.3

植

470.3

537

Vol 2

彦立校

草木園說前篇卷二目錄

中章

第三綱 三雄蓋

第一章

一雄蓋

カノコザウ

ハナシヤウブ

ハナアヤメ

子チアヤメ

シヤガ

ヒアフギ

知母

ミヅマツバ

イ千ハツ

カキツバタ

コカキツバタ

ヒアフギアヤメ

ヒメシヤガ

水仙アヤメ

イボクサ



第三目 三雄蓋

トクダメ

スブダ

第四綱 齊頭四雄蓋

第一目 一雄蓋

ヲトコヘシ

キンレイクハ

タウ、チサウ

オホバコ

ヤクラオホバコ

サバ、イオホバコ

ヤツマ、タオホバコ 二目

ザクロサウ

同一種

ラミナヘシ

ワレモカウ

蘭產地榆

同白山産

チヤホオホバコ

タウオホバコ

ニクニクハ

ハシカクサ

マツムシサウ

カハラケツノイ

ゴゼンタチバナ

カナヒキサウ

漁羊藿

梅花イカリ

フタリシツカ

ミツトラノオ

ヒシ

ツルアリトラシ

蔓様百部根

フタバモグラ

アカ子水仙

子ムリグサ

ナベワリ

マヒヅルサウ

イカリサウ

チヤラン

ヒトリシツカ

ミツユキノシタ

小葉ヒシ

百部根

ヒンボカツラ

本草綱目

卷之四

目録

三雄蓋

一雄蓋

二目

クハエンサウ

キクムケラ

同一種

同一種

キヌタサウ

カハラマツバ

ハナイカリ

第三目 三雄蓋

ツルムラサキ

イトモ

エビモ

以上七十四種

ムグラ

ヨツバムグラ

アカ子

クルマバサウ

大葉キヌタサウ

子コノメ

ヒルムシロ

サ、モ

草木圖說前篇卷二

大垣 慈齋 飯沼長順著



第一編

草部

第三編 三雄蓋

トリアンドリア

カノコサウ

ハルオミナメシ

伊吹山中多ク自生ス。莖高二尺餘條道アリ。披針狀ニノ鋸齒アル數葉鱗様ヲナシテ對生シ。春莖稍細亞ヲ對生スルヲ數層。各重メヲ分チ略繖狀ヲナシテ花アリ。每節針狀葉アツテ護之。ソノ花各二箇一葶ニアリ。甲落テ乙漸開ク形漏斗様ニメ五裂大サ一分餘水紅色。實礎ニノ圓尖内ニ一子ヲ収メ。一柱長ク瓣上ニ出頭纒ニ三裂。雄蕊亦長ノ白葯。根ニ佳香アリ生時ハ恰モ井松ノ香ニ似タリ。故ニ舊俗和ノ井松ト稱ス。一種草稍小ニノ常種ノ如ク簇生セズ行根ノビテ芽ヲ出スモノアリレハ第五種レリアナ。フヒシナリス。ウイルテ。ハレリアーン。蘭

按林氏ハレリアナノ類ヲ舉ルヲ二十種ニメ。ソノ殊功ヲ稱スルハ專ラ此種ニアリ。ソノ用名物考詳之。阿須氏所圖ノ此種アツテハ。莖葉共ニ毛茸アルモノ。如クナレトモ。林氏ソノヲ不説。且西勃氏本邦所産ノ種尤佳品ナルヲ云ヘ

草木圖考卷之二十



人家多栽テ花ヲ玩ブ。葉劍狀ニメ脊ナク數片痛列シ長一尺餘形蝴蝶草ニ似テ光澤ナク色淡緑。三四月葉間莖ヲ抽ク一亦一尺餘。多ハ一葉アツテ岐ヲナシ毎頂數片ノ苞アツテ花ヲ出ス。大抵三花甲萎テ乙次之。初頭ハ梗ナク終末ナルハ短梗ヲ見ル。花大小六瓣。大瓣ハ展開微ク垂レ。形燕子花^{カキツバタ}ニ似テ幅更ニ濶ク色淡紫碧ニメ紫點アリ。瓣心ノ本ニ剪裁毛様ノ裂片アリ。白質紫點。小瓣ハ卵圓ニノ上ニ立キ色同ノ紫點少ク毛様裂片ナシ。又白花或淡黃褐色ノ品アリ。實礎橢圓ニメ一柱粗ノ三裂半ニ至ル。末端ニ尖頭齒刻アツテ略花瓣ノ如ク色亦同ク。花心ニアツテ小瓣ノ間ニ開ク。三雄蓋柱背ニ沿ヒ灰白色ノ長葯アリ。圖在燕子花下可照見 實熟ノ鈍三角三區ニメ内ニ薄片子ヲ多ク蓄フ。根橫行結節多毛味辛ク口舌ヲ刺戟ス内外用共ニ功アリ。此類花實根形率^子前説ノ如シ。故ニ已下ノ諸種ニハタゞソノ殊態ヲ舉ルノレ

第三種 イリス。ケルマニカ。 雁 トイッゼ。イリス。 蘭




ハナシヤウフ

葉狭長劔脊アツテ白莖ノ葉ニ似テ夏花アリ。莖高ク葉上ニ出ツ。大瓣ハ鷲尾ノ大
 瓣ノ如クニノ毛様片ナク。小瓣ハ燕子花ノ小瓣ノ如クナレトモ稍短ク圓頭ニノ
 立ツ。兩葎ノ形燕子花ニ同シ。故ニ略之。此品花色ノ種々アル不暇毎舉。ソノ伊勢ニ

テ種殖スルモノハ尤美ナリ。一種山中ニ自生スルモノア
 リ之ヲドンドバナト云。葉劔脊アツテ家殖ノ品ト同シケ
 レトモ花小ニノ不堪觀

イリス。シビリカ 羅。シビリセ イリス 蘭



カキツバタ 燕子花

水澤池中ニ生シ人家亦多ク栽ユ。草鳶尾ヨリ大ニ葉長二三尺。夏莖ヲ抽キ花ヲ放ク。大抵葉ヨリハ低シ。大瓣鳶尾ヨリ狹ノ長ク小瓣亦小ニノ長シ。柱頭瓣端扁圓ニメニ片。色總テ紫碧ヲ常トス。又白色紅色翠碧色白質紫斑アル等種々アリ。根イチハツト同シケレドモ味彼ノ如ク峻ナラス。

按イリスノ一種ナレトモ的當ノ種名未詳。或ハ林氏所謂ワレテルイリスノ一種ニ可收乎。



五
三編一頁
カキツバタ

ハナアマノ 略ノアマメ 或云漢蓀

人家多栽ニ。葉燕子花葉ニ似テ狭小。高一二尺直上シテ不垂。花莖短ノ枝ナク頭ニ
二三花ヲ放ク。形燕子花ノ如ナレトモ小。外瓣扁圓ニシテ長カラス。色紫碧ヲ常トス
又白色ナルアリ。瓣爪蜜槽部稍長ノ毛様裂片ナク。黄褐及暗紫色ノ條點アリテ鳶
尾燕子花等ト同シカラス。内瓣ヒ様柱頭ニ尖ナルヲ鳶尾ノ柱頭ノ如ク。實礎ノ形
似類ノ常套ニ外ナラス。根形ハ稍小ニシテ味又峻ナラズ。一種カマヤマシヤウフト
稱スルハ。葉狭ク色粉白ヲ帯ヒ花莖高ク葉上ニ出花稍大ニシテ色尤深シ。又チヤホ
アマメト稱スルハ形小ナリ。ソノ種ニモ亦形ノ大小花色ノ不同等ノ種々アリ

イリス。フルシコロル。羅

ボンドブルーミゲ。イリス 蘭

春氏
研定



コカキツバタ

葉直上高五七寸花黄色一種淡紫花ニノ葉微ヨレテ馬蘭ノ態アルアリ。共ニ微ノ
劔脊アツテカキツバタト不同。亦アヤメノ種属ニ係ル



第十二

トシタノアツカキツバタ

葉ノ尖リ白ク葉裏色ハ淡紫ニシテ葉ノ縁ニ微カク鋸トシテ葉ノ長ハ四五寸ノ長ク葉ノ幅ハ約一
寸ノ長ク葉ノ縁ニ微カク鋸トシテ葉ノ長ハ四五寸ノ長ク葉ノ幅ハ約一

本草若葉縁カク鋸トシテ葉ノ長ハ四五寸ノ長ク葉ノ幅ハ約一

・モナアマン



ヒアフキアヤメ

葉イサハ尾ハシ又ハ射干ノ葉ノ如シ。中心花莖ヲ抽テ二三尺ニ及ビ。數枝ニ分レ毎頭二花ヲ放ク。外瓣并ニ兩蓋ノ形ハ。アヤメノ花ニ同フノ色微ク淡シ。特リ内瓣ニアツテハ大ニ不同。至テ小ニテ殆トナキが如ク。只長三四分ノ針狀ニシテ黄褐色。本ニ黄色ニ紫條アル箭羽狀ノ細瓣アルノミ。今附ニ倍圖示其狀。根味微苦ヲ帶テ亦刺戟ス。按亦イリスノ一種ニ可収而ノ種名未詳



イリスノ一種ニ可収而ノ種名未詳

イリスノ一種ニ可収而ノ種名未詳

ヒメシヤカ

草狀コカキツバタニ似テ差大ニ。花莖高く立テ枝ヲ分チ花ヲ著ルノ形弁ニ花瓣
 潤ノ頭ニ一陷缺アル等ハ。蝴蝶花ノ態アリ。故ニソノ名アリ。花ニ淡紫色ト白色ト
 ノ二種アリ。又吾邦北山ニ産スル者ハ葉末微垂ル。共ニ根味頗ル峻ニノ刺戟ス


第十二種

イリス。シビリカ。羅。シビリセ。イリス。蘭 西勃氏
 所定

按林氏所載ノ形狀ヲ闡ルニ的當ナラズ姑ク存疑



平林在哉



ヒアフキ 射干

山中ニ自生シ家園亦多栽テ花ヲ賞ス。花色黄赤ヲ常トス。或ハ鮮黄淡黄或ハ淡紅
 等アリ。又矮生又葉形ニ種々アリ。形状象所通知故ニ一々セズ。花無萼六瓣裸子室
 ニメ一柱頭三出筒様ニメロ三裂シ裏ニ軟細モアリ。雄蕊三莖葯黄赤色。附柱郭大

第六種
 イキシア。シ子シス。羅
 シ子ーセ。イキシア。蘭
 モレア。シ子ーシス。春氏

水仙アヤマ

十餘年前舶來シ漫ニレリーナルシスノ名ヲ傳フ。蓋シ舌人ノ誤認ニ出ツ決シテ其類ニ非ス。世人又水仙アヤマト稱ス。根橢圓ニメ芋塊ノ如ク。葉ハ恰モアヤメノ葉ノ如ク中心一道尤モ著クメ微劔脊ヲナス。寒地ニアツテモ纔ニ霜雪ヲ防ケバ冬尚不凋。春抽莖二尺餘數葉ヲ互生シ十餘花ヲ以テ片側總ヲナス。每花間ツテ五六分其間少ク捩テ不直。苞萼二片内者小ニメ二尖。外者大ニメ三尖。萼膜様ニメ薄ク。花鐘様六裂大サ一寸餘。色淡黄ニメ紫褐ノ條脉アリ。實礎橢圓ニメ三稜一柱頭三裂扁片ニメ微反シ。雄蕊三莖。長葯紫黑色ニメ黄粉ヲ吐キ柱頭下ニ立ツ。

イキシア。セクニダ。羅。エーインサーヂケ。イキシア、蘭

按林氏所說ノ花色ニアツテハ嫌アルカ如クナレトモ。形狀些異ナレ故ニ不容疑




水仙アヤマ
三十一
五本

知母 通名

啓蒙詳説アリ可見花六瓣長披針狀ニメ纒ニ哆テ正開セズ。色灰白淡紫碧ノ條重
アリ。雄蕊三莖内瓣ニ出テ扁莖ニメ黄緑葯アリ。實礎柯子狀三縱道アリ頸一柱
ナス。一種白花ノ品アリシ

按三綱一目ニ可收品ニノ所屬未考



三綱一目

十四

平林在藏

イボクサ 水竹葉

草状啓蒙ニ詳説アリ。萼三片花亦三瓣。白色ニメ淡紅紫暈アリ。實礎鑷状口纒ニ味
キ淡黄白色。三雄蕊葯丁字様ニメ色青ク條道アリ。雄蕊ノ間ニ莖短小ニメ頭ニ淡
紫色ノ圓帽アル蜜菌ニ。又實礎ノ下ニ白色ノ纖長毛アリ。附郭大圖示其諸事

所屬未詳



天馬木精

一、此全圖示其花ニハ花葉皆門扉大圖特示事



草狀啓蒙ニ詳説アリ。花大小四瓣卵圓ニノ無萼白色。中心兩性蓋ヲ積簇シ穂狀ノ一柱ヲナス。分之ハ柯子狀ノ實礎三頭ニ分レ。每頭一柱反捲レ。三莖ノ黃葯アル雄蓋コレヲ圍ムニ成ル。蓋シソノ花瓣ナルモノハ。一種ノ苞ニノ。中心ノ一柱ニ無瓣ノ多花滿布シテ穂狀ヲナスモノナリ。一種重瓣花ナルアリ。鈍披針狀白色ノ多瓣織敷シ。本大末漸小ニノ頗ル穂形ヲナス。檢之一瓣毎ニ實礎兩蓋ヲ具シテ。他ノ重復花ト其趣ヲ異ニス

ホユトトユイニア。コルタタ、春氏

按春氏ハ十三綱ニ収ム今移入于此



スブタ

水田中ニ生ス。莖高二三寸葉狹長ニノ尖。質軟脆ウナギモノ葉ノ如クノ多葉莖ニ
 互生ス。初秋葉腋ヨリ二寸許ノ纖細梗ヲ出シ頂ニ一花ヲ開ク。萼鈍披針狀三葉。花
 狹長三瓣白色。雌蕊一莖三裂殆ト三莖ノ如クノ白色長メ恰モ瓣ノ如シ。雄蕊三莖
 纖細葯長ノ黄色。實礎ハ梗本葶葉ノ中ニアルヲ。クロモニ於ルガ如シ。按ニ此梗ハ
 ニシテ、昔常ノ
 花梗ニ非ス

附花瓣兩莖葶梗籜等郭大圖

所屬未考



水田中ニ生ス。莖高二三寸葉狹長ニノ尖。質軟脆ウナギモノ葉ノ如クノ多葉莖ニ
 互生ス。初秋葉腋ヨリ二寸許ノ纖細梗ヲ出シ頂ニ一花ヲ開ク。萼鈍披針狀三葉。花
 狹長三瓣白色。雌蕊一莖三裂殆ト三莖ノ如クノ白色長メ恰モ瓣ノ如シ。雄蕊三莖
 纖細葯長ノ黄色。實礎ハ梗本葶葉ノ中ニアルヲ。クロモニ於ルガ如シ。按ニ此梗ハ
 ニシテ、昔常ノ
 花梗ニ非ス

第四編

齊頭四雄蕊

テトランドリア。

ヲトコヘシ

敗醬

啓蒙形状ヲ畧説ス可見。惣テファミナヘシヨリ大ニノ莖四五尺ニ及セ。花鐘狀五裂。白色喉ニ白毛アリ。其五裂中ニ裂ハ差小ニノ一雌蕊柱ツテソノニ小裂ノ上ニ出。頭菌様雄蕊四ニノ葯淡黄色。實硬楕圓ニノ稜。鱗形苞莖アツテ擁之。

ハレリアナ。ヒルロサア、 春氏

パトリニア。ヒルロサア、 西勃氏



ヲミナヘシ 敗醬

啓蒙形状畧説アリ可見。生殖部ノ形オトコメシト一般ニナレ只瓣蓋黄色ナルノ
ミ。一種黄色差淡ナルアリ。オトコメシノ条可併見

ハトリニア。ルベストリス、 西物氏



三十二

キノレイクハ

白山ヲミナヘシ

地花菜

加州白山勢州菟野山等ニ産ス。莖高一尺餘。長柄葉ヲ對生ス形畧山カヘデノ如ク
 五岐或ハ三岐ニノ粗鋸齒アリ。五月梢頭ニ細黃花攢簇スルノ狀殆トヲミナヘシ
 ノ如シ。故ニソノ名アレ。花シミナヘシノ類ニアラズ。花鐘様五裂ニノ卵圓。萼亦鐘
 狀鋸口ニノ不裂。花筒萼ニ接スルノ處ヨリ萼ト並ビテ距ヲ出シ長サ萼ノ如シ實
 礎萼ノ中ニ藏レ。一柱頭菌狀。四雄蕊ニノ短葯共ニ黃色。附郭大圖示花筒爲距狀

所屬未考



ニ合ヤリナリハ... 花筒ニ出マキ... 不裂イハ
 萼四葉亦モ... 花筒ノ長サ... 距ノ長サ
 花筒ノ中ニ藏レ... 一柱頭菌狀... 四雄蕊
 附郭大圖示花筒爲距狀

啓蒙形状ヲ詳説ス可見其種不一根ニ横延アリ直行アリ草ニ大小花穂ニ長短又殆ト圓ノ毬形ナレアリ。色ニ紅白粉紅暗紅。又花候ニ早晚アリ。葉狀亦從テ小異同アレ氏。概ルニ萼二片或ハ之ヲ苞ト見花辨ヲ萼トスルモ可又別ニ萼葉ニ似タル一小片アツテ之ヲ護シ。花楕圓四弁。阿須氏ハ一實稜裸ニノ楕圓四稜弁下ニアリ。林亦圓ノ一柱。頭ニ細粒ヲ滿布ス。雄蕊四莖ニノ短葯色花色ニヨツテ不一。其多種ナル不暇每舉。今野生秋花アル尋常ノ一種ヲ圖ノ概標ヲ示ス 附一全花 二實稜并柱。萼。萼葉等共

郭大圖

第一種

サンクイソルバ。ラヒシナリス。 雜 ゲウアイン。ソルペンコロイド。蘭

楕形卵圓者

サンクイソルバ。第二種

メヂアス。羅。ミッテルスラケ。ソルペンコロイド。蘭

楕形軸圓者

サンクイソルバ。第三種

カナデンシス。羅。ゴローテ。ソルペンコロイド。蘭

楕形尤長者

ゴローテ又井ルデ。野生

ピムピチルレ。鐸氏 野生者

按往脱牙船

ケレイ子又タムメ。園生

ピムピチルレ。同上 園生者

按往脱牙船

按西洋亦多種ナレドモ。林氏ハ楕形ヲ以テ三種ヲ掲ク。鐸氏ハ大小ヲ以テ二種ニ分ツ。ミナソノ概略ニ出テ子細ニ不及トス。



タウ、チサウ

白山産地榆

草長大ナラザレドモ葉大ニノ幅廣ク。面深綠色背帶白。花穂長三四寸許雄蕊長ノ粉紅可愛蝦夷亦此種ヲ産スレ。凡蝦夷産ハ花本ヨリ開キ。白山産ハ末ヨリ開テ本ニ至ル。共ニ春花ヲ放キ花四弁白質淡暗紫色ヲ帶ビ。雄蕊長ノ淡紅約黃褐色。實礎楮圓ニノ白毛アリ一柱頭毛毬椽」 附全花郭大圖

按此種生殖諸部前條種ト一般ナレ。凡。莖長クノ美觀ナル一殊態アリ。林氏說中如是ノ品ヲ載セザレドモ。亦ソノ第三種ノ中ニカ、ル



三十五
草木在表

蘭種地榆

舶來種ニノ普クピンピ子ルレノ名ヲ傳フ。草常種ノ地榆ヨリ稍小ニノ高二尺許、葉亦小ニノ色綠白タウ、チサウノ葉色ノ如シ。夏初花アリ球楕圓弁萼ノ形常種ト一般ニノ。實礎麥粒狀二顆並接シ。常種ハ各頭柱ヲナシ頭織裂糸ノ如ク。初メ白色後漸ク紅變シ。多雄蕊 常種ハ五蕊 莖糸ノ如ク色紅ニノ葯黃色。一穗ノ中小小花ヲ交ユ。ソノ大者ハ穗ノ下邊ニアツテ僅ニ五六花ニノ雄蕊尤長ノ垂下シ。恰モタウ、チサウノ雄蕊ノ如ク。雌柱ハ小花ノ柱ヨリ短小ニノ頭毛亦小。大花ノ上穗末ニ及アマデミナ小花ニノ。ソノ形大花ト同ノ殆トソノ半ニノ雌柱及テ大ニ。頭毛亦長シ。ソノ小花ハ多クハ雄蕊ヲ不具。間マ亦具スルモノアレトモ大花ノ雄蕊ニ不及ト遠クノ僅ニ花心ニ立ツ。蓋シ此種雌雄異花ナルモノ、如クオレ也。熟實ノ際ニ至ツテ大花ノ實礎亦大ニノ小花ノ實ト異ナラザレバ。取テ雄花ト斷シ難シ。之ヲ下地シテ苗ヲ生ルヤ否ニ在ツテハ未試。殆期後日之檢。附一大花 二小花 三花弁見實礎步萼 四實礎並柱共郭大圖

按鐸氏ノ引レイ子又タムメ。ピムピ子ルレノ圖全此種ニ當ル。又云此種綱目共ニ地榆ニ不同レ也。他ノ形狀ソノ種ニ不外ヲ以テコ、ニ併セ收ム。



卷之二
四
目
六
三

才ホバコ 車前

隨處普ク生ズル者ハ。葉橢圓ニメ鋸齒ナク往々微鋸齒アリモノアリ。毛茸ナク花莖圓ノ一長
 穂ヲナシ。夏花アリ萼卵圓四片筒様ヲナシ一鱗葉アツテ護之。花漏斗狀ニメ五裂
 尖外反シ色白ノ微黃褐ヲ帶ヒ。實硬卵圓一柱ニメ短刺毛アリ。雄蕊四莖纖細長ク
 瓣上ニ立葯白色淡紫暈アリ。地ニヨツテ草ニ大小形狀ニ不同アリ。三井寺産ナル
 ハ熟テ常種ニ同メ只小。纒ニ二三寸ニ不過

第一種 フランタコ。マヨル羅。ゴローテ。ウエーフブレー蘭

名義ニヨレバ主トメ
 大葉品ヲサス如シ

按林氏第一種ノ下ニ。本邦普通ノ品大葉品多穂品等ヲ併説シテ別ニ種名ヲ分
 ス。蓋其大小不一トモ。概ルニ葉橢圓ニメ無毛花莖圓ノ長穂ナルト同一般ナ
 ルニヨル乎。其他十九種ヲ掲ク。本邦ニ於テモ品種少トセズ。今余ガ所見ノ十許
 種ヲ列擧ス。ゾノ中西人ノ種名ニ的當ナルモノアラン。未タ参考ノ暇ヲ得ス姑
 ク期他日

開花筒見實硬兩莖郭大圖



全花郭大圖



白山産車前

葉常種ヨリ微ク狭長ニノ尖リテ。微毛アリ。邊緣疎ニ微鋸齒アツテ脈五縱道ヲナス。夏花莖ヲ抽クテ五六寸線條アツテ不圓。疎ニ花ヲ綴テ穂ヲナス。辨莖ノ形常種ト同ノ雄蕊尤長シ。蝦夷地所産ノ品亦略本条ニ同シケレバ。根葉好テ地ニ塌レモ充多ク草稍大ナリ



開花時葉姿兩葉併大圖



全株時大圖



白山産車前
葉常種ヨリ微ク狭長ニノ尖リテ。微毛アリ。邊緣疎ニ微鋸齒アツテ脈五縱道ヲナス。夏花莖ヲ抽クテ五六寸線條アツテ不圓。疎ニ花ヲ綴テ穂ヲナス。辨莖ノ形常種ト同ノ雄蕊尤長シ。蝦夷地所産ノ品亦略本条ニ同シケレバ。根葉好テ地ニ塌レモ充多ク草稍大ナリ

ヤグラオホバコ

葉形略常種ト同シケレ。凡時々小缺刻ヲ交ヘ花莖五六寸。梢ニ至テ圓尖ノ小葉ヲ
 散布鱗次シ穂狀ヲナス。寸餘。每葉腋一花ヲ出ス萼瓣莖等ノ形惣テ常種ト一般
 ナリ。又穂下ノ二三葉ハ稍大ナルヲ交ユルコトアリ。又莖頭ニ頗ル大ナル數葉ヲ散
 布密莖シテ一層ヲナシ。葉腋細莖ヲ抽テ上ニ小葉鱗次ノ穂ヲナシ花ヲ出ス。亦
 アリ



ナヤボオホバコ

草高數寸ニ不超。葉潤短殆ト圓ク質トウオホバコノ如ク七縱道アツテ尤厚ク。面
 凸凹不平邊縁不齊ノ缺刻アリ。初夏花アリ。莖繞ニ葉上ニ出花密葇穂ヲナス。寸
 餘瓣萼ノ形色常種ト同ク。只雄蕊莖短ク柱尤短粗ナルノ異アリ。附郭大圖示子室
 柱形



文ニ書キ中略此花ヲ根ナクシテ...

ナヤボオホバコ

サバイオホバコ

此品自生ノ地ヲ不聞。或云尾州某氏ノ園中ニアツテ初テ得之ト。或然シ。柄葉大ニ
ノ短ク。葉多クハ中筋ノ一方ニツキ或ハ刻缺或ハ分裂。縁邊或ハ雲頭或ハ鋸葉ア
ツテ一様ナラス。全葉直立セズ横ニ螺轉シ。中心ヨリ次葉ヲ出ス。亦多クハ共ニ相
轉シ相重リ。恰モ螺殼ノ態ヲナス。其狀尤奇ナリ。故ニサバイヲバコノ名アリ。中夏
花莖ヲ抽^キ長穂ヲナシテ花アリ。生殖部常種ト異ナリ。又徃々全ク常種ト一般ナル葉
ヲ交ユ西書中如此品ヲ載ルヲ見ズ蓋常種ノ變生ニ係ル



トウオホバコ

形状常種ト同シフシテ大ニ葉長一尺ニ起ヘ花莖二三尺ニ至ル。生殖諸部ニアツ
テハ全ク同シ



Handwritten text in the left margin, including the characters 'トウオホバコ' and other illegible characters.

ヤツマタオホバコ

草狀大葉種ノ如ノ稍小穂

亦相似

テタツ

十數岐ヲ

ナスノミ



ノミハ新ノ新葉種ノ如クハ

新ノ「ノ」ノ内ノ種ノ正種ノ如クハ

ノミハ新ノ新葉種ノ如クハ

新ノ種

新ノ種ノ如クハ

新ノ種ノ如クハ

新ノ種ノ如クハ

新ノ種ノ如クハ

新ノ種ノ如クハ

新ノ種ノ如クハ

新ノ種ノ如クハ



ニチニチクワ 馬來紅

春實生シ。莖高一二尺。帶微紅色。葉蓼藍葉ニ似テ對生シ。葉間枝ヲ出シ。夏各梢葉腋ニ一花或ハ二花ヲ出ス。萼鐘樣ニノ針狀五尖。花細筒樣長一寸餘。色淡黃綠。白筒末瓣下ニアツテ四ノ隆起アリ。即裏面葯ノツク處ニ當ル。筒上五裂殆五瓣。本狹細末扁大面淡紅紫色。背白色。實礎麥粒狀二顆併合シ。一柱長ク花喉下ニ至ル。頭立五ノ狀ノ如ク下ニ膜樣ノ短筒アツテ。ソノ狀奇ニノ他花ニアツテ未見所トス。喉中四葯アリテ淡黃粉ヲ吐ク。花後細莢ヲ結ブ。アラセイトウノ莢ニ似テ小。又白花アリ生殖部ニ於テ異ナレ

第四種

ヒンカ。ロセア。羅 ローセコレユリダ。マーグテパルム 蘭

按ニ「ヒンカ」ハ林氏五綱一目ノ品。日々花ハ一柱四葯ナレバ。雄蕊ノ數符合セザレバ。他ノ形狀些異ナケレバ不容疑



ハレカクサ

藪陰路傍ニ生ス。莖軟ニノ塌地節々亦鬚根ヲ下シ漸ク起立ス。葉對生形卵圓ニノ尖兩葉相對ルノ間ニ三五針狀ノ托葉アリ。葉脈ニ枝又ハ花ヲ著ク。無梗ニノ萼鐘狀四出。花亦鐘狀ニノ四裂白色。實稜莖ニ藏レ。一柱頭白粉ヲ撒ス。四雄蕊筒ニ出約淡藤花色實熟シテ萼不脫。子室二區ニノ細黒子ヲ收ム。附全花并半熟實郭大圖

所属未考



小大圖

ナツメヤシ・ユクサニク
 單莖
 コウキ




フタバモグラ

夏田圃ノ間ニ生ス。莖高四五寸或七八寸。葉狹長濶一分許長一寸許對生。葉腋短梗細花ヲ開ク。萼圓ノ四出。花鐘狀四裂白色或尖ニ微紅暈アリ。實礎半萼ニ藏レ。一柱ニメニ裂雄蕊四ニメ。葯淡黃褐色。子室二區各一子ヲ收ム。一全花 二半熟實共

草種
チラチア。ヒルギニカ。羅

ヒルキニセ。テウス。フロンク。蘭



ハ其同類ニ小ノ種有テ...

林ノハ...

...



...

...

...



...

マツムレサウ リンボウヤク 山蘿蔔

救荒本草落蒙草狀ヲ略説ス可見。花周邊ト中心ト瓣形不同ル。苜蓿類ノ態アリ。然トモ缺筒完筒ノ状ニアラス。周邊花ハ大ニシテ差唇狀ヲナシ。上唇小ニシテ一缺。下唇大ノ三裂殆三瓣ノ如ク。中者尤長ク色淡紫。塞心ハ小ニシテ筒様四裂色淡ノ殆ト白色。性々ニ裂大ニ裂小ナル者。惣萼披針狀ニシテ十數葉。各萼ハ鐘様ニシテ上縁齒尖。實礎萼中ニ藏レテ一柱。雄蕊四葯紫褐色白粉ヲ吐。花後實ヲ成ス。數十顆聚ツテ圓長毬狀ヲナス。每顆頂五尖起アツテ。尖上紫色ノ刺毛ヲ立ツレ

第十八種

スカビラサ。アトロプルプリア 羅 スワルトパールス。スグルフトコロイド 蘭
 林氏ハ花色暗赤ト云ヘバ。吾種ノ淡紫ト不同トモ。幾尼法氏卯葉圖モ的當ナレバ。其同種タルヲ昭然タリ



半熟實郭大圖

周邊花塞心花基本分圖

三十七

弘化年間舶來シ「ボスメ」或ハ「ヒツキ」ノ名ヲ傳レトモ。余未詳出處。襲根略水仙ノ根ノ如シテ外皮紅色ナルヲ以テ。花戸アカ子水仙ノ名ヲ下ス。草形恰大葉ノ仙茅ニ似テ差大。五月蒨葉ノ本ヨリ一莖ヲ出ス。一尺許。稍ニ梗ヲ出ス。三處。ソノ處ニ短葉アツテソノ本ヲ以テ梗ヲ包ミ。每梗上苞アツテ一花ヲ出ス。一射于蝴蝶花ノ類ノ如シ。花大サ一寸許白色六瓣略日々花ノ如ノ小。實礎圓長數縱道アリ苞中ニ藏レ。一柱四分シ少ク反レ。四雄葇莖短粗ニメ深黄色ノ長葯アリ。北花朝ニ蕾ヲ見シ申時前ニ至テ初テ放キ黄昏即チ萎ム。盛開ノ間一時ニ不過花時ノ尤短ナル者トス。一日ヲ間メ更ニ又花アリ。連々五六ニ至ル

ホユトトイニア。カーペニス 羅 カープセ。ホユトトイニア、蘭

按此種本喜望峯草ニノ。林氏モタゞ一見ノ圖說ヲナスヲ以テ猶精密ナルニ至レドモ。アカ子水仙ヲ云ニ不外如シ




實礎兩蓋郭大圖

カハラケツノイ 山扁豆

原野ニ多ク生シ。莖葉合崩オケテニ似テ苗短小ニノ剛ク。莖實シテ高尺許ニノ婆婆タリ。
 夏秋ノ際葉腋ニ有梗花ヲ著ク。萼披針狀四葉。花楕圓ノ五瓣向側シテ正開セス。實
 礎圓長頸延テ莢ニ臨ム。雄蕊四。莖短ク莢管様淡黄粉ヲ吐ク。花後扁莢子ヲナシ内
 ニ褐色ノ細豆ヲ收ム。合崩オケテノ莢ノ長大ニノ粒々膨起シ横ニ折ル、ニ異ナリ。本邦
 ノ俗。或ハ此草ヲ種藝シ。葉ヲ採テ茶ニ代ルコトアリ。故ニ之ヲ子ムチヤト名クシ

所屬未考



兩莖實礎郭大圖

百品考載之可見、ソノ晩ニアツテ葉ヲ合シ。又觸之レハ直ニ併合垂下スルヲ以テ、世人普ク子ムリグサノ稱アリ。夏草ニシテ肥地ニ生スレバ、莖頗ル剛ク高ニ尺ニ及フ。脚葉間又枝ヲ出シ有柄葉ヲ互生ス。柄長ニ寸許、頂ニ蟠椽ノ四葉ヲ手指椽ニ相對ス。二蟠二十余ノ小葉ヲ對シ。ソノ本ニ更ニ狭小ノ二葉アリテ、形略合歡木葉ノ如クナレバ、小蟠ノ中筋殆ト葉心ニアツテ、彼ノ邊側ニヨルガ如クナラス。故ニ擔圓ニシテ尖ルモ、彼ノ扁大ナルガ如クナラス。又末蟠ノ中心ニ針狀ノ一葉、柄本亦狭細ノ二托葉アリ。莖、柄、葉背、共ニ白毛アリ。又莖ノ處々ニ剛刺アリ。夏梢葉腋ヨリニ三四五ノ有梗花ヲ出ス。梗長サ寸餘、タウ、チサウノ花ノ如ク、多小花ノ簇聚ニ成ル寸許ノ短穗ニシテ、毎小花ニ白色ノ一苞アリ。筒様ニシテ頭四裂シ、内ニ實礎兩蓋ヲ収ム。雄蕊粉紅色ニシテ四莖黃葯アリ。實礎擔圓ニシテ白色、二柱亦淡紅、苞外ニ又狭長一収ム。林氏、灌木類ノ二十三綱内ニ併ス今分テ収于此。

一 全花 二 實礎并柱共郭大圖

第十四種
ミモサ、フニナカ、羅、スカームアヲチケ、ミモサ、蘭、コイギー、ルール、メイ、ニート、鐸氏、華爾氏



ゴゼンタチバナ

北地白山等ノ高山ニ生ス。莖高サ三五寸。莖脚ニ小葉。梢上卵圓披針狀ノ四葉或六葉ヲ簇生ス。莖葉共ニ頗ル剛クメ小類木ノ態アリ。中心一花莖ヲ抽ク。一寸許。上ニ楕圓ニノ尖ル四葩ニ者小ニ者大。白苞アツテ。内ニ十數ノ短梗アル細花ヲ開ク。形漏斗。椀ニメ四裂白色。實稜圓長ニメ一柱雄蕊四ニメ黃葯。後實ヲ結ブ。熟シテ赤色。形南天燭ノ如ク稍小。蓋白山最高ノ巔ヲゴゼント稱ス。此草ソノ地ニ産。實カラタチバナノ實ニ似タルヲ以テソノ名アリ。附苞中細花郭大圖

所屬未考



所屬未考

附苞中細花郭大圖

一ノ平圓中心ニ一花莖ヲ抽ク。中心一花莖ヲ抽ク。一寸許。上ニ楕圓ニノ尖ル四葩ニ者小ニ者大。白苞アツテ。内ニ十數ノ短梗アル細花ヲ開ク。形漏斗。椀ニメ四裂白色。實稜圓長ニメ一柱雄蕊四ニメ黃葯。後實ヲ結ブ。熟シテ赤色。形南天燭ノ如ク稍小。蓋白山最高ノ巔ヲゴゼント稱ス。此草ソノ地ニ産。實カラタチバナノ實ニ似タルヲ以テソノ名アリ。附苞中細花郭大圖



ナハワ...

深山陰地ニ生ス。近隣勢州ニ自生アレ。凡吾邦ニ産セズ。莖高七八寸三四葉ヲ互生
 レ。黄精萎蕤ノ類ノ如ク又牛尾菜葉ニ似テ尖銳。五ノ縦脉著ク邊縁皺發波紋ヲナ
 レテ細鋸齒アルヲ見ルガ如シ。每葉腋ニ寸餘ノ細梗ヲ出レ頭ニ一花ヲ綴ル。或ハ
 梗岐シテ兩花ナルモノ亦アリ。花下垂シ一大瓣三小瓣ヲ以テ成ル。ツノ大小二瓣
 外ニアツテ上下ニ分レテ縦トナリ。二小瓣内ニアツテ兩側ニ開テ横トナル。尖ミ
 ナ反ス。雄蕊四莖形略牙齒ノ如ク。本小末大。色紫黑頭白齒ノ如ク。白處即葯ニノ深
 黄赤色。兩莖並立シ。ソノ上下ヲ挾各一莖アツテ殆鈍長方形ヲナス。中心實礎綠色
 ニノ平圓。中心纔ニ尖頭アツテ色微淡シ。此品花形異態莖狀亦尤奇ナリ。附排開一
 雄蕊露實礎郭大圖

所屬未詳



カナビキサウ 百葎草

原野ニ多ク生レ。莖高一尺許。葉互生ニメ形狹長。幅一分許長一寸許厚ノ帯白綠色。稍葉間枝ヲ分チ細花ヲ簇生ス。毎花一二細葉アツテ護之。別ニ莖ナク。花鐘狀四裂。表淡緑裏白色。四雄蕊筒ニツキテ黃葯。實礎葶中ニアツテ一柱ニメ結頭アリ。一種尾州知多郡ニ産スルモノハ。高二尺許ニ及ブレ

所属未考



全花郭大圖

マヒツルサウ

北地高山白山尤多ク吾能郷山亦コレアリ。根細メ延長一柄一葉。時ニ一莖ヲ抽ク
 一四五寸ニメ二葉ヲ互生スレバ上ニ花ヲ著ク。葉圓メ尖リ本深ククリコミ縦脉
 葉形ニ循フテ分明略フタバアフヒノ貌アリ。故ニ白山アフヒノ名アリ。又ソノク
 リコミ深キニヨツテマヒツルサウノ稱アリ。莖頭數梗ヲ出シ疎穗ヲ為シテ。無萼
 楕圓ノ四瓣ニメ微反スル細白花ヲ放シ大サ二分許。實礎二顆一併シ柯子状ヲナ
 シ各頸柱ヲ為シ結頭アリ。雄蓋四ニメ葯淡黄色後圓實ヲ結フ熟メ老褐色。附全花

郭大圖

茅八種
 コンハルラリア。ビホリア。羅

テウーブラーダグ。タルコロイド、蘭

エーニブラードット 鐸氏

按林氏本条ヲ六綱一目ノ「コニハルリア」ノ属トシ其第八種ニ列ス。花瓣並數不
 同レバ。宜別属トナスベキモノタリ。姑クソノ名ヲ假テ別テコ、ニ列シ



淫羊藿

傳云漢種或云江州ニ産ス。草狀啓蒙詳之。春新莖ヲ抽キ梢ニ於テ二枝或三枝ニ分
 レ。枝ト共ニ一梗ヲ出シ疎總ヲナシテ花アリ。ソノ本ナルハ。一莖ニ三花末ニ至ツ
 テハ各垂一花。碑小僅ニ二三分。四葉ノ麥粒狀ノ苞アリ。花放ケハ即脫ス。花四瓣卵
 圓ニノ尖リ白色四蜜槽アリ。薄ノカ、へ色黄大。殆ト花瓣ニ超ユ子室角様柱頭長
 ク四雄並圍之。葯長メ略莖ト齊クソノ披開スルヤ。三片トナリ。二ハ繖上シテ黄粉
 ラ吐キ一ハ莖上ニツイテ粉ナク。又莖ノ如キ用ヲナス。其状大ニ他花ノ葯ト異ニ
 ノイカリサウノ葯ト一般趣ヲ同フス

第一種
 エヒメヂユム。 アルピスム、羅 附一全花 二雄蕊 共郭大圖
 アルピス。 モイルチースブルーム、蘭



イカリサウ

淫羊藿一種

草狀前条ト同ノ稍矮小ニモ軟弱。往々凌冬ノ種アレ。多ハ凋テ宿根ス。花枝葉枝ノ間ニ出ズソノ下邊ニアリ。花ヲ綴ルノ數少ノ穗狀ヲナス。苞同様ナレ。花大ニノ形亦異ナリ。ソノ開ヤ。下ニ向ヒ心藏狀ニメ尖タル四瓣上ニ被ヒ。瓣下ニ四嘴アリ。嘴モト漏斗狀ニメ。ソノ四口相聚テ花體ヲナス。筒外ヲサシ勾リテ趾ヲナス。ソノ狀恰モ錨兒ノ如ク然リ。口内ノ上縁各一雄蕊アツテ下垂ス。莖短ク葯大ニ長シ。披開三分シ黄粉ヲ吐ニ至テハ。一花莖ノ用ヲナスカ如キ。漢種ノ葯トソノ趣一般ナリ。子室角狀。按ニ此種花形漢種ト異レトモ。趾即蜜槽ニメ。漢種ノ蜜槽ノ大ナルニ同ク。雄蕊葯所歸一様ナレバ。ソノ同屬異種ノ妙巧實ニ一奇トス。花色ニ白ト淡紅紫ノ二種アリ又葉尖岐シテニミヲナスアリ。附蜜槽並雄蕊郭大圖



梅花イカリ


産處不詳或云薩州ニ自生アリ。草略イカリサウト同フノ小。高尺許ニ不過一枝ニ
 葉ニ不起花頭ノツキ方イカリサウノ如クナレトモ形小ニノ白色微ク梅花ノ態
 アリ。蜜槽ノ形^{オビギキ}斗葉ノ蜜槽ノ如ク嘴ナク。兩葢花心ニアルコ漢種ニ於カ如ク約
 及翻スルコ亦同シ。又草状相似テ一枝ニ三葉ヲツケ花形略同メ淡紅色ナルアリ。
 別ニ一種ニノ本糸ノ花色異ナルモノニアラズ。附雄葢郭大圖

按種名未詳



下木

一ノ一ノ二ノ三ノ四ノ五ノ六ノ七ノ八ノ九ノ十ノ十一ノ十二ノ十三ノ十四ノ十五ノ十六ノ十七ノ十八ノ十九ノ二十ノ二十一ノ二十二ノ二十三ノ二十四ノ二十五ノ二十六ノ二十七ノ二十八ノ二十九ノ三十ノ三十一ノ三十二ノ三十三ノ三十四ノ三十五ノ三十六ノ三十七ノ三十八ノ三十九ノ四十ノ四十一ノ四十二ノ四十三ノ四十四ノ四十五ノ四十六ノ四十七ノ四十八ノ四十九ノ五十ノ五十一ノ五十二ノ五十三ノ五十四ノ五十五ノ五十六ノ五十七ノ五十八ノ五十九ノ六十ノ六十一ノ六十二ノ六十三ノ六十四ノ六十五ノ六十六ノ六十七ノ六十八ノ六十九ノ七十ノ七十一ノ七十二ノ七十三ノ七十四ノ七十五ノ七十六ノ七十七ノ七十八ノ七十九ノ八十ノ八十一ノ八十二ノ八十三ノ八十四ノ八十五ノ八十六ノ八十七ノ八十八ノ八十九ノ九十ノ九十一ノ九十二ノ九十三ノ九十四ノ九十五ノ九十六ノ九十七ノ九十八ノ九十九ノ百



葉生亦枝ヲ分チ高二三尺。莖細ク節膨起シ。婀娜トシテ直立シガタシ。葉茶葉ニ似テ對生シ鋸齒鈍ニメ少ク背ニ反ス。每葉針狀ノ托葉アリ。莖葉深綠色。此品暖國産ニメ微畏寒。故ニ暖室ニ栽レバ冬猶蒼翠可見。夏枝梢ニ寸許ノ花莖ヲ出シ四五葉ヲ對シ。每垂黃綠色粟狀粒ヲ穗様ニ綴ル。花體頗ル奇ニメ略及巳ノ花ノ如ク。球様ニメ三指ヲ屈スルノ状ノ如ク。莖ニ向ツテ著ク。腔内四雄蕊アリ淡褐色ニメ白粉ヲ吐ク。葶殆。軸圓實礎ソノ牀上内側ニ立チ。亦軸圓。頭ニ茶褐色ノ疣瘡ヲナス。葶上向外ノ餘地ハ。即玖體安之ノ處トス。花佳香アツテ可愛。

- 一 花背
 - 二 花腹
 - 三 實礎并葶
- 共郭大圖

所属未考



對金粟蘭一葉一花

其知照


平林在表

フタリレツカ 及巳

形状啓蒙ニ説可見。莖頂穂ヲナシ細花ヲ互生點綴ス。花白色球様殆指ヲ屈スル掌ノ如クノ莖ニ向テ居ス。萼ハ的指スベキノ形ナク。只實礎ノ片側一稜ヲナス處ニ著ク。實礎柯子狀頸繞折裂ス。四雄蕊洞中ニ立チ。短莖長葯色黃褐ニシテ白粉ヲ吐ク。其狀頗ル奇也。一種根際ヨリ枝ヲ出スモノアリ。葉花ニアツテハ異狀ナシ

- 一 全花
- 二 實礎并萼 共郭大圖

按金粟蘭ト屬ヲ同スルモノ乎



千歳ノ根其下
海三時一日ニ

子草時葉花ヲナシ
外葉且葉 共郭大圖




ヒトリレツカ

銀線草

草及巴子ニ似テ稍小。高七八寸ニノ亦二三節アリ。莖頂四葉近ク相對シ。光澤アリ。莖ニ紫色ヲ帶フ。春中心一小莖ヲ出肥者ハ二三莖ニ及フモホアリ。二寸許。細花ヲ對綴シ。一寸許ノ穂ヲナス。實稜柯子状頭菌様ニノ白色。花瓣ナク直ニ蒂ニツキ。雄蕊三莖系ノ如クノ白色。長二分許形三齒爬ノ如ク。實稜外面ノ下側ニ著キ。兩側ノ二莖ハ下邊ニ黃藥アリ。中位ノ一莖ニハ葯ナシ。フタリレツカノ花形トハ大ニ不同レトモ。實ハ頗ル同形ヲナシ内ニ一子ヲ蓄フ。

- 一 實稜
 - 二 兩莖
 - 三 伏莖見葯
- 共郭大圖

按三綱一目ニ可收品ナレトモ。草形葉状フタリレツカノ類ニ外ナラザルヲ以テ。姑ク列其下



本草綱目卷之三 四編一頁 平木生載

銀線草 實稜 兩莖 伏莖見葯

按三綱一目ニ可收品ナレトモ。草形葉状フタリレツカノ類ニ外ナラザルヲ以テ。姑ク列其下

溝瀆水邊ニ生ス。莖高大低一尺。葉長三四寸幅二三分四葉對生細鋸齒アリ。葉腋細枝ヲ分チ梢頭細花ヲ簇生シ長寸餘ノ花穗ヲナス。萼鐘狀五裂花亦鐘狀ニノ四裂。四雄葢長ク瓣外ニ立チ。葢ノ中間ニ多ノ纖毛アリ。藥白色。實礎一柱ニノ頭二裂。長。雄葢ニ比スレバ微短。瓣葢共ニ淡紅紫色ニメ美ナリ。ソノ形頗ルトラノオ類ノ如クメ小ナリ。故ニミツトラノオノ名アリ。莖溝道アツテ四稜ヲナシ。穗ニ至テモ猶然リ。每枝三花ヲ簇列ス。ソノ萼ニ對シテヒノ如キ小葉五片ニ列ニ並ヒ。内ナルモノニノ小。外ナルモノ三ニノソノ正中ナルモノ尤大也。ソノ色萼ト共ニ淡緑ニメ毛茸アリ。 附金花郭大圖

所屬未考




ミツユキノシタ

池澤水邊ニ生シ。莖塌地節々鬚根ヲ下シ。又枝ヲ出シ。蔓延水上ニ引ク。葉互生橢圓
倒蛋形ニノ本漸殺ク。淡緑ニノ紅色ヲ帶莖最多シ。初秋毎梢葉腋ニ一花アリ。葶鐘
様卵圓四縱道アツテ殆鈍方。即裸子室ニノ頭四尖瓣ヲナシ。別ニ花瓣ナク。色淡黄
綠。子室頭四起ニノ中心一柱結頭アリ。雄蕊四莖。四ノ黄葯集ツテ柱頭ヲ擁ス。蒂下
別ニ二尖アル小萼アリ。子室四區ニノ多ノ細扁子ヲ收ム。

- 一 全花
 - 二 雌蕊立子室上
 - 三 半熟實
- 共郭大圖

所属未詳



ミツユキノシタ

五弁裂花大圖

天線狀葉小圖

雄蕊四莖三



ミツユキノシタ

四角一目

五二


平木在歳

ヒレ 芟

形状衆所皆知。吾郷邊所在大小二種アリ。大者コレヲヲニピレト稱ス。葉扁尖ニノ
 鋸齒アリ。萼鐘様被針状四片。花掃圓四瓣白色。衰後淡紅微暈ヲ見ル。實礎柯子状一
 柱結頭。四雄蕊ニノ黄葯。實礎ヲ圍テ邊縁剪裁アル黄色ノ蜜槽アリ。小者草摘少ノ葉
 尖銳鋸齒亦鋭ル。生殖諸部同様ナレ也。花瓣枚ノ尖ル。實熟ノ頗ル大小アリ。附兩
 蓋并蜜槽部大圖



トラバ。ナタニス 羅 スウムメンデ。ワールノート 蘭



小葉ヒレ

説載上糸下



花葉水木



五十四


特生蔓様ノ二種アリ。共ニ同一類ニシテ。特生ナルハ莖高二尺許。形圓尖ニシテ三縱道
 アル四葉。或三葉ヲ對生スル。十餘層。下邊ノ三四層間ノ葉ニハ。ソノ面ノ中筋ノ
 上ニ五七分ノ細梗ヲ出シ。一二花ヲ著ク。無萼四瓣披針狀。色淡緑ニシテ紫暈アリ。雄
 蕊亦四瓣。略同形ニシテ稍細ク。尖淡緑本暗紫色。裏面ノ半腹ヨリ下ニ。二ノ長クシテ白
 粉アル葯狀アリ。葯ノ上ニ淡綠色ノ細長鱗片アリ。四瓣蕊コノ片ヲ以テ相併接ス
 ルガ如シ。蔓様種ニアツテハ實礎卵圓柱ナク。只頂ニ一細尖点アツテ。ソノ本ニ黃
 褐粉ヲツク。又一種孳生ニシテ葉狹小ナルアリ。附實礎郭大圖

所屬未考



蔓藤百部根

蔓藤ナルハ。長二三尺微々延纏ノ態アリ。二葉或三葉對生シ。形卵圓披針狀ニノ有柄。亦三縱道アリ。四五層ヨリ上ニ。葉心花梗ヲ出ス。特生品ノ梗ヨリ長ク。一花或ハ二花ヲ著ク。形略同ケレトモ。瓣細ノ尖リ。雄蕊亦瓣様ニノ長ク。尤尖銳。葯鱗片。實稜。共ニ特生品ト同様ニノ亦柱ナク。頂ニ少許ノ毳毛集結スルヲ見ル。二種共ニ塊根ニメ。略天門冬ノ根ノ如シ。 附全花郭大圖



蔓藤百部根
蔓藤ナルハ。長二三尺微々延纏ノ態アリ。二葉或三葉對生シ。形卵圓披針狀ニノ有柄。亦三縱道アリ。四五層ヨリ上ニ。葉心花梗ヲ出ス。特生品ノ梗ヨリ長ク。一花或ハ二花ヲ著ク。形略同ケレトモ。瓣細ノ尖リ。雄蕊亦瓣様ニノ長ク。尤尖銳。葯鱗片。實稜。共ニ特生品ト同様ニノ亦柱ナク。頂ニ少許ノ毳毛集結スルヲ見ル。二種共ニ塊根ニメ。略天門冬ノ根ノ如シ。 附全花郭大圖

ピンボカヅラ 烏薺母

啓蒙草狀ヲ説可見。夏葉腋或葉柄ニ對シテ花莖ヲ出ス。長二三寸。上三亞ヲナシ。各
 各繖狀ニ又分レ細花ヲ點綴ス。無萼四瓣ニノ反捲シ。形圓長ニノ尖リ。色淡綠。牀黃赤
 色邊縁ニ四ノ微刻缺アリ。四雄蕊沿之テ立。黃葯ヲ開ク。葯即實礎ニノ。一柱短粗ニ
 ノ黃色。尋テ瓣蓋共ニ落。葯上牀柱ヲ留ム。此花一齊ニ不開。故ニ實熟シテ未開ノ花
 尚存ス。附金花郭大圖

ヒナス。ヤホニカ 春氏




代漢未詳



嘉永年間舶來クハエンサウハ花戸所命ト云。莖蔓延イヨカヅラノ如ク。葉卵圓ニ
 ノ尖リテ對生。略女青ノ如クシテ柄短殆無カ如ク。葉腋多ク枝ヲ出シ。夏秋ノ際花
 梗ヲ出長寸許。花筒様四裂紅色。恰モ蔦蘿ノ如ナレトモ。色微ク淡ク。形笈大ニノ辨
 尖反捲シ。又蔦蘿ノ五裂ナルト不同。實礎半萼ニ藏シ。頭扁圓ニメ一道アリ。一柱結
 頭繞ニ二裂シ。色黃綠。四雄蕊筒ニ著キ。喉ニ至テ離レテ花外ニ立。蒴暗紫ニメ白粉
 ヲ吐。萼鐘狀ニメ四葉。各葉間又各鱗様ノ細片アリ

所屬未詳



雌蕊郭大圖



雄蕊郭大圖



普ク藪澤陰地路傍ニ生シ。塌地蔓延數尺。葉柳葉狀ニ小。七八五輪輻シテ層ヲ
 ナシ。每層細枝ヲ對生シ枝上又葉ヲ輻次シ。葉腋梗ヲ對生シ花アリ。花細小輪樣ニ
 ノ四裂。殆、四瓣ノ如ク裸子室ノ上ニアリ。子室ハ二圓體併接シテ二柱アリ。雄蕊四
 ニノ黃藥。莖線稜アツテ方稜上細刺毛アリ。葉背中筋子室等皆然リ。故ニヨク衣服
 ニ鈎著シテ不脱。雜草中尤可賤ノ品タリ。 附全花郭大圖

第二三種
 カリユム。アハリ子、羅 ケレーフコロイド、蘭

按春氏ハ第六種「カリユム。ユリキノス」ヲ以テ本条トス。今林氏ノ所說ヲ閱
 スルニ不的當。或有說姑存疑。又云林氏「カリユム」ノ類ヲ一目ニ收ム阿須氏所圖
 已ニ二柱トス。故二目ノ下ニ入ル。

新蓋花大圖



キクムグラ ヒメムグラ 猪殃々一種

全形ムグラノ如ナレド。莖短ク初終ニ塌地テ擡頭シ。長一二尺ニ不過。方莖。葉ムグラヨリ濶短ニシテ軟。下層大抵五葉末ニ至ツテ六葉。花梗ヲ出ス。ムグラノ如ク。子室花形並數亦同シケレドモ。花稍大ニメ。子室反テ小。刺毛不剛シテ短。莖葉ニ在ツテハ全ク毛ナシ。

- 一 全花
 - 二 子室并雌蕊
 - 三 半熟實
- 共郭大圖



ヨツバムグラ

細莖地ニ塌テ生シ。莖方葉楕圓ニノ尖。大サ二三分。四葉輻次シテ層ヲナス。莖葉共ニ毛ナク。梢頭枝梢分叉一分許ノ細花ヲツク。四裂淡黄白色。形ヒメムグラト同シ。實圓ノ毛ナレ。此種秋ニ至テ盛ニ花アリ。

共郭大圖

アパリ子。キユアドリホリア。ミノル 物印満氏

附一 全花

二 半熟實



平林在哉

一種ヨツバムクラ

上条ノ一種ニノ葉倒蛋形ニシテ細ク。片莖微ク糙澁アリ。花大サ略上条ノ如クシテ三裂白色。二柱三雄蕊。實形上条ニ同ク又毛ナシ。此種亦秋盛花アリ。附全花郭大圖



四種一ヨツバムクラノ上条ノ葉倒蛋形ニシテ細ク。片莖微ク糙澁アリ。花大サ略上条ノ如クシテ三裂白色。二柱三雄蕊。實形上条ニ同ク又毛ナシ。此種亦秋盛花アリ。附全花郭大圖

下条ノ葉倒蛋形ニシテ細ク。片莖微ク糙澁アリ。花大サ略上条ノ如クシテ三裂白色。二柱三雄蕊。實形上条ニ同ク又毛ナシ。此種亦秋盛花アリ。附全花郭大圖

葉ハ倒蛋形ニシテ細ク。片莖微ク糙澁アリ。花大サ略上条ノ如クシテ三裂白色。二柱三雄蕊。實形上条ニ同ク又毛ナシ。此種亦秋盛花アリ。附全花郭大圖

花ハ倒蛋形ニシテ細ク。片莖微ク糙澁アリ。花大サ略上条ノ如クシテ三裂白色。二柱三雄蕊。實形上条ニ同ク又毛ナシ。此種亦秋盛花アリ。附全花郭大圖

莖ハ倒蛋形ニシテ細ク。片莖微ク糙澁アリ。花大サ略上条ノ如クシテ三裂白色。二柱三雄蕊。實形上条ニ同ク又毛ナシ。此種亦秋盛花アリ。附全花郭大圖



啓蒙明説形状可見。葉卵圓ニメ尖リ長柄アリ。花輪樣四出亦卵圓ニメ尖リ淡黃白
色。實礎二顆併接ニ柱並立シ各々結頭アリ。雄蕊四ニメ黃葯。一種葉潤短心藏狀ニ
ノ柄長ク花五裂五雄蕊ナルアリ。共ニ圓實ヲ結ビ熟シテ黑色

第五種

ルビア。コルザリホリア、羅 ハルトホルミゲ。カラッペ蘭 春氏
所定

按アカ子ハルビアノ正當品ナラザレドモ。葉形略同ク莖ニ刺毛アツテ根ヲ採
テ赤色ノ染料トナス等ノ一全ク同ケレバ。ソノ屬タルニ論ナク。又林氏ノ第四
種ハ花五裂トス。今アカ子亦五裂花ノ一種アリ。春氏ソノ第五種ヲ擧テ直ニ茜
草ノ名ヲ下ス。林氏ヲ闕スルニ一ニ可議ノ不同アツテ的當トシガタケレドモ。
ソノ屬ニ外ナラザルヲ可見。又云林氏ルビアヲ一柱ニ裂ニ結頭アルノ品トシ
四網一目ニ収レドモ。余ハ之ヲ二目トス。此類花樣類ニ亦アリ可併見

全花一倍圖



六十四
早木在哉

アカ子一種

附全花并實礎二柱郭大圖

說載前条下



全花并實礎

杏ノ二葉二並也



クルマバサウ

根地中ニハフテ處々ニ芽ヲ出ス。莖方ニノ直立五七寸。葉ムクラノ如ク六七片輻次スルヲ數層。梢頭分又シテ花ヲ綴ル漏斗狀ニメ四裂大サ二分許。實礎蓋狀ムクラト同レク。花後實ヲ成スヲ亦同フシテ刺毛アリ。然レトモ莖葉ニ於テハ絶毛ナレ

按葉形猪殃々ニ似タレドモ。莖直立ニメ無毛。只實ニ於テ刺毛アルノ狀大ニ下条ノ二種ニ近レ



持ノ用イナスハ...

新血品又エ...

...

...



...

キヌタサウ 特生茜草

深山ニ生シ。行根長ク地中ニ蔓延シテ芽ヲ出ス。方莖一二尺。披針狀ニノ無柄ノ四葉相對スル。蔓生茜草ノ如クニノ四五層。每節微ク隆起ス。夏莖端及ビ梢葉腋ニ細枝ヲ出シ多ク分叉シ花ヲ綴ル。輪様四裂白色。形猪殃々ノ花ノ如ク。實礎裸ニノ二箇併接シテ二柱。柱下白色密腺アリ。雄蕊四ニノ葯點褐色白粉ヲ吐ク。此種全形茜草ノ態アリテ根亦赤クレドモ刺毛ハ絶テナシ。又産地ニヨツテ葉狹細ナルモノ。潤短圓頭ナルモノ等アリ。附一 全花 二 實礎并柱 共郭大圖

第十九種

カリユム。ホレアレ。ノールドス。ワルストロー。蘭 叩葉圖 可併證

按此品又エッヘン。スピツブラーヂケ。ヘルドカラッピノ名アリテ根ヲ採テ漆科ノ用トナス。カラッピハ茜草類ノ屬名ニ係ル



實礎并柱郭大圖

郭大圖

一種大葉品

伊吹山上多く自生シ。全形前条ニ相似テ稍大ニシ。一窠ニ多く簇生シ莖ニ微糙沙アリ。又葉ニ短柄アツテ花五裂雄蕊亦五ノ異アレ。葉状實形ソノ種ニ外ナラズ。根色亦赤ク即カリユム。ホレアレノ一種タルヲ昭々タリ。附一 全花

二箇實稜并柱郭大圖



此品又エヘン。スレクノナク
科ノ用トナス。カスレハノ
平類ノ屬名ニ係ル



カハラマツバ 蓬子菜

葉大低一層八片。花披針狀四瓣外反。實礎圓長二顆併接シ二柱併出分岐各結頭下
リ。雄蕊四ニノ黄葯。近道所在ノモノハ花白色微黄ヲ帶ヒ伊吹山上ニハ黄色差深
キモノアリ。日光山所産ノモノハ高總五六寸。近道ノモノハ二尺ニ及フ。功用林氏
詳シ。附全花片實礎柱等一倍圖

第十一種

カルリユム。ヘルム 羅

ラプレクト。ワルストロー 蘭



可蘇木草

二 細葉赤蘇木草 共蘇木圖

イ子蘇木草所不何又其葉々々白十ヤ出ス「亦十ヤ」和言「河二」
蘇木草ノ二尖短長ニス「行ニ」由七ヤ由八ノノ蘇木草ノノ蘇木草ノノ
蘇木草ノノ蘇木草ノノ蘇木草ノノ蘇木草ノノ蘇木草ノノ蘇木草ノノ蘇木草ノノ
蘇木草ノノ蘇木草ノノ蘇木草ノノ蘇木草ノノ蘇木草ノノ蘇木草ノノ蘇木草ノノ




子コノメ

水中或ハ湿沔ノ處ニ生ス。初生ノ葉ハ圓ノ石胡荽葉ノ如ク。莖塌地處々鬚根ヲ下
 レ萌芽ヲ分チ春ニ至テ高五六寸。柔軟多液。撈條アツテ稍方。葉ヲ對生ス大サ三四
 分。楕圓ニノ圓頭齒アリテ淡綠色。正二月ノ際莖頂ニ枚ニ分レ。每枝又又レ每頭三
 花ヲ並ブ。每花一小葉アツテ養之。又心又別ニ一花ヲツク。花瓣扁圓大小四出淡黃
 綠色ニノ無萼。或見テ萼トシ無花各瓣丹深黃色ノ葯アリ。子室柯子狀ニノ差扁。二
 箇並接シニ尖頭外ニ反シ。内ニ細子ヲ収ム。ソノ莖頂並花ノ形。略澤漆ノ如クナレ
 トモ。花形蓋狀不同。又莖葉ヲ切テ白汁ヲ出ス。亦ナクノ味苦シ。附一 全花稍
 老者 二 雌蕊亦稍老者 共郭大圖

所屬未詳

新和藥考



平

平木在載

ハナイカリ

北地高山駒ヶ嶽白山等ニ生ス。莖稜條アツテ方高尺許。葉對生形圓尖三縱道アツテ恰モ百部根葉ノ如ク小。秋毎葉腋一花ヲ出ス。梗四五分萼披針狀ニノ四片。花體短筒様ニノ四裂體下四距ニ分レ色淡黃白。略イカリサウノ態アリ。子室長角頭總ニ哆キ。四雄莖筒ニ出葯黃褐色。附兩莖一倍圖

按可屬未詳



ナム...
ハナイカリ...
ハナイカリ...



ナム...
ハナイカリ...
ハナイカリ...
ハナイカリ...

ツルムラサキ

落葵

此種収五綱三目下誤入于此

啓蒙略草狀ヲ記ス可見。葉腋枝ヲ出シ無梗無萼ノ花ヲ踈ニ穂狀ニ著ク。其花初メ
 白色ノ細點ニメ微々紅暈ヲ帶ビ。漸々豊長殆ト麥粒ノ半ニ至リ紅色亦加ル。丹外
 二瓣ニ分ル。外者四裂丹者三裂シ。肥厚ニメ密閉ス。盛花ノ際ニ至テ瓣尖少ク咬キ
 中心黃蕊ノ一端ヲ見ル。剖視スルニ實礎圓尖ニメ三柱五雄莖莖ニメアリリラ黃蕊
 花老テ瓣不脱膨脹遂ニ實形ヲナシ。色漸ク綠ニ變シ尖ニ一紅點ヲ餘ス。熟スルニ
 至テ全深紫色トナリ汁ヲ搾ツテ紫色ヲ染ルノ用トス。丹ニ一核アリ。又初メ花點
 下ニ如萼一點アリ。長ニ至テ葉狀トナル。故ニ一花必ス一葉アリ。又肉眼纔ニ見得
 ルホドノニ細點アツテ葉ヲ夾ム。花長ノソノ點長セズ後微黃色ヲ帶フ。蓋シ一種
 ノ萼ト云ベキモノ、如シ。又近來一種大葉ノ品アリ傳云フ海外種ト附全花并兩

莖郭大圖

芽一種
 バセルラ。ルアラ 羅
 ローテ。ベートキリム、蘭



根水底ニアツテ莖葉水面ニ浮ブ。葉匙狀稍マ竹葉ニ似テ潤短深綠色ニシテ滑澤光アリ。葉背莖柄擡等ハ淡黃綠ニシテ帶褐色。地ノ肥瘠ニヨツテ葉ノ大小長短不一。ミナ長柄アツテ互生或ハ對生。柄本必擡アツテ包之。夏葉腋或ハ柄ニ對シテ花莖ヲ出ス長二三寸。頭ニ多花穗狀ニ綴テ殆筆頭菜ノ如シ。花ハ四片ノ萼ニシテ無瓣形扁圓ニシテ柄アツテヒノ如ク。實礎麥粒狀頭平ニシテ粟起シ色茶褐。大抵二顆或三又一者亦アリ圓之テ八箇ノ雄蕊葯連列ス。檢之二箇ツ、併接シ至短ノ莖アツテ牀ニツク。ソノ二箇ノ中間ヲ穿テ萼ノ柄出テ葯ノ莖ニ接メ共ニ牀ニ根ス。其狀尤奇ニシテ此類ノ外未。如是ヲ見ス。葯淡黃白色綻テ黃綠白粉ヲ吐ク。後實ヲ結ブ大サ稷ノ如ク扁圓ニシテ有稜。老茶褐色ニシテ光アリ。時ニ萼猶存ス。附 一 全花 二 示萼出葯間 三 實礎共部大圖

按本条四柱ヲ必トセザレトモ此類大抵四柱。故從林氏例収于此

第一種 ホタモゲトン。ナタンス。羅 ロンドブラーヂク。ホンテイニコロイト。蘭




平木在哉

イトモ ミツヒキモ 眼子菜一種

溝瀆止水ノ中ニ生シ。莖纖細糸ノ如クメ長ク。葉無柄狭長幅一分ニ不足長三五寸。木本類ノ葉ノ如クノ互生シ。水ニ沿フテ浮泳ス。故ニ邦俗イトモ或ハミツヒキモノ名ヲ稱ス。春晚夏初ニ至ツテ莖頭處々ニ別ニ長一寸許。幅二三分ノ披針狀ノ數葉ヲ出ス。形貨眼子菜ノ葉ノ如ク。光澤アツテ色暗淡緑ニノ背微褐ヲ帶ヒ。ソノ葉間ヨリ花ヲ出ス。形亦眼子菜ノ花ノ如クシテ稍小ナレト。花体ニ於テハ全ク同ノ子室多クハ四顆ナルノミ。實形亦同シ。

按「ホタモゲト」ノ屬ニ可收種名未詳



「ホタモゲト」ノ屬ニ可收種名未詳




サ、モ ヤナキモ 互生對生二種 馬藻

小河細流ノ中ニ生シ。流ニ從テ長ク數尺ニ及ブ。莖細ノ扁葉對生互生ノ二種アリ。對生ナル者、狹長四五寸幅二三分。互生スル者長二三寸ニノ鈍頭。共ニ夏月葉間ヨリ二寸許ノ扁莖ヲ出シ頂花ヲ攢簇ノ短穗狀ヲナシ。水面ニ立テ花ヲ開ク。萼四片ニノ扁圓匙樣色暗淡黃綠別ニ花瓣ナク。實礎麥粒狀四顆並立。頭擔圓菌樣ニノ赭褐色。雄蕊亦四。短莖ニノ葯萼柄ノ爪ヲ挾ミ。色淡黃褐ニノ白粉ヲ吐ク。 附全花郭

大圖

按下條所舉ノ「ポタモゲト」ノ一種タルニ論ナシ。且林氏下條ノ下ニ對生互生ノ三種アルヲ説ク。亦此種ト同シ




エビモ 馬藻一種

馬藻ノ一種ニノ亦同處ニ生シ。葉形同フシテ邊縁皺縮波紋ヲナシテ互生ス。莖又扁ニノ花亦馬藻ト同シ。

第五種

ポタモゲトン。シリスラム、羅
ゲリルルド。ホンテイインコロイド 蘭



草木部 藻類 馬藻



草木部 藻類 馬藻

草木圖說前篇卷二終



