

草木圖說前篇

草部

四

奇

植物		
號冊	冊	冊
二〇	一八	
學	中	會
校		

十三

植
三

470,2
537
Y05/4

彦立校
草木圖說前篇卷四目錄
中學部
印章

第五編 中
第一目 一雜葦

イノコツチ
カテンサウ
イハカバシ
イハウチハ
ミツガシハ
ミツアフヒ
サナナギ
カマフタ

ミヅヒキクサ
イハタバコ
小葉イハカバシ
キカシクサ
イハイテウ
コナギ
アサ
白欵



アサガホ

同一種

ヒルガホ

一種ヒルガホ

第二目 二雌蕊

クサタチバナ

ツルガシハ

スバザイゴ

スバメノオゴケ

ツルモウリシクワ

ガイイモ

イケマシ

ハリアサガホ

ルカウサウ

ハマヒルガホ

リウキウイモ

キクシメ

ロクエニサウ

ロクオンサウ

タウワタ

同一種

イヨカツラ

キジヨラン

ヘクソカツラ



アカザ

アリタサウ

ヲカヒシキ

トナハラ人參

オヤマリンダウ

アサマリシクワ

ツルリンダウ

セニアリ

セニニチサウ

チヤルメルサウ

イチハツ

以上五十九種

ハ、キバ

マツナ

人參

リンダウ

矮生リンダウ

トウヤクリンダウ

ハルリンダウ

アケボノサウ

オランダセニニチ

チトメクサ

イノコツチ 牛膝

啓蒙牛膝ノ下。土牛膝。同一種柳葉者。并ニ夏^多莖葉者等ノ三種ヲ舉テ。ソノ各形ヲ詳説ス。概スルニ葉滑澤ニノ根ニ潤アルハ上品ニノ本糸。葉微毛アツテ根潤ナキ者ハ下品ニノ土牛膝トス。ソノ葉形根狀ニ些異アレ。花實ニアツテハミナ一般ナルヲ以テ。今只土牛膝ノ一全圖ヲ舉テ他ヲ略ス。萼針狀ニ片ト披針狀ノ一片ニ成ル。共ニ淡黃綠色ニノ紫色ヲ帶フ。又ソノ針狀ノ本ニ各卵圓ニノ淡黃綠色ノ二片アツテコレニ著ク。花五瓣形半披針狀ニノ剛ク淡黃綠暈アリ。按ニ此五瓣亦形實萼ト等シテ無瓣花トスルモ亦可ナリ實稜圓尖ニノ一柱帶白色。雄蕊五ニノ葯黃色。花衰テ瓣萼不脫。共合閉シテ實ノ熟スルニ至レ。附一全花 二萼 三半熟實共郭大圖

第一種 大莖
アケーランテス。アスベラ、
草木圖譜前編卷四

ルイエ。カフブルーム、
蘭

春氏并西勃氏所
定余未知當否



ミヅヒキカサ

金線草

莖一二尺。略土牛膝ノ如ク節微ク豊大葉亦差似テ互生シ。莖梢枝端共ニ細花ヲ綴ル。一尺許。無萼無梗短尖ノ四瓣花ニメ。一瓣ハ白色。他三瓣ハ紅暈アリ故ニ又キニミヅヒキノ名アリ實礎卵圓ニメ短。一柱頭二裂雄蕊五ニメ白蕊。花老テ不落。収閉ハノ如クノ内ニ黄褐色ノ小扁子ヲ熟成ス。又一種白花ナルアリ。ギンミヅ又紫面ニ黒點。又ソノ點大ニメ八字形ヲナス等種々アリ 附 全花郭大圖

ポレーゴヌム。ヒリホルメ 春氏

西物氏云此説恐誤


按「ポレーゴヌム」ノ類種々ノ品ヲ收レバ。本条ヲソノ屬トスルヲ亦害ナキカ如シ。西物氏所見余未詳之



カテンサウ

山麓陰地ニ生シ。方莖一尺許。柔軟ミツノ如ク。節ニツイテ長柄葉ヲ互生シ。形圓扁
 圓頭齒アツテ。面深綠色背淡ニノ微紫ヲ帶。柄本小托葉アツテ挾之。三月ノ頃梢葉
 ニ三ノ腋ヨリ花莖ヲ出シ。每頭小ナル重繖様ニ分レ。二ノ針狀萼アリ。嫩上花アリ。
 萼鐘様ニノ五裂。無瓣ニノ五雄蓋ヲ出シ。葯白粉ヲ吐ク。實礎牀ニ藏レ。牀心白色一
 點起アツテ。別ニ柱狀ヲナサズ。附金花郭大圖

所屬未詳



六葉木精

州南臺灣大圖

秋下ニ熱ハレノ外法...

一葉...

十...

ハ...

...



...

イハタバコ

苦苣苔

好テ陰湿ノ巖壁ニ生シ。數葉簇生シテ垂ル。葉邊細齒アレバ。略烟草葉ノ貌アルヲ以テ。イハタバコノ名アリ。夏葉間ニ莖ヲ抽ク。五五六寸軟毛アリ。頂梢枝ヲ分チ。點頭十數花ヲ開ク。萼五葉狭細針狀。花蓋楕五裂シテ。反シ。實礎軸圓尖テ一柱ヲナシ。頭一珠ヲツク。五雄蕊花喉ニ出ル。環ニシテ茶褐色ノ葯アリ。各葯共ニ併接シ。莖ノ表面ニ沿テ上リ。葯上ニ至テ五莖又併合シテ一筒トナリ。以テ柱ヲ圍繞シ。柱頭珠下ニ終ル。ツノ状殆。完筒子花ノ莖ト趣ヲ同フス。花色淡紅或白色等種々アリ。

附兩莖郭大圖

齊屬未詳



齊屬未詳




トハ...

五
三
木
生
成

林麓山中所在多キ草ニモ衆ノ所通和。故ニソノ草状ヲ略ス。叢葉間一莖ヲ抽ク。三寸許。梢ニ十餘花ノ片房ヲナス。萼卵圓五葉。ソノ下又二三ノ小葉アリ。花筒様末ニ至テ纒ニ五裂シ。每裂深ク剪刻シ色淡紅。雄蕊五ニノ葯白色。雄蕊間別ニ柱狀如葇ノ五莖アリ。頭尖ツテ滑澤ノ白毛アリ。即蜜菌トス。實礎圓尖延テ一柱ヲナス。頭鈍ニメ淡紅色。兩葇共ニ花喉ニ潜ル。附開花筒見兩葇實礎蜜菌郭大圖

所屬未詳



小葉ハハカバトス
 花筒ノ上ニハハカバトス

小葉イハカヅミ

前條ノ一種ナルモノニノ形相似レトモ葉狀少シク異アリテ軟小花亦一般ニノ



前條ノ一種ニ下ノ未詳其各
種共本條圖

本條ノ異状ヤチノ一ノ前一去其種長
細クテ實數ニ異テ蓋トハセムノノ狀在
葉アトヤ是其ノ實數圓天一柱並正
女ノハ葉モリ大ニハ葉正葉長口角形
本ニハリコト十八ノ少クハ葉ハ者トハ
葉山有狀ニ至テ全葉トハセムノノ狀
トハセムハ



トハセムハ

深山陰地ニ生テ。全形イハカバミノ如クノ小。葉ハ小葉イハカバミノ葉ニ似レドモ。本ニクリコミナク。少ニ柄ニ流ル。春イハカバミト同時ニ花アリ。一莖一花イハカガミノ花ヨリ大ニノ。蓋様五裂鈍鋸口色水紅。萼卵圓五葉ニノ尖。萼下又三五ノ小葉アツテ互生ス。實礎圓尖一柱。雄蕊五ニノ淡黄。筒底蕊間ニ五ノ鱗様片アツテ。曲ツテ實礎ヲ擁ス。蓋イハカバミノ雄蕊間ニ蓋様ノ五莖アルトソノ趣ヲ同フ。亦蜜槽ノ異形ナルモノトス。 附一 去花瓣見兩蕊諸事 二 雄蕊蜜槽 三 實礎并柱共本然圖

前條ト同屬ニ可收未詳其名



神皇本紀

神皇本紀卷五ニイハカバミノ葉ニ似レドモ。本ニクリコミナク。少ニ柄ニ流ル。春イハカバミト同時ニ花アリ。一莖一花イハカガミノ花ヨリ大ニノ。蓋様五裂鈍鋸口色水紅。萼卵圓五葉ニノ尖。萼下又三五ノ小葉アツテ互生ス。實礎圓尖一柱。雄蕊五ニノ淡黄。筒底蕊間ニ五ノ鱗様片アツテ。曲ツテ實礎ヲ擁ス。蓋イハカバミノ雄蕊間ニ蓋様ノ五莖アルトソノ趣ヲ同フ。亦蜜槽ノ異形ナルモノトス。 附一 去花瓣見兩蕊諸事 二 雄蕊蜜槽 三 實礎并柱共本然圖



キカレクサ

夏秋ノ際田間ニ生ス。高四五寸。莖粗クノ多液。初メ塌地シ節々根ヲ下シ又枝ヲ出ス。葉對生卵圓馬齒莧葉ニ似テ小。每葉腋一花ヲ開ク。萼披針狀二葉。花漏斗様ニシテ五裂シテ尖。ソノ每尖瓣間ニ別ニ倒蛋形ノ小瓣アリ。色淡紅小瓣尤淡。實礎蟻形一柱結頭。雄蕊五ニシテ亦淡紅。 附全花郭大圖

所屬未詳



Vertical columns of handwritten Japanese text, likely a botanical description or historical record, written in a cursive style. The text is mostly illegible due to fading and the angle of the page.

Vertical text along the left margin, including characters like '九' and '三'.

ミツカジハ 睡菜

水澤池中ニアリ。春宿根ヨリ生シテ漸々數葉ニ至ル。形匙頭様ニシテ鈍齒刻アル三葉一莖ニツク。邦俗徽章ニ用ユルミツカシハニ似タルヲ以テソノ名アリ。柄尺許。根際一莖ヲ抽ク。一尺餘。梢ニ寸餘ノ疎穂ヲナシ花アリ。毎花四五分ノ梗アリ。莖五出。花鐘様五裂披針狀ニシテ少ク反シ。瓣内毛アツテ滿布シ白色。瓣尖微紅暈アリ。實棗椰子狀一柱結頭色黃綠。雄蕊五。葯黃褐色。根泥菖ノ如ク鬚根白色。主功多々アリ。藥鏡載之。

第三種

メニールアンテス。チリホリアタ、羅
チリフラーヂ。ロイタフルーム。又
ワートル。チリフラード、蘭



ミヅアフヒ

雨久花

廢田水澤ノ中ニ生ス。葉腎臟狀ニシテ尖リテ多液。柄長ノ鬆疏。夏秋ノ際。柄ノ中腹裂テ花莖ヲ出ス。長三五寸。一穂アツテ花莖ヲ包ミ。頂上十數花疎總ヲナス。花無萼。瓣圓大小六瓣。色深碧又白色ナルアリ。實礎蠟狀頭一柱ヲ爲シテ三稜。雄蕊五ニシテ不藥。實礎ノ下側別ニ扁ニシテ釣狀枝アル一莖アリ。頭莖様ニシテ形雄蕊葯ノ如ク。不破。鈍色深碧。蓋蜜菌ノ一種ニシテ。此種屬ノ特標ニカ、ル。花後花莖漸ク屈折。葉柄ニ沿ヒテ熟實ニ至ル。亦此類ノ一標トス。 附兩葦實礎蜜菌郭大圖

第二種

ポントテリア。ハキナリス。 羅 シケーゲケ。ポントテリア。 蘭

按林氏所說形狀本條ニ同ケレドモ。六雄蕊ト云テ蜜菌ノ一ニ不及ニ在テハ猶嫌アリ。然レ春氏已ニ定之レバ。的當ニ論ナシ。或林氏蜜菌ヲ誤テ雄蕊ノ中ニ等セシカ。抑亦彼地ニアツテハ不然カ



コナギ

解草

ノミ
草形全前種ニ同ノ小。花數少フノ長穗ヲナスニ至ラス。生殖部亦同フノ稍小ナリ

按前條ト同屬西書ニ未見載此種



卷之四
五綱一
十三
平木生

サ、ナギ

前條ノ一種ニノ葉狹細尖銳ナルノミ。サ、ナギハ邦俗ノ所稱ト云



タナレトキ。サ、ナギハ邦俗ノ所稱ト云

サ、ナギ

サ、ナギハ邦俗ノ所稱ト云


アサバ

荇菜

池濱止水ノ中ニ生シ。根水底ニアツテ葉水面ニ浮ブ。形楕圓莖葉ノ如キノ短小。一方ニ缺アリ。周邊微ク雲頭齒アリ。面綠色背ニ紫色ヲ帶。夏月葉腋二三梗ヲ出シ花ヲ水上ニ開ク。大一寸許。萼五片。花五瓣ニメ尖。邊剪絲糸ノ如クノ色深黄。實礎柯子狀柱頭褐色ニノ開哆。雄蕊五ニメ長葯色淡黄。附兩莖實礎郭大圖

第一種

メニイアンテス。ニームポイテス、羅 プロムペンアクチケ。ロイグブルム、
 ヌケレイ子。ゲーレ。プロムペン 蘭



第二種



カバアタ

金銀蓮

前種ト同處ニ生シ。一種大葉ナルモノニノ大サ五寸許。葉下不達ノ處ヨリト數梗
 ヲ出レ花ヲ開。形前種ニ同ノ稍小ニノ。剪縁毛アツテ白色。瓣心帶黃實礎柯子状ニ
 ノ長。帶褐色。一柱頭扁尖ニノ白色。雄蕊五ニノ葯黒褐色。附實礎兩莖郭大圖

第二種

メニールアンテス。イニチカ、羅
 ヲーストイニチセ。ロイグブルーム 蘭



平林村及世論不傳イテ本朝
 新ニハハニノ水ニテ、其
 葉ヨリ




白欽 通名

啓蒙說草狀可見葉柄ニ對シテ一莖鬚又一花莖ヲ出シ細梗アル細花ヲ攢簇ス
五尖花尖瓣狀五瓣ニメ淡黄色背淡暗紫色ヲ帶實礎牀ニ藏レ一柱僅疣瘡雄蕊五
ニメ黄藥花後實ヲ結フソノ狀亦啓蒙ニ詳ナリ一種細葉ノ品アリ熊野ニ産
附金花三倍圖

第七種

按ヒチナス。アルボレア、羅 ペーテルセーリーブラーダケ。ウヰンカールド
蘭ノ形狀林氏所說不密ドモ本條ニ合ス宜他書ノ校ヲ得テ當否ヲ斷スベシ



平林在哉

アサガホ

牽牛

人家多ク種之形狀衆所通知ニシテ。花形花色ノ變態種々。葉形亦不一等不暇枚舉。故
今昔常ノ一種ヲ圖シテ。他皆畧之。啓蒙其畧ヲ載可見。概スルニ。莖半披針狀五片。莖
下ニ小葉アツテ護之。實礎柯子狀一柱結頭。五雄莖筒ニ出テ短葯

十七種

イポモイア。チリロバ、羅

ザリークツアヒゲ

トレクテルウィンテ、蘭

按林氏所載形狀粗ナレ。凡印葉圖可見。又春氏西勃氏共證之。鐸氏所載ノ「フラワー
ウエ。コロクステンスウィンデ」ナルモノ、圖說ハ。全クムメサキアサガホニ的
當ス



卷之四

五圖一

十八

平林左藏

ハリアサカホ 天茄兒

蔓葉共ニ多液滑澤。葉形ツルムラサキニ似テ大ニノ薄ク。蔓ニ柔刺アリ。葉腋花ヲ
 出ス。アサカホノ如ク。萼五片ニノ亦多肉。花^上旋花ノ形ニノ淡白紅紫底ニ濃紫暈
 アリ。實^下礎兩蓋アサカホト一般故ニ不圖。花末後放テ暮ニ至ル。花後梗曲ツテ點頭。
 莖多肉柔滑ニノ可食。實熟シテ亦アサカホノ如シ。

按林氏第十種ニ舉ル。「イボモイア。ボナ^羅グーデ。ナグト。トレクテルウ
 イン^グノ葉形及莖ニ刺アリ花暮ニ萎ム等ノ^ト。本條ニ合スレ^ル。其文簡且一處
 ニ三花ヲ出スモノ、如キニ嫌アリ。宜ク他ノ可較ノ書ヲ得ノ日ヲ俟テ。當否ヲ
 決スベシ



ヒルガホ

旋花

啓蒙形状ヲ詳ニシ。且大小二種アルヲ載ス故ニ略之。花漏斗状。萼五片形卵圓披針狀。萼下ニ又二小葉アツテ包之。子室柯子狀ニシテ各收一子。一柱頭二裂ニシテ匙狀雄蕊五葯。羊角様淡黄白色。此品地ノ肥瘠ニヨツテ大小ノ變アレ氏。各本分ノ葉形アリ。今所載ノ全圖ハ小葉種ニ係ル。別ニ大葉種ノ一葉ヲ添テ其列ヲ示ス。

コニホルスルス。アルスニシス。羅 アケルウインデ、蘭

ケレイ子。ウインデ、鐸氏

林氏云此品草小ニシテ葉二則。本末皆銳。根細延長云云。按本邦ノ小葉品ニ充ル。

ゴンホルフルス。セピユム、羅 ハーグ。ウインデ、蘭

コローテ。コロクスケンス、鐸氏

林氏云此品草大ニシテ葉尖短ノ不銳。根細長云云。按本邦ノ大葉品藤長苗ニ充ル。又云二種共ニ根ノ白汁ヲ煎熬ノ峻下劑ヲ製スベシ。




藤長苗

一種ヒルガホ

余未詳産地。莖葉總テヒルガホニ似テ短小ニシ。彼ノ如ク長蔓纏スルニ至ラズ。葉長サ纒ニ二寸許互生シ。葉脈一花。莖苞共ニ常種ノ如ク。花半披針狀五瓣。每瓣齒縁ノ二刻缺アリ。色淡紅大サ一寸餘。花開テ二三日ニ堪ユ。生植部ノ狀ニ於テハ。ハマヒルガホニ同シ

林氏第三十七種ニ所舉ノ「コンホルスルス。ペンタペタロイデス 羅 へーフブ
ラーデルアクチケウインデ」蘭ノ形状大ニ相似レ。凡ソノ説簡ニシテ不詳。姑他書ノ
參較ヲ俟



リウキウイモ

其語

草形根状諸書ニ詳ナリ。故ニ略之。秋葉腋花莖ヲ出ス。三四寸。莖頂短梗ノ四五花ヲ以テ房状ヲナス。花天茄兒花ニ似テ筒短潤。色淡紫殆白色。花底ヨリ筒内ニ向テ淡紫暈アリ。實礎指圓ニノ一柱結頭白色。柱本實礎ノ外面ニ長白毛アリ。又黄色血状五稜アル蜜槽アツテ圍之。雄蕊長短不齊ノ五莖ニノ葯白色。萼大小五葉。附雌

蓋蜜槽郭大圖

第十三種

コンホルフルニス。バタ、ス、羅、パタテンウインデ、蘭

按林氏標者中ニ蔓ニ刺アルヲ載レバ吾甘藷ト異種ナルが如ナレバ。ソノ根ニ紅白ノ二種アツテ餌食ノ要品トルヲ云ニアツテハ甘藷ト全ク同ク。春氏ハ別ニ「コンホルフルニス。エドリュ」ノ名ヲ下セ凡。西勃氏ハ直ニ林氏ノ名ヲ用レバソノ別品ナラザルヲ證スルニ足ル。又云甘藷ノ柱頭ハ「イポモイア」ノ常套ニメ之ヲ「コンホルフルニス」トスルニ嫌ナキヲ不能。姑俟識者之斷



啓蒙載之。即千口クエンサウノ白花ナル者ニノ。花葉口クエンサウニ略同フノ葉
 微大リ莖葉毛ナク。花梢葉腋ニアツテ房ヲナシ。形卵圓披針狀ニノ殆ント五瓣白
 色等五出花後双角ヲ結フ長ニ寸許。内ニ多扁子アリテ冠毛白絮ヲナス。總テ似類
 ノ諸種ミナ然リ。故ニ蘭ニコレヲ一屬トシテセイゲイデフルク^上。セイゲイデハ實ノ蘭系アリ
 ノ總名ヲ下ス。此屬ノ莖ハ一家ノ殊態アツテ他ト不同。ミナ花心ニ一圓體ヲナシ
 五尖ノ蜜鱗ソノ下體ヲ堆シ。鱗下五雄蕊アリ各頭圓體ノ頂下ニ並フ。葯ハソノ裏
 ニアツテ表面見ル處ノモノハ。蘭様蓋ノ帽ト一般ニノ即葯ノ苞ナリ。又圓體ノ頂
 ニ雌蕊柱頭ノ如キ有アルモノモ亦柱ナラス。只兩蓋ヲ被フ具ニ係ルソノ用實礎
 ハ體中ニ潜居シ。麥粒狀ニノ二箇各頸柱ヲナシテ相並フ。ツルカレハ。スバメノオ
 大圖ヲソノ形色各種々アツテ些少ノ不同アレ。率子此標的ニ不外。故ニコ、ニ
 詳之。此品ノ主用藥鏡徐長卿ノ下ニ載ス

按林氏所說并阿須氏圖說等本條ニ的當ス。幾尼補氏印葉圖ハ蔓生イヨカヅラ
 ノ如シ。二種モト同屬ナルヲ以テ混之ナラン。宇氏本條ヲ徐長卿トス今改シ



ロクエンサウ 白薇

莖葉クサタチバナニ似テ微大ニシテ白毛アリ。夏月梢葉腋毎ニ數花簇生ス。形クサ
タチバナニ似テ。瓣尖好テ反シ。色紫黒。莖并ニ實状亦クサタチバナト同シ。

按前條ト同屬西書中未見載此種



ツルガレハ

白薇一種

山中樹陰ニ生ス。伊吹山尤多シ。脚葉大ニシテ柿葉又桐葉ニ似テ。長七八寸幅六七寸
 ニノ尖リ。近ク兩對シテ殆_ト四葉相對スルガ如ク。梢ニ至テハ遠隔對生シ。形漸ク長
 ノ小。莖細長五六尺。末ニ於テハ頗ル蔓本ノ香ヲナス。故ニツルガレハノ名アリ。夏
 梢上并葉腋細梗分叉シ細花ヲ簇生ス。形スマメノオコチノ花ニ同フ。色暗紫。莖
 形實状似類ノ常套ヲ具ス 附一莖體 二去莖體見實礎共郭大圖

第十五種

アスクレピアス。ニグラ。羅


ズワルテ。セーデー。フルグト 蘭



ロクランサウ ヒゴロヤクセン

余産處ヲ不詳。葉スマメノオゴケノ如ク狭クノ短柄。色白粉ヲ帯カ如ク。莖細ノ直立。肥大ナルハ高三尺ニ超ヘ。葉モ稍大ニノ綠色更ニ深シ。稍葉腋梗ヲ出シ。分叉淡黄花ヲ開ク。スマメノオゴケノ如ク。生殖諸部亦畧同シケレバ。瓣内ニ扁頭五蜜鱗アリ

按前條ト同屬ニノ種名未考



結丸和氣



スミヤク

スッサイコ

徐長卿

莖高二三尺細メ剛ク。葉細長柳葉ノ如ノ鋸齒ナク對生。梢葉腋花莖ヲ出シ多ク分
 叉シテ花アリ。萼五出。花五瓣半披針狀ニシテ邊縁外反シ。淡黄綠色ニシテ微ニ暗紫暈
 アリ。生殖部大抵白薇ト一様ニシテ。圓體ノ外ニ更ニ五蜜槽アツテ圓之。其狀又一奇。
 以郭大圖示之。根似類ノ根ト同様味辛 附全花郭大圖

第十七種

アスクレピアス

フルチコサ、羅

ヘーステリケ

セーデフルクト蘭

林氏所說簡ナレドモ印葉圖可證



安林丸不純蘭ニハ不精ナリナリ葉圖可證
 アスクレピアス。フルチコサ。ヘーステリケ。セーデフルクト蘭
 林氏所說簡ナレドモ印葉圖可證

白梅一盤

タウワタ

白薇一種

蘭舶載來ノ種ニノ漫ニフラ、ト又タウワタト稱ス。莖高二三尺葉柳葉ニ似テ鋸齒ナク大ニノ對生。春下種シ晩夏ニ莖頭十數稜織狀ヲナシテ花ヲ放ク。暖地ニア冬不枯初夏花アリ。寒地ニテ土管ニ養フモ亦然。莖披針狀五葉。花亦五瓣色朱紅。開ケバ則瓣全レ尖微ク反起シ中心ニ一莖タチ僅ニ一分許。頭軸様ニノ杵ノ如ク頂平ニノ邊緣ニ五ノ雲頭齒ヲナシ。每頭下側ニ雄蕊アリ。總テ黄色頭暗黒。別ニ五蜜槽アツテソノ外側ニ並フ。形半缺漏斗ノ如クノ中心一角ヲ出ス色深黄。以上諸事一去可脱。脱後實礎初テ見ユ。形突粒ノ如ク頭柱ヲナシニ顆相並ブ。白薇ト同シ。此品ノ一殊態ハ外面ニ蜜槽並列スルニアリ。花後長角ヲ結ビ茹尤多シ。附一蜜槽。二杵頭雄蕊。三實礎。共郭大圖。

アスケレピアス。インカルナタ、羅 フレートスコレウリゲ。セーデフルクト、蘭

按林氏所說簡ニノ不詳トモ印葉圖可證



スゞメノオゴケ

白前

余未知白前
辨只從先輩說

一科數莖ヲ叢生シ。高一二尺。葉短柄橢圓ニシテ微毛アリ。葉腋花莖ヲ出シ分枝多花ヲ攢簇ス。花ロクエンサウト同ノ小。瓣尖好テ子シレ。色淡紅或ハ白ノ二種アリ。莖狀下條種ト同レ

按以下三種ミナ「アスクレピア」ノ屬ナレバ未考其種名



前條ノ一種莖長ク延テ蔓様ヲナシ花稍小ニメ淡黄緑白色。生殖諸部一般異ナリ



三十三 平水在哉

ツルモウリンクワ

産處未詳。漫ニツルモウリンクハノ名アリ。蔓本黄花ノスヰメノオガケノ一種ニ
 ノ。藤蔓長ク延。冬亦不全枯。葉スヰメノオゴケヨリ差短小ニノ。老レハ面背共ニ淡
 紫色ノ細點ヲ帶ヒ。莖亦帶紫。葉腋花ヲ綴ル。五瓣淡黄色。形相似テ瓣尖彼ノ如ク反
 スルコトヲ必トセス。生殖部形亦同ケレトモ。暗紫色ノ暈點アリテ蜜鱗ノ形分明ナ
 ラス。



カ、イモ

蘿摩

草狀啓蒙所說可見。但ソノ花實所ヲ異ニスト云ニアツテハ猶缺詳。萼半披針狀花
 鐘振五裂瓣尖反捲シ。色外面灰白内淡紫ニノ白毛茸々。又白質白毛ノ一種アリ。共
 ニ花心ニ鈍五稜ニノ頭細長端微ク曲ル一體アリ。五蜜鱗ソノ下體ヲ擁シ每稜暗
 紫色ノ一點ハ即雄蕊又蜜鱗上ニ白色帽狀ノ薄片アリ。ソノ裏ニ深黄色ノ葯各二
 筒ヲ並フ。已上ノ諸事ヲ本レバ下ニ實礎アリ。形扁圓頭二柱ヲナシ色淡緑ナルニ
 箇並置ス。ソノ狀白薇類ノ莖ト大同小異 附莖體郭大圖

按本條ト下ノキシヨラントイケマトノ三種ハ。草形相似テ共ニ莖葉ヲ斷ハ白
 汁ヲ出シ。又莖中白絮アル等全ク同屬ノ如クナレトモ。花莖ノ形大同小異アリ
 テ必ス一屬ト斷シ難シ。林氏列舉スル處ノ「セーナンム」羅「ウルドコロイ」蘭
 「アポセトヌム」羅「ホンツド」蘭「ベリプロカ」羅「スリンゲルブラン」蘭ノ三種
 亦花形莖狀相似テ屬ヲ異ニス。ソノ「セーナンム」ノ殊標ハ專ラ蜜槽尖圓ナル
 ヲ以テス。思フニ本條ノ莖頭尖長ナルニ當ル。就中ソノ第二種「アムトム」羅「ゲス
 ビ」蘭ハ、鐸氏ノ「エー」ルステ。ベリプロカ。又アポセーロピト同物トス。鐸氏ノ
 圖說ヲ閱ルニモ亦本條ト的當ス



キジヨラン

牛爛菜


勢州遠州等ニ多ク。藤蔓長ク延テ經冬不枯葉對生。形圓尖ニノ厚クノ肋脈分明。秋梢葉腋莖ヲ出ス。一寸餘。十餘ノ有梗花ヲ簇生シテ球状ヲナス。萼鐘樣五出。花亦五瓣鐘樣不正開。白色ニノ爪ニ白毛アリ。中心ニ鈍五稜ノ一蓋体アリ。雄蕊暗赭色短メ稜上ニツク。又白色ノ鱗樣膜アツテ各面ノ上ヲ被フ。ソノ膜ヲ撥開シテ葯初テ見ユ。葯ハ形卵圓ニノ莖頭ニ密附セズ。ソノ兩側ニ各一ツアツテ細莖ヲ以テ本莖ニ連リ。子室ハ牀上ニ潜居スルコト等。似類一般ナリ。

白蓋并ニ以上三種ノ屬ニアソ
今此条ニ於テ雄蓋ノ形ヲ
テハ蓋体大抵ソノ趣ヲ同クス
説ト尤切實トス宜併考

附 一 全花撥開辨見諸事 二 蓋体全形 三 撥開鱗樣膜
露葯 四 示雄蓋與葯連續狀 五 子室共郭大圖但第四者照第一鏡製之

第五種
アホセーヌム。レチト。ラトム。羅。ゲアーデルデ。ホンツド。ト。藤

按林氏此屬ノ概標ニ云。花鐘狀ニメ輪開セズ。五ノ腺樣蜜槽各刺毛ノアル有テ雄蓋間ニ於テ實礎ヲ圍繞スト



イケマ

牛皮消

蔓長ク延テ帶紫色。葉對生。形カ、イモノ葉ニ似テ差短ク薄ノ光澤ナク。夏葉腋細莖ヲ出テ二三寸。繖狀ニ花ヲツク。萼五片。花輪様五瓣。花心一柱五蜜鱗アツテ五枝。花瓣ノ爪僅洞様ヲナシ。内ニ淡黄色ノ葯ヲ藏シ。前面又鱗狀一起アツテ柱體ヲ擁ス。其狀頗ル奇ナリ。後ニ小莢ヲ結ヒ。内ニ白絮子アル。前ノ二條ト同シ。 附一全

花 二挾出一瓣見洞并鱗狀共郭大圖

按此種ノ花形蓋狀。前ノ二條ト又一異趣ヲナス。林氏「ベリプロカ」羅スリンゲル
 フラン「蘭ノ殊標云花輪様。蜜槽生殖部ヲ擁シ。五雄葯コ、ニ出ト。即本條トソ
 ノ趣ヲ同フス。就中ソノ第一種。クレカ羅セーリセ「蘭ナル者。ハ鐸氏ノ「テウーデ
 又コロイペンテ。ベリ。プロカ」ニノ形狀大ニ近シ。若不正當モソノ屬タルニ論
 ナレ




ヘクソカツラ

女青

啓蒙草状ヲ詳シ。且大葉小葉圓葉長葉ノ種々アルトヲ載ス。故ニ略之。共萼鐘状五
 出。花筒様五裂白色紅心。實礎圓ニノ二柱。細ノ如糸。淡紅色ニノ端末花喉ノ外ニ出。
 五雄葇筒中ニアリ。葯黃褐色

ペテリア。フーチダ。羅

スチンケンデ。カナプベゼン。蘭



アカザ 藜

アカザハ嫩葉鮮紅色。シロアカザ灰藜ハ白メ塩ヲ撒スルカ如ク。ノアカザ野灰菜
 ハ。苗葉差小ニノ白色微紅ヲ帶。カハラアカザハ。苗小ニノ葉形細長。ハマアカザハ
 葉厚ノ大ナル等。ノ異アレ。庄。シナ枝頭并ニ梢葉腋ニ細梗ヲ出シ。細碎花ヲ點綴シ
 テ糖ヲナス。形圓尖五瓣。淡緑ニノ別ニ萼ナク。實礎扁圓ニノ二柱。雄蕊五ニノ。黄
 葯。後實ヲ結ブ小ニノ黒色雞冠子ノ如シ。故ニ只本條ノ一圖ヲ載テ略シ。他 附一全
 花 二實礎兩莖共郭大圖

第三種

セノポリユム。ルユアルム、羅

ローテ。カンセフート、蘭

藜

第六種

セノホヒユム。アルブム、羅

ウッテ。カンセフート、蘭

灰藜



ハ、キッ

地層


春下種シ苗高三四尺。枝葉繁密葉互生深綠色形披針狀小ニノ微毛アリ。夏母葉腋一或ハ二ノ細碎花ヲ綴ル。萼鐘狀圓尖五出ニノ無花瓣。雄蕊五莖上ニ立チ葯黃色。實瓊扁圓ニノ二柱。後萼ト併シテ實ヲナス。一種イザリハ、キッ。又大ハ、キッ等アリ。大小不同レ凡花實ニ具ナシ。共ニ衆人多ク種植シテ詳其狀故ニ畧シ。附一全花 二半熟實共郭大圖

第十六種

センクボチユム

スコパリア、羅

ベーセンコロイド、蘭



ハ、キッ、夫ニモハ平宜甚故、并林丸等干此

水汁ハ、蒸イタハナ、不熟ニ切ス。林丸ハ并附々切熟、鐵盤裏下

品ハ双全蘇故品ハ鐵盤裏下、林丸不見其事共ニ切

林丸品ハ、蒸イタハナ、不熟ニ切ス。林丸ハ并附々切熟、鐵盤裏下



アリタサウ
ルウダ
土荊芥

莖高サ一二尺。色淡緑ニノ線稜アリ。葉互生形披針状ニノ微々鋸齒様ヲナシ。每葉腋細碎花ヲ攢簇ス。花雌雄不同。雄者數少ク雌者數多ク形尤小ニノ雄花ノ下ニアリ共ニ無瓣。萼鱗形五裂或ハ四裂雄者五蓋ニノ或ハ三或ハ四ソノ裂數ニヨル。黄葯。雌者ハ實礎圓尖ニノ三柱或ハ四花間又枝ヲ出シ枝葉間亦花アリ。莖葉香アリ烈メ不佳。恰モ芸香ノ如シ。附一排開雌花萼見實礎。二雄花全形共郭大圖

セノボケム。アマブロシナイデス。羅 ウェルリーケンド。ガンセフート。蘭

按此品無瓣細碎五雄蓋花ヲ葉腋ニ攢簇スルノ形アヤハヤ藜地膚等ノ形ニ似レ凡彼二品ハ双全花。此品ハ雌雄異花ナレバ同屬ニ收メガタシ。林氏不及其事共ニセノボケムノ屬トスルモノ不愆ニ似タリ思フニ林氏ノ徒偶々此種ノ雌雄異花ナルヲ不檢ノ失ニヨル乎宜考殆ク從林氏収于此



一
二

五圖二目
四十二
平木在載


マツナ

鹹蓬

海邊沙上ニ生ス。莖高三四尺。多枝ヲ分チテ踈疎。葉松葉ニ似テ粗短ニノ散布ス。夏
 枝梢ニ穂ヲナシテ花アリ。萼小ニノ三片淡緑白色。花鐘狀五裂。實礎癭粒狀ニノ二
 柱共ニ綠色。雄蕊五ニノ葯淡黄綠色。後瓣合ノ實礎ヲ包ミ熟スルニ至ツ子黑色。莖
 葉鹹味多シ故ニソノダヲ造ル專此草ヲ用ユ。是以テソノダノ種名アリ。 附一葉

ニ全花 三實 四花背共郭大圖

第四種
 サルソラ。ソノダ 羅 ヲンゲドールデ。ローグコロイド、蘭



享保年間韓種ヲ傳テ官園ニ種ユ。故ニオタ子人參ノ稱アリ。今諸州多ク播殖ス。一莖高尺許。三極ヲ分チ。每頭一莖短柄五葉。形披針狀ニシテ細鋸齒アリ。極心一花莖ヲ抽ク。一五七寸。頂ニ有梗十餘花ヲ繖簇シ。略球狀ヲナス。繖等針狀數葉。花半披針狀。五瓣大。一分餘。色淡綠白。萼鐘狀。五尖。即裸子室圓扁ニシテ二柱。雄蕊五ニシテ白。花後實熟スルニ至テ圓扁赤色。内ニ二子ヲ収ムルヲ以テ多クハ二膨ヲナス。肥根ニハ熟實多ク瘦根ニハ不熟實多シ。子下地シテヨク生ス。初年ハ三葉。二年五葉。三年二極五葉。四五年ニ至テ三極五葉ヲナシ。初メテ花ヲ生ス。經年肥大ノモノハ四五極ニ及ビ。花莖亦枝ヲ分ツモノアリ。根圓長直。下手指ノ如ク。又問。二三叉ヲ生シ。所謂人形ヲナスモノアリ。雀巢菴吉田氏云。本曹園中ニ種テ二十五年ニ及フモノアリ。根多岐ヲナシ。其量二十錢ニ餘リ。毎年結實二百餘ヲ得。又云。種殖ノ多キ。往々根鞭様土參ノ根形ノ如キアレ。味彼ノ苦キガ如クナラズ。

バナキス。キインキ。エホリユム。羅ヘー。フアラーダク。ヘイルウ。ルテ。ル。

按林氏云。拂蘭西人之ヲ米里堅ノ加納達地名ニ採テ。支那ニ輸レテ大ニ利ヲ得ル

モノニシテ。即漢人ノ所謂「ギンセン」也。日本人ノ「ニンジン」也。其

所說ノ莖葉花實根形總テ韓種ノ人參ト全ク一般異ナクシテ。ソノ同一種タル

ヲ不容疑。阿須氏亦精圖アリ。可見。西船所輸ノ根ハ。漢人ノ所謂西洋人參ニシテ。吾

邦人之ヲ廣東人參ト稱スルモノナリ。根形韓種ト一様ナレトモ。微ク鬆疏ニシ

韓産并吾邦所裁ノ品ニ比スレバ。滋潤差少シ。思フニ產地ノ不同ニヨルカ。或乾

蓄ノ法不同ニヨルナラン。西船廣東ニ輸スルヲ以テ。吾邦人ノ廣東人參ノ稱アリ

ル亦宜ナリトス。先師之ヲ別種トシ。遂ニ非人參說アルモノハ。西書ヲ不讀ノ誤

ニ出ル。不待言可知。又林氏舊說ニ。木条ヲ吾邦ノ人參ニ異ナリトスルノ誤ハ。賢布兒氏人名ノ訛傳ニ因ル。ムカゴ人參ノ下ニ詳ニス。又林氏本條ヲ第二十三

トチハラ人參

土參

深山樹陰七葉樹下等ニ多ク生ス。故ニトチハラ人參ノ稱アリ。葉形花狀韓參ト一
 般難辨。或ハ葉ノ中筋上ノ細毛。韓種ヨリハ差粗ニノ強ク。雄蕊差長カ如クナレト
 モ。確徵トシガタシ。只實礫圓ノ熟實ノ形圓ク。頂上黒色輪狀ヲナスノ異アリ。又ソ
 ノ黒輪ナキモノアリ。根ハ多クハ圓ノ管ノ如ク。長ク横ニ延テ有節。味苦メ韓種ノ
 甘而微苦ナルニ異ナリ。又或ハ直根韓參狀ノ如ク。又圓ノ珠狀ヲナシ。又延長行根
 ノ末圓長塊結ヲナス等アレバ。葉狀ニナ一般ニノ異ナク。又直根ノモノ經年久ニ
 至ツテ。延長鞭形ヲナスニ至ルモノアレハ。此種必此根形ヲナスト斷シガタシ。又
 葉狀ニ些異ナル種。又熊野ニハ三葉一莖ノ種アリ。附全花并莖郭大圖

按ニ本邦所産ノ人參ニノ。產地ニヨツテ根形氣味ヲ異ニスルモノ、如シ。先師
 花鏡ノ土參トス或然シ。西書中此種ヲ載ルヲ不見亦ハナキ区ノ一種ニ可收



卷之四

五編二目

四十七

平林在藏

リンダウ

龍膽

啓蒙詳其狀。葉卵圓披針狀ニノ三縱道アリ。無柄ニノ對生。莖鐘狀ニノ針樣五尖。花筒様ニノ膨大五裂ノ圓尖。每裂間又各一小尖アリ。實莢五稜頸延テ柱ヲナシ。中間微ク粗ノ扁。頭二裂ニノ反捲シテ白色。雄蕊五ニノ葯淡黃褐色。附兩莖本分圖

第六種

ゲンチアナ。サボナリア、羅

ザリールビゲ。ゲンチアーン、蘭

按林氏ゲンチアナ三十一種ヲ舉ク。其普常藥用トナスゲール。ゲンチアーン。ナル者ハ形大ニ花黃色根亦大。舶來品ヲ按ルニ粗大根指ノ如キアリ本邦未見其種。今本條ノ品。味峻苦ニノ功亦大ニ劣ラサルニ似タリ。宜ク代用スベシ。



卷之四

五綱二目

四十八

草木部

オヤマリンドウ

キヤマリンドウ共花戸稱キヤマノ稱ハ
白山半腹樹木叢生ノ處ニ生ルニヨル

北地高山ニ生ス。草状近道所産ノ品ニ同クメ。只莖不高ノ粗ク葉闊花微大ニノ色
不濃。根肥大性々拇指大ノ如ク。殆ト西船載來ノゲンナアナ根ノ如シテ。苦味大ニ
劣ル。若採収得時ハ不然トアラシ。余未檢レ



藥生リンダウ

蓬嶺ノ産高サ不及尺夏花ヲ開ク花形葉狀常種ニ同ノ只小



アサマリシダウ

南勢朝熊山ニ産ス。故ニソノ名アリ。莖高一尺許。葉普常種ヨリハ短クノ本末共ニ殺銳。葉葉圓尖。花碧色ニ細白點アリ。生殖部異アルヲナシ

未詳種名



蘇一スハニ寄ヤナク

蘇林丸代路路丸圖共ニ




又ニ蘇正ニハ葉葉圓尖ノ苦

北地高山駒嶽立山等ニ産ス。根葉披針狀ニノ狹長。莖ヲ抽ク一尺許梢葉ハ差短小
ニノ三縱道アツテ對生ス。五月梢頭岐レテニ花ヲ並フ。形リンダウノ如ク大開展
セス。白色ニノ淡黄暈綠色細點アリ。萼長ノ稜アリテ五細葉ヲ放キ實稜角様頭僅
ニ義シ。雄蕊五ニノ淡黄莢。根細ノ苦シ。附開花體見實稜兩莖一倍圖

第五種


ゲンチアチ。プ子ユモンテ。羅。ケレイ子。ブラーユウエ。ゲンチアチン。蘭
ドイセントスコーン。又ブラーユウ。レリケンス。鐸氏
按林氏所說鐸氏圖。共ニ本條ニ的當ス。只ソノ花色ノ碧ト白トノ異アレドモ。同
種トスルニ害ナキカ



ツルリンダウ

山麓陰地ニ生ス。大略形リンダウニ同ノ。莖細長地ニ塌シテ蔓延シ。往々傍側ノ草木ヲ纏フ。脚葉リンダウヨリ差大ニメ本濶ク末尖鋭五縦道アリ。梢葉腋毎ニ三五花ツ、簇生數層ヲナシテ。リンダウノ梢頂ニノミ花ヲ生ルト不同形色リンダウニ同ノ。萼小。兩蓋亦同シケレトモ。花老ニ至テ雌蓋漸延テ紅實ヲ瓣外ニ挺出ス。形卵圓桃葉珊瑚ノ實ニ似テ小。内ニ多ノ扁細子ヲ收ム。時ニ花瓣猶存ス。一種葦野山ニ産ルモノハ同形ニメ花色殆ト白シ

按亦「ゲンチアナ」ノ屬ニ可收西書中未見此種




ゲンチアナ
葉十六
花
心
小
大
十

ハルリンドウ

石龍膽

原野ニ多ク滋湿ノ處尤ヨク生ス。根葉圓尖十數地ニ敷テ窠ヲナシ春莖ヲ抽キ直立三四寸。尖卵圓ノ小葉ヲ對生シ。四月梢上ニ三五花ヲ簇生シ。日中ニ開キ暮ニ收ル。形リンドウニ似テ小ク。大小十裂殆ト十瓣ノ看アリ。一種莖多ク枝ヲ分ツモノ又小ニメ葉背帶紫色花亦小ナル等數種アリテ每品葉形ノ些異又結實ノ狀不同等ノコアレドモソノ草小ニメ花候必ズ春ナルニ於テハミナ同ニ故ニ今一々セズ

第十六種
 ゲンチアナ。アムアチカ、羅
 ワーテル。ゲンチアーン、蘭



スズカキク、コク、
 葉三葉

葉小亦白葉大也



八綱本ニ傳譽其ノ葉形ノ異ニシテハハノ根莖多クハハノ莖ニ
 アトモ由テ葉ハハノ莖多クハハノ莖ニ
 葉形ノ異ニシテハハノ根莖多クハハノ莖ニ

センアリ

苗高七八寸。方莖暗紫色。葉狹細長一寸餘對生。葉腋枝ヲ出シ。秋ニ至テ莖頭枝梢ニ
 三五花簇生ス。梗寸許萼狹細五葉。花輪様五瓣披針狀。白質背淡紅紫暈面同色ノ縁
 條アリ。實稔麥粒狀頭僅ニ哆キ。雄蕊五ニノ葯淡紫。又每瓣ノ本ニ麥粒狀ノ二凹ア
 リ。色淡黃綠。凹縁ニ十或八十餘ノ白鬚毛ヲ具シ。恰モ子室ヲ雄蕊ノ圍ムカ如シ。根
 黃褐色ニノ細ノ硬ク味大ニ苦シ。一種潤大葉ノ品アリ。共ニ邦人抹テ腹痛ヲ治
 シ。又ヨク虫ヲ殺ス。草形略リシタウノ如ク。味亦苦ヲ以テ。龍膽ノ類トスレド。本條
 ハ瓣本ニ輪蜜孔ノ殊標アリテ。ソノ別屬タルヲ著シ。 附一全花三倍圖 二輪
 蜜孔并白鬚部大圖

第三種

スウルチア。ロクタ、羅 プラトブルーミゲ。スウルチア、蘭 春氏所定



センニチサウ

千日紅

人家多テ栽テ花ヲ稱シ花ニ紅白淡紅ノ種又並頭ノ品アルヲ等世ノ所通知故ニ略之。全花ニ總萼ナク。多ノ筒子花ノ聚簇ニ成リ。一殊態アルヲ以郭大三圖詳ニ

第一圖 一筒子花全形

甲 此二葉ハ花形ノ盛發ナレトモ。萼又苞ノ類ニ指テ花瓣トナスベキモノナラズ。除之ノ下又似類ノ數片アツテ共ニ一筒子花ヲ推ス。

乙 筒子花體

第二圖 除苞露筒子全形

丙 全體一筒子ニノ口五裂辨ヲナス。正開ノ時ニ在テハ每犬更ニ少ク裂テ半裂五辨トナル

伍 雄蕊葯即紅紫花瓣ノ中ニ黄色五出ノ細花状ヲナス

第三圖 開筒子見實礫兩蓋

戌 雄蕊

己 筒子花體

亥 雌蕊

辛 實礫

ゴムアレナ。ゴロボサ、羅 ヤールレークセ。ロンドブルーム、蘭



傳云此品天保年間蘭船載來。不詳其產處。漫ニセリヤーハン。又アルマモクト等ノ名ヲ稱ス。亦未詳其出所。春實生シ。葉莧葉ニ似テ鋸齒アリ。又ヌマ大根葉ニ似テ暗綠色ニノ微紫ヲ帶フ。莖葉脉尤多シ。葉對生。葉腋枝ヲ出シ繁茂シ易ク。高一二尺。每梢葉腋花梗ヲ出ス。一五六寸。頂ニ一花ヲ著ク。萼披針狀ノ多葉ニノ。花ヲ包ム。一亦ヌマ大根ノ花ノ如ク。花形略十日紅ノ如クノ頂尖ラス。其未開ヤ。色暗紅。已ニ開ニ至レバ淡黃。全體完筒子花ノ聚簇ニナリ。本ヨリ開テ末ニ至リ。數十日間不衰。實全ク熟スルニ至テ初テ其色ヲ失ス。實橢圓ニノ扁。赭黑色。頭ニ二長一ハ短刺毛。兩縁ニ短刺モアリ。花葉共ニ味辛ク殆ト胡椒山椒ノ味ノ如シ。試功頗多。林氏載之。

第一圖 一筒子花全形

甲 瓣尖

乙 苞萼ノ類。十日紅ノ紅紫葉ニ於ルガ如ク一般。然レドモコノ葉大小二片ノ

ミ 花未開ノ時暗紅紫色ヲ見ルハ。此包ノ花瓣ヲ包ムニヨル

第二圖 除苞露花瓣與實礎

丙 全體筒子ニノ口五裂尖ヲナス

丁 實礎

第三圖 開筒子見兩蕊

戊 瓣尖

己 雌蕊在筒中

庚 雄蕊葯深潜筒腹

辛 實礎

第三種

スピラントリス。アクメルラ。アクメルラ。アクメルラ。フラクブルーム。蘭

按林氏本第十九網聚成花中ニ収レトモ。他ノ聚成花ト其態不同。十日紅ト頗ル

其趣ヲ同フス。故ニ今此篇ニ載ス

本草綱目卷之四 五綱二目 其趣ヲ同フス。故ニ今此篇ニ載ス

大 草花 葉如荷葉

曰 仙蓋 有筒中

大 荷葉

葉三圓 開前子長兩葉

下 實如

丙 葉如荷葉 子三入口五葉如

葉二圓 葉前子長兩葉

其趣ヲ同フス。故ニ今此篇ニ載ス



二葉花ノクノノノノ品ノ無葉ナクノ品

葉材ノ葉十餘葉ニ日ノ葉ニ葉ハ大ニ

樹一甲餘餘出 其葉長兩葉 三

「大子子ハアバ」

尖鋭ニハ葉ハ八枚久大丸ニ葉五開

二葉ニ二株 根葉ニ四 部球色

葉數ハ二八

葉ニ二葉ハ

葉ニ二葉ハ

山倉藤

十フ

ハニチ

新出

チヤルメルサウ

メユキノシタ

虎耳草一種

山陰濕地好テ巖石ノ間ニ生ス。葉ユキノシタノ如シテ。楕圓^{甲種}ニノ尖。刻鋏鋸齒アリ。色暗緑帶紫脉條紫色。莖葉共ニ毛アル。ユキノシタノ如シ。葉間莖ヲ抽ク。一尺許。中間一小葉アリ。或ハナク。按林氏花莖ニ無葉トニ葉アルトニ因テ二種ニ分ツ。今ナルト又一葉アルヲ見レバ。チヤルメルサウヲ檢スルニ。生處ノ肥瘠ニヨツテ。無葉別ニ二葉ノ品アルカ未詳。梢ニ至テ有梗細花ヲ以テ疎穂ヲナシ。三月盛ニ開ク。萼鐘狀ニノ五出。花五弁紅色。纖細ニノ岐アツテ長ク曲テ萼ノ外ニ垂下ス。實礎萼ニ藏レ。二柱ニノ各頭僅ニ四裂シ暗紅色。雄蕊五ニノ黃葯^{乙種}一種葉差長ク刻鋏鋸齒尖銳ニノ。花魚骨ノ如ク七岐シ。萼正開シ二柱五葯共ニ淡黃白色ニノ。他ニ異アルコナキモノアリ

附 一甲種全花

二花瓣並兩蕊

三乙種全花共郭大圖

按林氏第十綱第二目ノ篇ニ舉ル。ミテルラ^羅。ロイグブルーム^蘭ノ下ニ花莖ニ二葉ヲツクルノコアルノ品ト。無葉ナルノ品トヲ以テ分ツテ二條ヲ出ス

其第一種有葉種ハ

ミテルラ。ヂペールラ^羅

テウーブラーダグ。ロイグブルーム^蘭

其第二種無葉ノ種ハ

ミテルラ。ヌダ^羅

ナークト。ロイグブルーム^蘭

此二種チヤルメルサウニ的當ス。只ソノ品第十綱第二目ノ「チアレルラ」^{ユキノ}ノ草ニノ的當ノ下條ニ載レハ。ミテルラ^{モ十雄蕊ナルベキニ嫌アレドモ}。ミテルラ^{種未考ヘス}ノ標看ニ。萼ノ縁瓣頗ル大ニ。花瓣鱗様ニ分裂シタル一殊態アルコヲ云。又幾尼福氏ノ印葉圖。亦的當ナレバ。疑ヲ容ルベキニアラス。蓋シ此品ユキノシタノ一異種ナルヲ以テ。五雄蕊ニ論ナク「チアレルラ」ノ下條ニ列セシナラン

チドメグサ

石胡荽

庭際普ク生スル處ノ雜草。細莖地上ニ蔓延シ處々ニ根ヲ下ス。葉初生ノ胡荽ニ似テ小。長柄上一葉ヲ著ク。葉腋長梗ヲ出シ。無萼ノ多花簇生毬状ヲナス。實礎扁圓ニ
 ノニ柱。花半披針狀五瓣。白色淡紅暈アリ。五雄葇葯黃色。花後扁圓ノ多實聚テ毬ヲ
 ナシ。内ニ細子ヲ収ム。一種大葉ノ品。又葉面長刺毛アルモノ等アリ。 附花實并多
 顆爲球狀郭大圖

所屬未詳



此ノ草ハ...
 五綱二目
 六十二
 平林莊藏

上糸一種大葉者

可山中ニコレア。草大ニノ時々擡頭シ。莖粗ク葉大ニメ寸餘ニ及ビ葉面脈上ニ細モアリ花實常種ニ同ノ。頗ル大ナリト



草木圖譜 蘇子四考



草木圖說前篇卷四終



