

草木圖說前篇草部

九八七六

細細細細  
下

七

植物		
數目	分記	註釋
二〇	一八	
學	縣	滋
校	中	習

植  
三

470.3
537
vol 7



彦立校  
印章  
草部

草木圖說前篇卷七目錄

第六綱下

第一目下

キチカクシ

蘭種キチカクシ

玉ホウキ

特生天門冬

シヤウブ

クワニオニサウ

桔梗ラン

ハリガ子カヅラ

ノウチク

大葉キチカクシ

クサスキカヅラ

キンコウクハ

石菖蒲

ヤブメウガ

キンバイザ

ヲモト



ムラサキオモト

上糸一種

エラン

玉川ホト、ギス

ルイエウボタン

第三目

ギシギシ

スイバ

ハナゼキシヤウ

ミツオバコ

サジラモダカ

第七綱

アダン

アナ、ス

ホト、ギス

山荷葉

カラスノアブラ

同雄者

イハシヤウブ

ハンゲンヤウ

ヘララモダカ

第一目

ツマトリグサ

同一種

第八綱

第一目

ヤナギサウ

マツヨヒグサ

タゴボウ

第三目

ソバ

タニツバ

長葉ウチギツカミ

マ、コノシリヌグヒ

アカバナ

ツキミグサ

ゴローテスパーンセケルス

ミゾツバ

ウチギツカミ

イシモカハ



ワルツバ

ハルトラノオ

クリンユキフデ

ホソバタデ

ヤナギタデ

イヌタデ

ハナタデ

ホントクタデ

子バリタデ

サクラタデ

白花サクラタデ

ニホヒタデ

イブキトラノオ

一種細葉者

タデ

イトタデ

カハタデ

サナヘタデ

矮生イヌタデ

ヌカホタデ

白イヌタデ

同一种

オホイヌタデ

オホケタデ

アサ

メイゲツサウ

第四目

ツクバ子サウ

エシレイサウ

ヒメウズ

同一种

アリノトウダサ

第八目

ヤマゴボウ

第九目

第三目

イタドリ

何首烏


八葉ツクバ子サウ

キヌガササウ

キツ子ノオ

レンブクサウ





草木圖說前篇卷七

大垣

德齋

飯沼長順

著



Faint vertical text on the left side of the page, including the characters '草部' (Grass section) and '第六綱下' (Sixth section, lower part).



キヂカクシ

莖高二尺許。圓ノ線條アリ。多ク枝亞ヲ分チ。ソノ本ニアツテハ多ハ六七葉。他ハ三葉或ハ二葉一處ニ攢リテ互生シ。枝端ニテハ大抵四葉ヲ冠ス。母天門冬ニアツテ此類ノ葉形三種ニメテ微ク匂リ。枝本ノ下側ニ膜様針狀ノ小片鱗アリ。春枝本並ニ枝木ノ葉ト共ニ四或五ノ細白花ヲ著ク。無萼ニシテ披針狀ノ六瓣。總ニ開哆シ正開ニ不至。實硬柯子狀頭一柱ヲナシ。頭ニ白色ノ三起アリ。六雄蕊アレバ。次糸品ニ比スレバ短小ニシテ藥液黃殆ト白色ナレバ。斷ノ根トス。實熟ノ紅色南天燭ノ如シ。林氏云。稚草ヲ煮食テ莖葉トス。然レモ多ク食ヘバ石淋及ビ他ノ疾病ヲ起ス。根ハ開達放泄ノ劑中ニ葺シ内藏ノ閉塞ヲ除ク。附 一全花 二子室兩蓋共郭大圖

第一種

アスハラグナシ  
*asparagus officinalis* 羅

アスハルギ  
*asparagus* 蘭

大魚

新書

植物見取

卷

草木圖譜植物類考





莖葉頗ル前条種ニ同フシテ花ヲツクルコト多ク。辨亦同シケレド總ニ哆テ展開ニ至ラズ。實礎アレド小ニノ柱ナク。雄蓋稍大ニノ葯深黄色。曾テ實ヲ結ズ。蓋シキジカクシノ雄性種ナル者ナリ。其ソウチクノ名ニ泥ミテ別種トナスベカラズ。一種ヒメソウチクナル者アリ。形本条ニ同フシテ稍小ニノ莖葉柔ナリ。此種ニ花實アルヲ未見。按ニ本条ノ矮生種ニカ、ル。ソノ花實ナキハ特生ノ天門冬ニ於ルガ如キカ。附 一 全花 二 假實礎共郭火圖

按林氏前条種下ニ於テ雌雄異草ノコトヲ説ケバ。此種ノ雄草ナルコト言フ不待シテ知ルベシ。又云此類二十二綱ノ中ニ収ムベキモノ、如クナレド。姑ク林氏ニ從テ此部ニ併セ収ム






此草ハ蘭舶載來テ。龍轉ノ骨クアステルヒ一ノ名ヲ無ス。キダカクシ類中ノ最大ナルモノニシテ高四五尺ニ及ヒ。莖圓ノ線條ナク。枝葉テ婆娑。幹枝共ニ薄アリ。幹ニアツテハ殆ト鱗狀ニシテ。ソノ下側ノ正中ニ當ツテ一尖起リ。莖ニ刺ノ小ニノ軟ナルモノナリ。枝ニ至テハ分岐シ兩側ニ針様ヲナス。亦葉ニノ剛ナラス。葉細長針狀。葉邊ニ似テ細ク如糸。七九或ハ十餘モ一處ニ攢生シ。花キチカクシノ如クナレド。彼ノ如ク多カラズ。長梗アルト玉ホリキノ如ク。葉間ニ下垂ス。萼六出ニノ短小。花六瓣尖。瓣ニ開繖シ。色淡黄綠白。六雄蕊。雌蕊ニ出。實礎六縱道アル圓体ニノ柱ナケレバ。斷レテ假トス。此種諸實セズソノ雄性ナルト不待言 附 一 全花

第二種

アスワラギニム  
*Asparagus Delimitatus*

アツゲホーゲキ  
*Asparagus japonicus*






大葉キチカクシ

産處未ク詳ナラズ。前条ノ一種ニテ高三四尺。枝幹線條アツテ頗ル方。枝味ニノ葉  
差粗大微鈎ツテ鎌状ノ如ク。枝本籜ナク細針ノ如キモノ四五箇アリ。就中下側ノ  
一ハ微大ニメ匂リテ剛ク。殆ト刺ト稱スベシ

第三種

アスハラグニス  
*Asparagus foliatus*

カイスセシ  
*Asparagus japonicus*





亦キチカクシノ類ニメ。莖高一尺餘。圓ノ稜條ナク。粗ノ剛ク。色深緑ニメ。鱗形葉アリ。根際ヨリ多ク枝ヲ出入。枝六線條アツテ圓ナラス。葉多キハ五六少キハ三四。一處ニ横生シ。三稜ニメ粗ク。色亦深緑。花ニ梗アツテ下垂シ。蘭種品ノ花ヨリハ微大ニノ色褐ヲ帯ヒ。葯深黄色。實硬柯子狀ニメ長ク。殆ト麥粒ニ似テ尖リ柱ナクメ不結實。蓋亦前条一種ノ雄性ナルモノニ係ル。附 一全花 二實礎 共一倍圖

西書中未見此種名



ノハ大ニテ...  
又此...  
蓋亦前条一種ノ雄性ナルモノニ係ル





葉細ニノ尖リ。扁ニメ一側ニ脊アリテ微ク勾リ。二三葉ツ、一處ニツキテ互生シ。枝端ニ至テハ五七葉星狀ニ横生ス。新蔓ハ線條アツテ殆ト方。老幹ハ線條アレヒ方ナラス。新蔓ニハ枝本葉本トニ褐色ノ刺形アレヒ。膜絲ニノ剛カラス。老幹ニ在テハ殆ト剛刺ヲナス。夏葉腋ニ分計ノ梗アリ細花ヲ二三ツ、開ク。無萼ニノ花披針狀六瓣。大ヤ二分餘。淡黃白色。開放開スレバ則邊縁反卷ス。實硬柯子狀。頸延テ柱ヲナシ頭三裂。柱モト三ナレヒ併接一ナル如シ。雄蕊六ニノ約淡黃白色。葯狀板形。啓蒙ニ具載ス。故ニ畧之。余未タ此種ノ結實ヲ見ズ。姑期後檢。附 全花部大圖。

第四種

アスバハラケユス、  
*Asparagus retrofractus* ユス

アスバハルギ  
*Asparagus rugosus*

按春氏ハ林氏所舉第三種「セイリス」セシム。ブライヂヲ以テ天門冬ト譯ス。今林氏書ヲ閱ルニ。所説ノ形狀第四種ノ的當ナルニ不如。故ニ姑改之以テ俟後賢之考。又云キナカクシ天門冬ノ二種。枝葉ノ形ニ於テハ同類タルヲ勿論ナレヒ。花形殊ニ根狀ニ在テハ大ニ不同。林氏之徒言其事ニ不及モノ尤可疑。蓋シ別屬トセバ却テ穩ナラン。





余未詳產地。叢生特立高七八寸。莖接條アツテ殆ト方。葉三棱天門冬ノ葉ノ如ク稍小。大依三葉一處ニ出。梢末ニアツテ多キモ四五葉ニ不遇。根小ナレバ。ソノ掛根ノ形タルヲハ一般。根際節毎褐色鱗形ノ小葉アレバ。針狀ヲナサズ。余未見花實。蓋ニ矮小ニノ花ヲ生スルヲ稀ナル内。

按天門冬ノ一種ニシテ西書中ニ於テ未見載之



特生天門冬



特生天門冬

特生天門冬

特生天門冬

特生天門冬

特生天門冬



キンコウクワ

山澗濕漏ノ叢上ニ生ス。形イハシヤウブノ如ク花亦相似タリ。無萼ニメ花披針狀  
六瓣黄色ニノ背ヲ中道綠色。實礎柯子狀ニメ長ク尖テ柱ヲナシ。線條アツテ鈍三  
角。雄蕊六莖粗ノ毛アリ約深黄色。人柱々見テ花セキレヤクノ一種トスレ氏。生殖  
部不同ノ属ヲ異ニス。


ゲールレ ウェートル エホザレン 録氏  
*Gale matricarioides*

林氏所屬未考姑期後日



卷之七  
六  
九  
五





シヤウブ 白菖

春晚初夏ノ頃葉破ヨリ花

總ヲ出入長一寸餘形石菖蒲

ノ花ニ似テ粗大ゾノ未開ヤ只

龜甲故ヲナシ中心柱頭ノ頂ヲ露シ

六苞或ハ五苞ヲ以テ擁之巳ニ苞脱シ

葯開綻レテ兩蓋頭ヲ見ル開之實礎壺形ニノ

五稜或ハ六稜アテ五稜ナルハ五雄蕊六稜ナルハ

六雄蕊アテ葯黄色傘狀瓶形唇紫蓋之故ニ

略ス。主功藥鏡詳之。附 一全花 二瓣蓋共郭大圖

アコルニテ カラムニス *Acorus calamus* 雄 ゲノノ子 カラムニス *Juncus calamus* 雌

卷之十 六 草木部




石菖 通名

溪澗水側ニ生シ人家多ク栽テ愛玩ス。其種大小種々アリ。啓蒙ノノ畧ヲ載ス故ニ  
今一々セズ。花形白菖ト同フレテ細長ナルノミニノ。子室兩蓋ノ狀全ク同じ

按前条ノ一種ニノ氣味功用大異ナキモノ、如シ。漢人ハ主トシ此種ヲ用ユ。西  
書中ニハタマ白菖ノ一種ヲ載テ此種ヲ説ク余未タ見ズ。蓋シ彼地方ニコレヲ  
産セザルニヨルカ

漢書地理志中ノ菖蒲ノ條ニ載ル  
菖蒲ノ種ニ別テ大々ノ菖蒲アリ  
新出ノ菖蒲一ト稱スル者有  
菖蒲ノ種ニ別テ大々ノ菖蒲アリ  
新出ノ菖蒲一ト稱スル者有



石菖  
漢書地理志中ノ菖蒲ノ條ニ載ル  
菖蒲ノ種ニ別テ大々ノ菖蒲アリ  
新出ノ菖蒲一ト稱スル者有  
菖蒲ノ種ニ別テ大々ノ菖蒲アリ  
新出ノ菖蒲一ト稱スル者有



吉祥草 通名 観音草 同

藪澤陰地ニアリ。葉莖草ノ如ク相擁テ生シ。形麥門冬葉ニ似テ潤短ニ薄ク。一簇多クノ鬚根ヲ出シ。淺ク地上ニタツ。秋葉葉心莖ヲ抽クヲ數寸。穂ヲナシテ花アリ。大サ四五分。筒様六裂ニノ反シ。外紅紫内白色ニメ瑞香花ノ如ク。實礎楕圓ニメ鈍楞アリ。一柱末サク勾リテ結頭色亦紅紫。雄蕊六ニメ葯淡黄。穂末ニアル花ハ雄蕊ヲ具セザルモノ多シ。後圓實ヲ結フ。麥門冬實ニ似テ極大熱シテ紅色

所屬未考



吉祥草 通名 観音草 同



葉形實狀啓蒙詳之宜就見。莖梢縷沙ニノ粘リ。一二或ハ四五ノ花莖ヲ攢簇ノ數層  
 ヲナシ。每莖數花ヲソク。就中一二花先開キ。他ハ徃々全開セザルモノアリ。萼卵圓  
 三葉。厚ノ白色光澤アリ。花三瓣披針狀。實礎丸圓。一柱長ク瓣外ニ出。雄蕊六ニノ黃  
 葯。花萼實長スルニ至テ萼尚不脫。附 兩莖實礎郭大圖

所屬未考





桔梗ラン

草形略金盞ノ如シ差小ニノ剛ク。經冬不枯。夏月脚葉間ヨリ花莖ヲ出シ。高尺餘。數  
 片ノ瓣アリ。揃ニ至テ又分。房様ニ花ヲ綴ル。梗四五分傾歪正直ナラズ。萼鐘狀。萼様  
 花卵圓六瓣。大三四分。淡桔梗花色。實圓ノ三道アリテ一柱。雄蕊六莖ニノ長葯。黄  
 色。夫茶褐色ヲ帶フ。實熟ノ翠碧色。形略大葉麥門冬子ノ如シ。微大ニノ橢圓三起ア  
 リ。内二十許ノ黑色光澤アル扁子ヲ收ム。一種葉莖ニツキテノボリ多ク垂レザル  
 モノアリ。

所屬未考



桔梗草



所屬未考



キンバイザ、 仙茅

啓蒙詳説アリ故ニ略ス。大小二種アリ大者ハ然野産。小者蕪野并吾近郊ニ産ス。共ニ夏根際葉間ヨリ纖細茎ヲ抽ク一寸餘。上ニ一二花ヲ開ク。萼下ニ、針狀細葉アリ。萼筒鎌六裂披針狀淡綠色裏深黃。呈圓シテ花瓣ノ形ヲナセ凡。萎落セス集束シテ熟實ノ際ニ至ツテ猶存シ。綠色反テ加レバ。見テ萼トスルニ不<sub>レ</sub>如。萼即裸子室ニノ一柱。雄蕊六ニノ黃花後並延テ一寸ニ起ヘ。潮ク地ニ仆ル。實熟シテ拆開黒色細子ヲ飛ス。ゾノ小葉ナルハ只葉狹細ナルノミ故ニ不<sub>レ</sub>別圖

所屬未考





ハリガ子カツラ

東北寒地ノ高山ニ生ズ。莖細ノ銅線ノ如シ。故ニソノ名ヲ得。舊莖老茶褐色新莖黄褐色。多ク分枝匍伏敷地。小葉總ニ一分餘形卵圓ニノ尖テ互ニ生ス。春葉腋處々ニ短梗細花ヲ下垂ス。大サ一分許。四瓣白色微々紅暈アリ。萼四裂。實礎長圓ニノ一柱。雄蕊六。莖粗フノ莖黄色。附 一 全花 二 實礎并柱 三 雄蕊 共郭大圖

所屬未考





處々山中ニ生ス。沿海ノ地尤多シ。葉斂状舟様ニノ數葉相擁スルヲ萱草ノ如ク。厚  
 ノ光アリ。面深綠色背淡綠。四時不凋故ニ萬年青ノ名アリ。大小種々アリ。不暇枚舉。  
 大者葉三尺ニ超ヘ。小者數寸ニ不過。庭砌盆内多ク栽テ玩愛シ衆ヨク通知ス。ソノ  
 種類頗ル多ケレト撒スルニ。夏葉間莖ヲ抽下數寸。上ニ多花密列ノ楕圓ノ頭ヲナ  
 ス。觀音蓮（イソバヤクサゼンサリ）地湧金蓮（イソバヤクサゼンサリ）等ノ科ノ如ク。色淡黃綠白萼鐘樣六出シテ實礎兩蓋ヲ色ミ  
 テ辨ナシ。實礎柯子狀頸柱ヲナシ頭三起。雄蕊六短莖ニノ葯黃色。後圓實ヲ結フ。形櫻桃ノ  
 如ノ差小。數十顆毬ヲナス。熟シテ赤色又黃色ナルアリ。 附一花部大圖

フロンチウム

*Otontium*

ヤボニクニム

*japonicum*

春氏



五木正成  
 十  
 十六



草形萬年青ノ如シテ葉背紫色ナルニヨツテ其名ヲ得。一種白色間道アルモノ。又一種葉背紫色ナク一面背共  
二種色ノ 夏秋葉間ニ花アリ。初ノ苞ヲ出ス形扁尖ノ二葉ニ成リ。仰テ互ニ相擁シ  
 恰モ蛤殻ノ縁ニ口ヲ開ガ如クメ色帶紫。苞下短莖アリ。二擗アツテ色之。苞心軸ア  
 リ多ノ花蕾ヲ擗簇シ。又各薄苞アリ。漸長スレバ梗五七分ニメ花頭苞外ニ露ス。萼  
 半披針狀三片。花圓尖三瓣白色大サ三四分。實礎圓尖ニメ純三稜アリ。一柱頭花又  
 フナシ。雄蕊六莖。々ニ長白ノ糸毛アリ。約扁薄圓扇ノ形ノ如ク頂平直ニノ圓カラ  
 ズ。兩面黄色兩側暗紫ノ線遠アリ。開綻白粉ヲ吐ク。此花朝ニ開キ夕ニ萎ミ。更ニ屈  
 シテ深ク苞内ニ潛ム。大抵日ニ一花或ハ二三花ヲ出レ連々相繼ク。是ヲ以テ一苞  
 内花ヲ見レ下類長シ。後圓實ヲ結ヒ下地ヨク生ス。此草琉球産ニメ性尤畏寒。冬藏密ナラ  
 レハ育シガタシ。附實礎兩莖郭大圖

所属未詳







卷之三

六

本草綱目

アダン 草 龍舌草

茎短葉長ノ高三四尺ニ至ル葉多ク肉肥厚ニ  
ノ長ノ鋭リ背圓ノ面扁ニノ兩側ニ  
短刺アリ。色淡綠ニ淡白  
斑アリ。皮中ニ苦  
液アリ。捺テ

藥用ノ處會ヲ製スベシ内ハ軟脆無味ヲ可食ニ成  
ノ際葉間ニ圓長ノ花莖ヲ擡テ長ク穗状ニ穂穂ニ點  
頭花ヲ綴ル每穂一小尖苞アリテ護ニ花体筒様純三角  
ニメ六裂内柱ノ三瓣横扁大ニメ尖微ク及シ全体  
黄色ニメ本ニ赤葉末ニ緑暈アリ。子室蛋形ニメ  
鈍三角。柱頭僅ニ三裂雄蕊六ニ其三角ノ長其約  
福赤ニメ黄粉ヲ吐ル



第一種  
アロエ 葉  
*aloe vera, echte aloe.*  
アロエ 葉  
「ムニ」氏有圖可證



上条一種

安政年間舶来全形

エフテ *cyta*

アロエ *aloe*

昔常所植ノ如ナレ氏。葉彼ノ如ク肥

厚多肉ナラズ。又之ヲ刺スニ苦黄汁ヲ見ズ。ソノ形略萬年青葉ノ如ク微厚ク。邊縁刺状ヲナス。アダンノ如クノ未尖ニ一細刺アリ。色差濃クノ淡黄白色ノフク  
リンアツテ頗ル美ナリ

アロエ

按 *aloe* ノ族タル勿論ナレ氏。未タ種名ヲ詳ニセズ。林氏所奉ノ二十餘

種中ニアルベケレ氏。余本条ヲ見ルヲ雜草ノ一根ノミニモ。成長花實ノ状

ヲ見ザレバ。ソノ殊標ノ考ヲ得ズ。門氏圖中所載ノ *Xylemeamericana* 状

アロエ *aloe*

ノット *nut*

ドール子 *Doornen*

ナルモノ。本条ノ如クナレ氏形状ヲ略ス

レバ當否難決





アナス、ス 鳳梨

弘化二年和蘭載来ノ品ニノ。全形林投ノ如クナレド。葉稍濶ノ。而淡緑背帶白色  
 ニノ光澤ナク。葉邊剛刺アレド有道ニ刺ナク。高三尺許ニ至レバ中心花ヲ出ス。形  
 松毬ノ如クノ大ニ。暗紅色ノ鱗色重疊長二三寸。每鱗一花ヲ出ス。莖硬メ三裂。實硬  
 倒置ノ柯子ノ如クノ。上ニ花ヲツク花大小三裂殆ト三鱗ノ如クノ。尖頭紫色。林血  
 搦ニメ寮槽ヲナシ。中心一柱頭三裂。雄蕊六莖。葯淡黄色。後苞ノ紅色漸褪キ。實硬ト  
 共ニ長大實ヲナシ初冬ニ至テ初テ熟シ色深黄帶褐。恰モ枇杷ノ聚簇密接ノ尖圓  
 ノ一体ヲナスモノ、如シ。味酸甘。香鳳梨ニ似テ香味共ニ頗ル美也。又毬頂二十數  
 ノ芽ヲ出シ簇々茂生シ。其状尤奇ナリ。漢人鳳梨ノ命名アル所以ナリ。毬下亦時々  
 芽ヲ出ス。共ニ下地シテヨク根ヲ出シ繁殖ス。阿須氏云。實美味ニメ月経ヲ通シ血  
 液ヲ稀釋シ。飲食消化ヲ扶ク。熱病ノ患者一片ヲ含メハ清涼ニメ渴ヲ減ス又去積  
 カヲ増シ惡心ヲ鎮メ。黄疽水腫ニ効アリ。然レモ多食スレバ下利シ内蔵ヲ損スト

附一 全花ニ鱗苞 三去莖視鮮莖實硬共本然圖 四 兩莖實硬一倍圖

第一種

ブロノリア アナス、ス  
 bromelia ananas、 釋  
 ゲノ椰子  
 gumm 莖  
 アナス、ス  
 ananas、 莖





平木全長

平木全長



エラン モクアダン 林投 阿咄咄  
 葉前条種ヨリ狭長。質尤剛ク滑澤ニメ光リ。邊縁背道ニ  
 逆刺アリ。老レバ幹高ノ木様。葉只梢上ニ簇聚ス。此種ハ  
 本邦ニアツテハ花實ヲ生スルヲ稀ナリ。名府某氏所載  
 ノモノハ已ニ高四五尺ニ及ベ氏未ク花ヲ出サズ。余親  
 クツノ花實ヲ檢セザレ氏。草形林氏所載第二種タルニ疑  
 ナシ。故ニ直ニワノ名ヲ下ス。他日花實ヲ得テ之ヲ證セン

第二種


アロメリア

ヒシグユイン

ゲトロステ

アナニス

*Bromelia piquin.* 種 *gustafte arancas.* 種





ホト、ギス 油點草

山間溪側陰地ニ生ス。莖高二尺餘。微毛アリ。葉披針狀ニシテ未尖リ本濶メ莖ヲ抱テ互生ス。近道所産ノモノハ。多ハ葉面油ヲ點シタル如キ斑アリ。人家愛玩培養ノ品ハ。ツノ點ナキヲ貴ブ。秋梢葉腋毎ニ一或ハ二ノ無萼ノ有梗花ヲツク。花六瓣披針狀ニシテ正開セズ。外位ノ三瓣ノ本脚起シ蜜槽ヲナス。子室長ノ三稜。一柱ニシテ頭三裂。每片又又裂シテ及シ。六雄蕊圓之。亦柱尖ニ從テ及シ葯十字様。全体色曇白ニシテ葉點アルヲ常トス。ソノ他花ノ形色種々又孳生黄花又葉色ニ帯白帯黒ナル等アリ今一々セズ

ニフユラリア

*Androsace*

ヒルタ

*Androsace*


春氏





玉川ホト、ギス

北地深山ニ生ス。茎常種ヨリ小。葉短クノ帯黄色。夏花アリ。辨柄、小ニノ子室及テ大ニ。色黄ニノ紅褐細點アリ。兩蓋ノ形常種ト一般。花戸此種ヲ玉ガハト稱ス。ホト、ギス中ニ在テ一殊態アリ故ニ之ヲ掲ク吾郷多良山中ニハ此一種白花ノ者アリ





山荷葉 通名

深山幽谷ニ生シ。一根一莖。老根ニアツテハ高一二尺。分岐ニトナリ各頭一葉。大七八寸。形扁圓ニメノ。大缺刻相對シ。邊緣不齊ノ大尖頭起ラナン。惣テ尖細ノ不齊齒ヲ具ス。面綠色背稍淡メ微軟毛アリ。莖葉心ニツク。一岐更ニ枝ヲ分チ一小葉ヲツク。ツノ葉ニアツテハ一缺刻深ク莖ノ処ニ至リ。ソノ処ヨリ一寸許ノ花莖一二ヲ出シ數並ニカレ。每頭一花ヲ放ク。草不大者一岐。大葉一岐ハ小葉ニメ直ニ花ヲツク。 等三葉花五瓣。共ニ卵圓白色形如梅花ノ稍小。實礎指圓ニノ尖。結頭瘡癩アリ。雄蕊六ニメ長約双角アツテ黃粉ヲ吐ク。實桃葉珊瑚ノ實ニ似テ小。熟メ黑色。内ニ四子アリ。根形黃精ノ如クメ小。累々田ヲ連綴橫延シ。毎年一田ヲ生ス。 附 兩莖部大圖

所屬未考





ルイエウ牡丹

深山ニ生ス。春鬚根ヨリ芽ヲ出シ。一莖三又。每又又三分シ各頭大低三葉アツテ頗  
 ル牡丹葉ノ態アリ。故ニ類葉牡丹ノ俗称アリ。又邊又一枝ヲ出シ。上又三並三葉ア  
 ル。初ノ如ク。ソノ上ノ又邊ニ別ニ一小莖ヲ出ス。一寸餘。分並數花ヲ放ク。萼針状ニ  
 三葉。花披針状六瓣。大サ四五分淡黄綠色。每瓣爪扁頭ノ蜜鱗アリ。實瓊柯子状ニメ  
 尖。雄蕊六莖弱黄色。附全花一倍圖





形状花ヲ除クノ他ハ大低酸模ニ似テ大ニ。但葉ノ本スイバノ如ク股ヲナサズ邊  
 縁波紋ヲナセトモスイバノ如ク甚シカラズ。又スイバハ冬春ノ間葉脈紫柄紫色  
 ヲ帯ドモ。此条ハツノコヲ必トセズ。春莖ヲ抽クコトニ三尺。數枝ヲ分チ梢頭穂ヲナ  
 シテ花ヲ綴ル。每節數十花ヲ簇シ層ヲナシテ下垂ス。萼鈍披針狀三葉。花卵圓三瓣  
 共ニ淡綠色。子室鈍三稜ニノ頭花又ヲナシテ白色。六雄蕊葯淡黃色。花老テ瓣萼不  
 脱。瓣ハ切ニ子室ヲ抱キ。萼ハツノ下ニ在テ共ニ枯ル、ニ至ル。又瓣ノ正中ノ下側ニ  
 粒アツテ隆起ス。盛花ノ際ニハ明カナラザレト。稍老レバ可見。實熟ルニ至テ尤顯  
 著。其熟實ヲ剖ニ三稜ノ一子アツテ白肉味苦淡。花瓣所孕ノ粒亦子ノ如ク白肉ア  
 ヲテ味微淡。林氏「バチク」ヲ大別スルニ。花裾ニ粒ノ有無ヲ以テスルモノ即此物  
 ヲ指ス。主用茶鏡詳之。附一全花。ニ熟實共部大圖

五種 ルニノキス エリスノキス  
*Numm. crispus.* ニ *gokwid patck.* ハチク







カラスノアブラ 土火黄

深山洞水ノ中ニ生テ葉大ク邊縁微  
 波縮リナレ。長尺ニ餘リ幅六七寸夏  
 葉ト同時ニ重ク抽クテ冬又花ヲツ  
 ケテ亦同ケレトソノ葉裏ニ毛ト多ク  
 且瘦弱。短ノ雄管ヒテ各々葉下ニ  
 ハニ至テ花ノ群状ニ認メガタケト花  
 葉葉狀ニ在リテハ全ク同シ。故ニ都テ  
 同リ不載。或モココト地ニ種ト下  
 利ノカアリ。故ニ其量ヲ倍シテ大  
 黄ノ代用ニ地原鏡ニ詳載ス

カラスノアブラ  
 土火黄  
 深山洞水ノ中ニ生テ葉大ク邊縁微  
 波縮リナレ。長尺ニ餘リ幅六七寸夏  
 葉ト同時ニ重ク抽クテ冬又花ヲツ  
 ケテ亦同ケレトソノ葉裏ニ毛ト多ク  
 且瘦弱。短ノ雄管ヒテ各々葉下ニ  
 ハニ至テ花ノ群状ニ認メガタケト花  
 葉葉狀ニ在リテハ全ク同シ。故ニ都テ  
 同リ不載。或モココト地ニ種ト下  
 利ノカアリ。故ニ其量ヲ倍シテ大  
 黄ノ代用ニ地原鏡ニ詳載ス





スカナ

スイバ

酸模

原野ニ多ク。羊蹄ノ湿地ヲ好ト不同。形羊蹄ニ似テ小。根葉ノ本又股ヲナシ。冬ハ紅紫ニ染メ。春新葉ヲ生スルモ莖柄猶紫色ノ線ヲ録ス。莖ヲ抽クテ肥地ニテハ二尺ニ超エ。莖梢枝ヲ分チ穂ヲナシ花ヲ綴ルテ亦羊蹄ニ似レド。枝垂細ニノ花梗短ク。又羊蹄ニ比スレハ花差ヤ早ク。莖葉味酸唯者。此草雌雄異幹ニメ。甲雌者ハ莖三葉花三瓣蘇氏ハ共ニ莖ニ葉ニ云ク莖六葉大者下ニ曲リ小者高起メ子室ヲ雄。按ニ羊蹄ニ於テ莖ト辨トニ分レバ。コノ品ニ在テモ亦莖ト辨トニ合ツヲ以テ優ルトセン。莖葉ハ下ニ反シ花辨ハ高起シ。色共ニ淡緑。子室三稜ニメ三起頭分裂纖細翅毛ノ如ク。辨頭ニ出テ紅色頗ル美ナリ。又ノ色褪白。實熟スルニ至ルモ花莖共ニ不脱。辨ハ子室莖ハ梗ヲ紫ク色テ乾枯スルニ至ル。實羊蹄ノ如ク差ヤ輕鬆ニメ差小。又一種柱頭翅毛ノ色淡黄白色ニメ微紅葷アルモノアリ。其雄者ハ草稍小。花大サ一分許楕圓三瓣。莖披針狀ニメ三葉共ニ披開シ。短莖六蓋葯淡黄色ニメ白粉ヲ吐ク。主用藥鏡載之。又絞汁ヲ以テ晶狀塩ヲ製シ熱病ニ用テ大利アリ。又

云。此種雌雄異草ナレバ第二十二圖ニ收ムルヲ正トスレド。今蘇氏ニ從テコノニ收ム。附一 全花 二 柱頭見花辨 三 柱頭白色品 四 乾枯實 五 乙全花 六 伏口花見莖與辨共部大圖

ルニノキヌ第二十六種

アセトサ

*actaea*

草

*de Villiers*

蘭

按ニスイバノ葉形產地ニ因テ不一。吾郷邊ノ品ハ狭長ナレド。白山産ハ稍ヤ潤短ニメ。阿須氏ノ圖ニ右相似。且雌雄大小花莖葯蓋狀等穂テ的當ス。故ニ斷然不容疑。春氏ハ第六種ノ *pycnostachya*、ニスイバノ名ヲ下ス。 *pycnostachya* ハ羊蹄ノ属ニカ、ルモノナリ。春氏只ツノ葉形ニ照シテ深ク檢セザルニヨツテ此失ヲイタス







溪間巖上ニ生ス。草石菖ノ如クナレ。高五七寸ニノ香ナク。根鬚絲ニノ結節ナラ  
 ズ。夏葉心一茎ヲ抽ク。七八寸。細花ヲ以テ穂ヲナス。萼三角ニノ三尖。花白色六瓣  
 披針狀ニノ舟様。六雄蕊葯褐色。實礎麥粒狀三箇相並ヒ。頸各一柱ヲナシ。微ク外ニ  
 披ク。白山御嶽等ニ小葉ノ品ニ種アリ。一ハ三四寸。一ハ一二寸ニノ花形異ナシ。或  
 コレヲチヤボセキシヤウト名。附全花部大圖

所属未詳





イハシヤウブ 花セキシヤウノ大葉者

山中ニ生シ。巖石間ヲ必トセス。葉間花茎ヲ抽ク一尺許。一二小葉ヲツケ梢ニ至テ一処ニ三梗ヲ出シ。每頭一花。數層ヲ以テ穂狀ヲナセ凡。花セキシヤウノ穂ヨリ短シ。花六瓣披針狀ニノ白色。實礎麥粒狀三顆併置シ。色淡緑白。各頭柱ヲナシ白色。雄蕊六。葯黒褐色ニノ黄粉ヲ吐ク。莖粘ツテ手ニツキ且短細ノ刺毛アリ。附 實礎並柱郭大圖

所属未考



於十二卷及實圖外ニノ天ノ...





水底ニ生シ。草形車前草ニ似テ。葉薄ノ柔軟色淡黄緑ニノ帶暗。夏葉間ヨリ莖ヲ  
 抽ク。三五寸ニノ三稜。頂ニ一花ヲ放ク。漏斗状ニノ扁圓三裂白色ニノ淡紫暈  
 アリ。雄蕊六。葯長ノ深黄粉ヲ吐ク。裸子室三稜ニメ長ク。中ニ多細子ヲ収ム。頸三葉  
 披針状萼ニ分ル。又子室上ニ鞘様薄膜アツテ色テ頸下ニ至ル。雌蕊三莖花莖ニ  
 不脱。子室ト共ニ水中ニ没シテ種子ノ熟スルニ至ル

所屬未詳。春氏ハ林氏所舉第四種

*Hartblatige wasser-Mygdalee.*

花十二雄蕊。實鈎状ニノ尖ルノ文アリ。可疑

*algina*

*confixolia.*

蘭

トス今林氏ヲ聞ルニ。

羅





ハンゲシヤウ

カタシロダサ

三白草

溝漬湿地ニ生ス。高二三尺。莖條道アツテ方ナルガ如ク。葉楕圓ニシテ長。本葉ニ股ヲ  
 ナシ。數縱脈著シ柄アツテ互生。半夏生ノ際ニ至レバ。頂梢ノ二三葉白色トナル。ト  
 木天蓼ニ於ルガ如シ。故ニ種々ノ副名アリ。梢葉腋ニ三ヨリ花莖ヲ出シ。穂ヲナシ  
 短梗花ヲツク。心葎狀ノ一小葉アツテ掩之。別ニ辨ナク萼ナシ。實瓠柯子狀ニメ鈍  
 四稜。每稜一柱及捲シテ白色。六雄蕊圓葯黄色。一種琉球産ト稱スルアリ。葉差短メ  
 梢葉白色ヲナサズ。間ニ頂上ノ一小葉純ニ白変スルコトアリ。花實差異ナシ

附全花部大圖

サウルニルニス

セルヌニス

キニツケンテ

サウルニルニス

*Saururus*

*Cernuus*

華 *Smithiana*

*Saururus*

蘭

春氏  
可定

按林氏梢葉白変ノコトヲ不載レバ。所謂琉産ナル品ヲサス如シ。又云林氏七綱  
 四目ニ収メソノ所説形状亦可疑トアレト姑從春氏説





サジオモダカ 澤瀉

瀾葉狹葉ノ二種アリ。瀾葉ノ者即本ハ啓蒙河謂仙臺産。狹葉者即次ハ近道産ニ  
即水澤瀉ナリ。又城州御菩薩池ノマルバオモダカハ。草小葉丸圓ク花實亦小ニ  
本条ノ一種ニカ、ル。林氏亦産地ニ因テ狹葉瀾葉アルヲヲ載ス。狹瀾共ニ花實相  
同シ。莖高二三尺。每節數枝。每枝又數極ニ分レ。每莖數梗ヲ出シ每頭一花ヲ放ク。三  
圓瓣ニメ白色淡紫暈アリ。雄蕊六ニメ葯黃綠色黃粉ヲ吐ク。實圓薄片ニメ各一  
柱ヲナシ。並列メ冬フユアキ莢子ノ如ク、ソノ老ルヤ三ツニ大別ス林氏云。此草家畜ニ害ア  
リ。ソノ汁峻烈ニメ葉ヲ以テ發泡藥トナスベシ

附 全花部大圖

第一種

アリスア フランタコ

*Alisma plantago*

春氏ハ林氏ノ第二種

ゴローテ

*Scout*

アリスマ

フラン


*Water Lily & tree.*

ノ名ヲ以テ本条ニ下ス可


疑







ヘラオモタカ 水澤瀉  
 前条一種葉狭長ニメ根差小花實一般ナルモノニメ近道多ク  
 産ス又東国ニハコノ一種小葉ナルモノヲ産ス  
 説出前条下





草部

第七綱

七雄蕊

ツマトリグサ

北地高山ニ産ス。白山尤多シ。根線様ニメ長ク延テ処々ニ苗ヲ生シ。莖細ノ高四五寸。葉卵圓披針狀。稍ニ至テ漸ク大ニ。七八葉攢生シ。葉腋一ニノ細花茎ヲ出ス。一ニ寸。頂上一花。七瓣卵圓ニメ尖リテ白色。萼細ク披針狀ニメ亦七葉。子室卵圓一柱頭僅ニ裂。雄蕊七ニメ黄藥。

チリエンタリス

エウロツバ

*twintalis*

*autopaa*

雌

*autopjichu*

エウロセセ

*twintalis*

チリエンタリス

雄





全形イシミカハノ如ク地ニ堀シテ蔓延シ。茎柄葉背ノ大脉共ニ剛刺アリミナ逆  
 ニ向フ。故ニヨク物ニ鈎著ス。莖帯紅色ニメ節アリ。節上葉ヲ互生ス。形三角ニメイ  
 シミカハノ如クナレバ。葉葉邊ニアツテ中心ニツカス。柄一寸許。柄本扁圓ノ小托  
 葉アツテ莖ト共ニ抱擁ス。葉腋枝ヲ出シ。晩夏ニ稍節上ニ花莖ヲ出ス。長十寸許。最  
 上ニ在テハ必ス又シ。一莖十數花球状ニ簇ル。無梗ニメ數片ノ鱗状三尖ナル苞莖  
 アリ。花楕圓五瓣白質ニメ尖微紅色。總ニ哆シテ正開セズ。林氏云。葉七葉花一瓣ニ  
 ルガ如ナレバ。殆ト五瓣ト稱スベシ。雄蕊七ニメ約白粉ヲ出。實礎三稜一柱ニメ頭三裂。此類林氏三  
 スルニ三裂ト已ニノ實礎漸長シ。熟ノ黑色。形蕎麥ノ如ク。半ハ瓣外ニ露ル。膜ニ瓣  
 云ニシカズ 猶不脱。此花一存ニ不放。一球中熟實ト未開花ト雜留スルヲ。ミゾフバノ類ト同ジ

全花郭大圖

トルユセレユス  
*trullium*

トロツハレコロイト  
*Tropaeolum*

菊






マ、コノシリヌグヒノ一種

サデクサ 名古屋

生殖部ノ形前条ト一般ナレ氏。花數稍少ク。葉稍長ノ微クミグワバノ葉ニ似。刺前条ト同ジケレ氏稍小ナリ。花候亦同也





ヤナギサウ

木曾山中和田嶽ニ多ク生シ其名尤高シ。莖高二三尺。葉互生形柳葉ノ如クノ鋸齒  
微ナリ。夏梢上ニ短梗四瓣淡紅帶紫色花ヲ穗状ニ綴リ。瓣尖微缺アツテ山櫻花瓣  
ノ如ク。而メ瓣ノ位置偏ニメ正列ナラズ。下邊ノ二瓣兩方へ披キ五瓣花ノ一瓣ヲ  
缺カ如シ。萼四片披針状。子室角様一柱頭四裂メ及卷シ。垂レテ下瓣披開ノ間ニ挺  
出ス。雄蕊八ニメ黃葯。主用出藥鏡柳葉菜下可見

第一種

エロロビエム


アヒカニスナホリ去

ムロトフラーカフ

ハメナセド

ウエテソクナ

*Epilobium angustifolium* 羅 *Small Bl. Big. Gayt. D. - Melville.*





アカバナ

柳葉菜

山足ノ水邊ニ生シ。苗高一尺許。葉淡<sup>カ</sup>疏葉ニ似テ狭ノ鋸齒アリテ兩對。脚ニアツテハ莖ヲ擁シ糙滑澤ナラス。夏ヨリ葉ヲ凍テ紫赤色ヲ帯フ。故ニアカバナノ名アリ。六七月莖稍葉腋ニ莖ヲ出シ上ニ花アリ。萼四片。花四弁。形卵圓ニシテ長ク頂ニ一缺アリ。白質淡藤花色華アリ。一柱頭粗大ニシテ細子ヲ飛散シ。只一條ノ長穗ヲ餘ス。子ハ細ニシテ毛様莖アリ。一種白花者。小葉者。又至テ小葉者等ノ多品アリ。今一々セズ

附一兩莖 二子 共郭大圖

第三種

*Spilobium hirtatum*

■

*nigra* *baptis* *obovata*

■



八國一  
二種  
共郭大圖



嘉永ノ初蘭舶載来。ソノ産地稱名未詳。世人マツヨヒグサ或ハヤハツキンバイノ  
 名ヲ號ス。種子下地シテ生シ易ク。ヨク霜雪ヲ凌キ。高二三尺多ク枝ヲ分テ叢生ス。  
 根葉ニツギク又被覆花葉ニ似テ小。中筋頗ル白色。莖葉ハ黄ゴシ草葉ノ如ク。遠  
 隔ノ微鋸齒アツテ互生。每葉腋一花ヲ出ス。四瓣黄色。瓣本細ク末扁大頂ニ一缺ア  
 リ。缺処堅ニ一道内ニ起リ。殆ト二瓣ノ相併ガ如シ。雄蕊ハ莖ノ葯共ニ黄色ニ淡  
 黄粉ヲ吐ク。葯細筒様ニメ上縁開大ハク漏斗ノ状ヲナシ。苞萼長六七分幅二分許  
 ノ四片併接メニ片トナル。ソノ併ヤ。全ク不合一。二ノ間際アリテ末尖一分許ノ  
 針状ヲナシ。花開ケバ直ニ反下ス。ソノ状頗奇。子室長ノ四溝路アリテ鈍方。略柳葉  
 菜ノ萌ニ似テ大。一柱長。花心ニ延ヒ。頭四裂メ四散シ色淡黄。此花形色鮮美最可  
 愛ケレト日落テ初テ放キ。日出テ漸ク色ヲ衰シ萎衰不待午取。是以大ニ聲價ヲ損  
 ス。萌熟メ四裂シ褐色ノ細子ヲ飛ス。 附一雌蕊 二雄蕊 共郭大圖

第一種

オノテラ *Oenothera orgata* 草

オノテラ *Stylaria* 草





前条ト同時ノ始來ニメ。亦產地邦名未詳。漫ニツキミダサト稱ス。秋下種シ莖高二尺ニ餘リ數枝ヲ分ツ。葉披針狀ニメ大刻缺不齊ノ尖齒アリ。葉腋有梗花ヲ開ク。扁圓四瓣白色。葶筒様口内ハ雄蕊ヲ出ス。莖約共ニ淡黄色。裸子室萼下ニツキ。四稜頗羽狀ヲ具シ。内ニ多ノ至細子ヲ収ム。一柱長。雄蕊ノ上ニ出。頭四裂ノ及張ヌ。色淡黄。狹長四葉ノ苞萼萼ノ上縁ニツク。ソノ狀前条ト同シ。此花黄昏ニ開キ。朝ニ至テ萎テ淡紅色ニ変ス。開花前条ニ晚レ萎衰更ニ早ク特リ夜中ノ觀アルノミ葉ヲ嗜ミ粘滑葵葉ノ如シ

按前条ト同屬ニ可収而採氏所舉ノ種中未考の當者



此花前条ト同屬ニ可収而採氏所舉ノ種中未考の當者



夕コホウ

田畝ノ間ニ多ク。莖線稜アツテ高二三尺。多枝ヲ分チ葉ヲ互生ス。形柳葉ニ似テ鋸  
 齒ナク。秋毎葉腋一或ハ二三ノ萌ヲ生シ。上ニ花アリ。萼四片三角形。花亦同様ニメ  
 四弁。小ニメ僅ニ二分許。一柱結頭四雄蓋共ニ黄色。萌ハ四稜ニノ細長一寸許。四巴  
 ニメ多ノ卵圓子ヲ收ム。熟後ニ至レバ分析細子  
 トナツテ卵形ヲ不見 老枯スレハ。上皮剥脱シテ纖細四  
 條ト中心一片ノ細瓢アツテ。至細子ヲ充積シ。已ニメ子亦飛落シ。只五纖條ヲ殘ス。  
 ツノ状。柳葉菜莢ノ分析シ子ニ茹アルト大ニ不同。秋後莖葉紅染ス。

按此種花形柳葉菜ノ如クナレモ子形不同又 *Oenothera* 第五種 *octostylis*。  
 羅 *guthriei* *ongawa*。 蘭ノ圖說ニ彷彿タレモ彼ニ比スレバ草小花亦小ニ  
 メ四雄莢ナレバ的當ナラサレモ全形 *oenothera*、 概標ニ外ナラザレバソノ  
 屬トシテ姑クコ、ニ收ム若シ四雄莢中ニ的當ノ屬ヲ得ハ宜ク改正スベシ





ゴローテ スパーンセ ケルス

十餘年前蘭船載來ノ品ニノ。浸ニノヲゼバーレンノ俗名ヲ下ス。莖柔滑ニメ多液娜娜トノ直立セズ。地ニ塌ノ繁延多枝。葉ハ圓ノ邊ニ雲頭起アリ。莖中心ニツキテ殆ト蓮葉ノ如ク。長柄五七寸ニノ互生シ。葉脈長梗ヲ出シ花ヲ放ク。萼半披針狀五葉ニメ。一距アリ長廿一寸許。花五瓣向側。下位ノ三瓣ハ頭圓クハ狹長ニノ邊ニ毛齒様序アリ。上位ノ二瓣ハ圓長箕狀ニメハ暗紫ノ線條アリ。花體萼共ニ黃色。瓣心紅斑アリテ鮮美。佳香可愛。實礎擔圓ニノ三起數條道アリ。一柱頭三分。雄蕊長短八莖。約圓長紅黃粉ヲ吐ク。花後結實扁圓三起ソノ狀頗ル奇也。下種杆挿ミ十宜ク。暖室護之レハ舊莖亦ヨク堪寒。此品醫藥ニ專用セザレハ。利尿又壞血病ノ治ニ功アリ。實ハ生乾共ニ緩下ノ能アリ

附 兩蓋子室一陪圖

芽ニ種  
トロハラトエム  
トユヌ  
ゴローテ  
スパーンセ  
ケルス  
Topaeolum majus 種 Procto Aparycha Kars 蘭





ワバ 蕎麥

啓蒙具載、衆人亦通知、故ニ形状ヲ畧ス。花無萼、五瓣、卵圓、白色。實硬、三稜、頸延テ一柱  
又ナシ、頭三裂、雄蕊八、莖ニノ、葯淡紫色。莖間八箇ノ、蜜腺アリ

附 全花部大圖

按已下此類大抵一柱三裂、殆三柱ノ如シ、林  
氏見テ三目ニ收ム、故ニ今ツノ例ニ從フ

第二十九種

ホリゴヌユム


ハゴロルユム

ブークウエイト

*Polygonum Kagopyrum*

*Bakkeleit*

林氏云、此品無毒ノ、良食ニノ。ヨク消化シ、多ク大便ヲ通スルヲ以テ、小麦ヨリ貴  
シ。然レモ、作業ノ、人体ニアツテハ、大麦、裸麦ヨリ、早ク消化シテ、餌養ノ、力不長、持  
未ノ、毬布ハ、腫瘍ノ、膿熱及、鎮痛ノ、為ニ、大利アリ





ミゾソバ

苦蕎麥

啓蒙苦蕎麥ノ下形状ヲ載ス。茎ニ細刺毛アリテ微糙滑ス。每葉稜アリ。稜上扁圓ノ小托葉ヲ戴ク。梢上二三莖ヲ分チ。每頭多花穂ヲナシテ簇生ス。鍾状五尖ニノ正開セス。白質ニテ尖淡紅可觀。又白色ヲ紅暈ナキアリ。實三稜。一柱頭三裂。雄蕊八。或七或九ナシ。從林氏例收ハ。葯粉紅。花底雄蕊ノ間ニ。黄色麦粒状ノ蜜腺アリ。ソノ穀雄蕊ノ數ノ如シ。莖三葉ニメ各尖黒暈アリ。三葉重リテ專テ花筒ノ扁側ヲ包ム。實熟ノ黒色。形蕎麥ノ如シ。一種河側沙上ニ生シ。葉長六七分ニテ尖鈍ナルモノアリ。又北國産ニハ。葉常種ニ似テ僅ニ柄ニ流レ。大サ六七分ナルモノアリ。又葉略三角ニシテ。大サ一寸許ニシテ墨記アルモノ。三州本宮山ノ頂勢州葦野山上等ニアリ

第三十一種

ホリゴメユム

アリホリユム

ロークブラーダフ

ドイセンドコノープ

*Polygonum aviculare*

*Pictetia*


*Quercus*





タニツバ ソバタデ

溪湖湿地ニ生シ。茎端地陸頭一尺許。節微膨レ色淡黄緑ニノ微紅ヲ帶フ。葉互生。本潤ク未尖銳。略蕎麦葉ノ如クニメ柄ニ流レ。末端小耳ヲナシテ莖ヲ擁ス。莖葉共ニ葉較滑澤ナレド。莖並ニ葉背脈上ニ軟細微毛アリ。全形蕎麦又ハミツ、バノ態アリ。故ニタニツバノ名アリ。秋枝梢葉腋ニ多細花ヲ擢簇ス大サ一分許。每花大鱗状ノ一小葉アツテ包之。花無萼筒様四裂鑿口展開セバ。切ニ子室ヲ包ミ白色ニメ尖ニ淡紅暈アリ。實硬扁圓尖ニノ。一柱頭為又黄褐色。雄蕊六莖莖暗黒ニメ白粉ヲ吐ク。實熟少赭黒色 附一全花並莖葉 二攤開花弁見兩蕊 三熟實共郭大圖



按此品細目同シカラサレドモ前条ノ種属ニ外ナラズ故ニ姑コ、ニ併入ル



本及シテ... 葉二十餘... 實熟少... 一 二 三

タニツバ ソバタデ

溪湖湿地ニ生シ。茎端地陸頭一尺許。節微膨レ色淡黄緑ニノ微紅ヲ帶フ。葉互生。本潤ク未尖銳。略蕎麦葉ノ如クニメ柄ニ流レ。末端小耳ヲナシテ莖ヲ擁ス。莖葉共ニ葉較滑澤ナレド。莖並ニ葉背脈上ニ軟細微毛アリ。全形蕎麦又ハミツ、バノ態アリ。故ニタニツバノ名アリ。秋枝梢葉腋ニ多細花ヲ擢簇ス大サ一分許。每花大鱗状ノ一小葉アツテ包之。花無萼筒様四裂鑿口展開セバ。切ニ子室ヲ包ミ白色ニメ尖ニ淡紅暈アリ。實硬扁圓尖ニノ。一柱頭為又黄褐色。雄蕊六莖莖暗黒ニメ白粉ヲ吐ク。實熟少赭黒色 附一全花並莖葉 二攤開花弁見兩蕊 三熟實共郭大圖

按此品細目同シカラサレドモ前条ノ種属ニ外ナラズ故ニ姑コ、ニ併入ル



ウナギツカミ

田畔溝側多ク生ス。葉披針狀ニメ本ニ一刺アリ。莖方ニメ至細難筆ノ剛刺アリ。四  
 五月ニ莖頭花ヲ簇生シテ穂ヲナス。形ミヅノバノ如ク白質ニメ紅暈アルト否ル  
 ノ二種アリ。此類ミナ秋ヲ花候トス。特リ此品四五月ヨリ花ヲ放ク。山中溪間ニハ  
 葉本股ヲナサズ。或ハ方形ヲナスモノ。又葉長二寸ニ不及幅五六分ナルモノ等。種  
 々アリ

ホリゴメム

サシタトユム

*Polygonum sagittatum*

春氏 西勃氏云此説可再考

按西勃氏可再考ノ語アレハソノ

*Polygonum*

ノ類タル勿論ニノ。殊ニ林氏

ノ第二十種ニ奉

ホリゴメム

*Polygonum sagittatum*

*Polygonum sagittatum* 西勃氏云此説可再考

ナルモノノ形状的當ナル如シ。浮ル氏云

*Polygonum*

ハ葉本ノ兩側尖銳延長アルヲサシタトユム

ソノ片横ニ提出スルヲ云ト。此語ニ據ル。ピクニハ本葉。ピクニハミヅノバノ形状ニ當ルト明然ク。然レニ

春氏 *Polygonum sagittatum* Knapp ヲミシバノ名ヲ下ス者可疑。後賢断之





長葉ノウナギツカミ

此品前種ヨリハ晩夕。秋ミゾツバト同時ニ茂盛ス。且前種ヨリハ莖葉共ニ大ナレ  
氏同一种ナルモノ、如シ。此種ノ葉形モ、ペールノ状ニ當ル





イシミカハ 紅杉歸

草蔓延剛刺アル。マ、コノシリヌグヒト同ク。葉形亦略相似テ三角ナレドモ。色稍  
 帶白。莖葉中ニ著キ。托葉扁圓ニノ莖ソノ中心ヲ穿テ。夏未莖梢ニ花ヲ綴ル。短  
 穂ノ状ヲナシ。或ハ托葉ノ上ニ二三花聚リツク。アレヒ。マ、コノシリヌグヒノ  
 梢頭又枝相對ノ花アツマリ穂状ヲナスト不同。又瓣形同シケレヒ。雄蕊ノ數不同。  
 マ、コノシリヌグヒ  
 ハ七莖。木条ハ八莖 花老テ瓣不脱。ハ同ケレヒ。色漸ク変シテ綠碧紅紫白黒等  
 ノ色ヲ為シテ熟スルニ至ルノ一特態アリ。吾郷所産ノモノハ。花色青白ニノ啓蒙  
 所説ノ淡紅ノ品ナシ

第二十二種

ポリリヌム

ベルホリアトム


ドーセンライオン

ドイセンデコノフ

*Polygonum perforatum*

*Sambucus Quilten Knopp*

蘭





西國肥前ノ邊多ク自生シ。宿根茎ヲ出シ。場地蔓延ス。葉指圓ニメ夫リ。脚葉ハ本ニ  
 微ノクリコミアリテ短柄五生シ。鞘膜様ノ鱗アリ。茎葉柄中筋等ニ紅色ヲ帶テ毛  
 刺ナク。梢葉腋細枝ヲ出シ。二三並五生シ。每頭花ヲ簇生シ。多キハ十余花。略ミソ、  
 バノ如クノ彼ノ如ク多カラズ。莖莖様。花形亦相似テ鐘狀五裂。質厚ク滑ニメ色淡  
 黄殆ト白色。爪ニ微紅暈アリテミゾ、バノ瓣尖微紅ナルト不同。實礎三稜一柱  
 三裂結頭アリ。雄蕊ハ約暗紫色ニ白粉ヲ吐キ。花底蜜腺アル。ミゾ、バノ如シ。花老テ瓣不脱。漸  
 ク膨大併結シ頗ル圓ノ五縱道アル實體ヲナシ。上ニ透明瓊脂ヲ以テ衣スルガ如ク。内ニ蕎麥ノ如ノ  
 小ナル三稜黑色ノ子ヲ収ム。ソノ花瓣膨脹ノ熱實ヲ被フノ態。紅板歸又落莖ニ於ルガ如シ。自生  
 ノ地ニ在テハ根細大ナルニ至ト云氏。吾郷ニテハ然ラズ。

二十六種  
 ドニトルユム  
 ホーケ  
 ドイセントコイフ  
 按 *Baly's Journal Pinetum* 及 *Keule's Pinetum* 蘭ノ形状林氏所記精シカ  
 サレ氏本条ヲ云モノ、如シ宜他書ヲ参考スベシ



大葉  
 本葉...  
 大ニハ...  
 花...  
 葉...  
 根...  
 實...  
 子...



イブキトラノオ

拳参

伊吹山ニ多シ。故ニソノ名アリ。葉羊蹄<sup>ヤビ</sup>葉ニ似テ狭小ニテ深緑色。茎ニ紫色ヲ帯ブ。夏莖ヲ起ス。一ニ尺。葉ヲ互生シ。一二寸ノ穂ヲナシ多花ヲ放ク。ソノ花タル褐色鱗形ノ三薄苞中ニ細梗アル一分許ノ三花ヲ出ス。花体鈍三角。卵圓六弁。ソノ三八稜ヲナシ。三八面ヲ被フテ正開セズ。淡紅殆ト白色。實礎蕎麥形。色淡黃帶褐。諸色ニメ三柱。雄蕊長短八莖。葯淡紅紫色ニメ白粉ヲ吐ク。莖下ニ淡紅色ノ蜜腺アリ。根指大ニメ曲テ海蝦ノ形ニ似テ黒褐色。白山御嶽寺ノ北地高山ニ生スルモノハ葉末不尖質厚ク剛ノ光アリ。主能藥鏡ニ詳ナリ。

附 一 全花 二 實礎兩蓋共部 大圖

第二種

ハリゴスム

*Polygonum*

ヒストルタ

*digitata*

ナートルウフルトル

*naturborstel*





ハルトラノオ

イロハグサ 瓦別

紫参

深山陰地ニ生ス。二三月根頭ニ先ツ花莖ヲ出シ穂ノナシテ花アリ。六瓣白色粉紅  
 ラ帶。穂形孑花莖實礎ノ状。皆拳参ト同シクメタ、穂稍短ナルノミ。尋テ叢葉ヲ出  
 ス。形亦前条ニ似テ濶短。面綠色背微白ヲ帶。根ハ地黄ノ如クメ節アリ。黒褐色ニノ  
 長ク地上ニ延テ。前条種ノ蝦形ヲナスト不同。又小葉細葉圓葉等ノ種々アリ。花莖  
 ニ於テハ一般異ナシ

按前条ノ一種タル勿論ナレト。林氏所載ノ品中の當ノ種名未詳。物印滿所舉ノ

ヒストルタ

マヨル

フユルガリス

*historia*

*major*

*vilgaria* ノ圖此種ニ的當スレト。說中ニ一ニノ嫌

アリ。姑ク期後考






細葉ハルトヲノオ

紫参一種

早春葉芽ト共ニ莖ヲ抽キ。一細葉ヲツケ梢ニ穂ヲナシテ花アリ。常種ニ此スレバ  
花尤早シ。根ノ結節此種ニ在ツテ尤著ク。葉ハ常種ニ似テ小。面綠色背帶紫色柄亦  
紫。後葉漸ク大ニ紫色亦去。殆ト常品ノ如キニ至ル

種名未詳





クリンユキフデ

紫参一種

北國山中ノ産花葉惣テ紫参ムラサキノコト同ケレド。稍小ニノ花穂短ク。花茎ニ三四葉ヲ互生  
 ス。ソノ梢ナルハ。無柄ニメ茎ヲ包ミ。葉ニ沿フテ又三五花ヲ出スノ異アリ。クリン  
 ユキフデノ名義難認。ダシザキノハルトラノオト稱スベキナリ

西書中未見有此種名





夕テ、マタテ、ホシタテ、蓼、即辣蓼

蓼類多種アリ。ソノ茎葉無毛ニノ味辛ク普通ニ食料トスルモノヲ。マタテ、ホシタテト云。即辣蓼トス。惣テ辣蓼馬蓼ノ類ニナ毎節節アリ。葉ノ上縁ニ長毛アリ。或ハ多。或ハ寡。又或ハ毛ナキモノアリ。葉中花ヲ出シ穂ヲナシテ點綴ス。穂或ハ直五。或ハ傾歪。如木。花下小苞アリ。或ハ一花。或ハ二三花ヲ出ス。如木。或有梗。或ハ無梗。如木。花鐘様五裂。見テ為蓼。或ハ大。或ハ小。如木。或ハ半開。或ハ盤口ニメ白色。或ハ白質紅。暈アリ。實礎三稜ニメ。三柱結頭白色大抵蓼類ハ二柱ニメ三裂。或ハ二裂ニメ殆ト。二柱三柱ナル如シ今林氏ノ例ニ從テ二柱。或ハ三柱トス。雄莖八茎。往々六茎。葯白色。凡テ蓼類ハ蕎麥拳拳ト同ク花老テ瓣不脱實ノ熟スルニ至ル。實三稜。蕎麥ノ如ニメ小。色赭褐ニメ光アリ。今人家所栽ノ蓼類種々アリ。就中昔常ノ品ニ葉形圓長ノ二種アリ。ソノ甲圓者ハ。卵圓ニメ尖鈍。長者ハ狭長披針狀。共ニ色青ノ葉面不帶紫色。往々茎柄葉ニ蕾ニ微紅色ヲ帶ルアレ氏。概メコレヲ青蓼ノ内ニ収ム。一種葉。狭細色青緑ニメ紅色ヲ不帶。花純白ニメ尤青蓼ノ名ニ適

當ナルモノアリ。又紫蓼ハ。葉圓葉ノ青蓼ニ似テ差々長クメ尖リ。稚葉紫色老テ漸ク緑色トナル。赤蓼ハ。葉尖前条種ヨリ鈍ニメ紅色。惣テ紫蓼。赤蓼。共ニ花開キテ紅暈アリテ青蓼ノ白色ナルト不同。此他葉ノ形色ニ種々アレ氏味辛辣ナルハ食料藥用共ニ通用シテ異アルナシ。功用藥鏡詳之故ニ略ス。辣蓼馬蓼ノ類ハソノ原種ノ殊異アルノミナラズ產地ノ不同實生ノ变化ニヨツテ其數愈加リ。之ヲ收萃スルニ暇アラス。故ニタ、ソノ殊標アルガ如キノ種ヲ下ニ掲載シテ僅ニソノ条ヲ分ツ。附一 全花 二兩蓋子室共郭大圖

第九種

ホソクサ 草花  
*Polygonum hybridum*  
シケルガ  
*Schup. Linn. Rhynchos.*  
フイセシトコノノ

按林氏此条下ニ半列夜ニ心葉ノ文アリ阿須氏亦從テ二裂ニ圖シ本條ノ三裂ナルニ不同レ氏他ノ形状味辛辣ナルヲ符合スルヲ以テ本條ト断ジテ春氏 *Barbatum* トスルニ不從

五十七 草木土表








ホソバタデ


人家所植ノ品中葉狹細ナルモノニ種一ハ尤狹長ニシテ本末共ニ尖銳ナルヲ吾邦俗サツマタデト云。又<sup>ニ</sup>稍濶短ニシテ尖銳ナラサルヲアザブタデ又エドタデト云。又尤狹細纖長ナルヲイトタテト云。ミナ味辛辣食用ニ佳トス





イトタデ

茎葉纖細真ニ糸ノ如キモノ。又稍粗キモノ等ニ種アリ。又培養ニヨツテ肥瘠大小  
亦一ナラザレ也。ソノ纖長ノ態ニアツテハ一般ニナシ





往々原野ニ自生シ。形家蓼ノ如ク茎帯紅褐色。葉差狭長味辛辣。花家蓼ヨリ晚ク馬  
 蓼ト同時ニ放ク。穗状家蓼ノ如ク垂レ。花微大ニメ四裂時ニ五裂ヲ交ヘ半開白色  
 微紅暈アリ。實磯扁圓ニメ尖リ。一柱半裂殆トニ柱ヲナシテ短。雄蕊六莖長ク瓣外  
 ニ出。蒴淡紅ニメ吐黄粉。花表へ瓣尖紅変シ瓜ニ綠色加リ。實熟ノ扁尖膨脹黒褐色。  
 附 全花實磯兩葢郭大圖

按已上所載ノ品ミナ味辛辣ナレバ共ニ同類異種ニ可收。就中此種ハ。二柱ニメ  
 花色亦紅暈アリテ阿須氏ノ所圖ニ吻合ス





カハタデ

ミソクダテ

水蓼

山邊清流ノ中ニ生シ。流ニ從ツテ長ク水底ニ引キ。節々根ヲ下ス。葉ヤナギタデニ似テ長ノ尖銳。鞘様籜他ノ蓼類ト同シク。籜中枝ヲ出シ籜々繁茂シ。四時常ニ葉ヘズ。冬猶青翠芽ヲ出シ。味至テ辛ク可食。偶ニ淺瀬ニアツテ擡頭スレバ秋花アリ。葉蓼ヨリハ大ニノ半開白色淡綠華アリ。蕾ニアツテハ尖ニ淡紅華ヲミル。二柱六雄蕊ナルヲ亦ヤナギタデノ如シ常ニ水底ニアレバ開花ニ不及。籜中ニ於テ直ニ結實スルニ至ル

附 全花部大圖

西書中未見此種





イヌタデ

馬蓼

イヌタデハ野生ノ辛辣ナキモノ、惣稱ニカ、ル、ノ品一ナラズ。草ニ大小花ニ淡紅白色。葉ニ潤狭。葉面墨記ノ有無、ツノ墨記ニ濃アリ淡アリ。又面背共ニ白毛ノアルモノ。又早晚種ホノ多種アリ。氏。ミナ辣蓼如キ辛辣アルヲナキノ概徴ヲ同フス。今本草所奉ノモノハ、尾州ノ俗アカノミト稱スル品ニ。鈴傍溝畔普ク生シ。茎高一尺余。葉卵圓披針狀ニノ、葉心ニ墨記アリテ、花穂長カラズ。色頗ル紅ノ形鐘様五裂半開ノ小。實礎三稜。一柱三裂結頭白色。雄蕊八莖。莖六ニ莖葯淡紅白粉ヲ吐キ。僅ニ柱頭ノ上ニ出。實熟ノ黑色蕎麥ニ似テ小。一種草差大ニ花色淡ク葯黄色ニノ白粉ヲ吐クアリ。附 全花并實礎兩莖部大圖

第十種

*Polygonum persicaria*

*subvar. oviflorum*

*Polygonum persicaria*

蓼

按林氏此種下葉上墨斑多少種々不一。或ハ墨斑ナキ者。又花ニ紅白葉ニ廣狭。或ハ脚葉ニ毛茸アルモノ。又茎地ニ塌ノ時ニ擡頭シ。又草小ナルモノアル等ノコトヲ云フ。本邦ノイヌタデノ種々アルト一般ナレバ。今概シテイヌタデノ名ヲ下ニ近道アル処ノ數種ヲコノ下ニ列奉ス






サナヘタデ

ナツタデ

春未草已ニ生シ。形アカ、ノマ、ノ如ニメ小。葉差ヤ狭長面ニ墨記背ニ微々白纖毛アリ。小満ノ頃花アリ。穂アカノマ、ノ穂ヨリハ太フメ短。花形微扁ニメ色白質微紅暈。又緑暈アリ。實硬圓扁ニメニ柱雄蕊大低五六。此種馬夢中ニテ花尤モ早キト録ノ上邊ニモナキトノ殊標アリテ他種ト別ツ





ハナタデ 尾明

アカノマ、ノ一種ニノ山嶽原野ニ多ク。葉稍ヤ潤短尖鋭ニシ。墨記或有。或無ク。而  
 背共ニ微毛アリテ。葎毛亦長ク。花穂蓋形一般ナレドモ。紅單更ニ淡ク。アカノマ、  
 ト同時ニ花アリテ。一見混シ易ケレトモ。前件ノ殊徴アツテソノ同種ナラザルコ  
 昭然クリ。 附 全花部大圖





矮生イヌタバ

アカノマ、ノ一種高一尺許。枝葉密附シ。葉縮裂波紋孳生種ノ常態ヲナス。花莖實形異アルヲナシ






茎二三尺。節微膨レ。葉卵圓披針狀ニノ。八字黒斑アリ。味微辛。穗差長ノ少ク垂レ。花  
 白色淡紅暈アリテサクラタデノ如クメ稍小。短梗ニメ密綴ナラス。瓣收閉ニ至レ  
 バ紅色更ニ加リ。瓜ノ黄緑漸ク濃ク。恰モ緑萼上深紅ノ花蕾アルガ如ク。ツノ長盛  
 花ノ看ニ勝ル。惣テ蓼類ハミナコノ態ナレド實礎三枝ニメ殆ト三柱頭白色雄蕊  
 八莖葯亦白シ 附 全花實礎并柱部大圖





廢田ノ中ニ生ズ。莖纖弱一尺餘。葉披針狀ニメ小。味淡ニメ苦辛ナラズ。花二三ツ  
 ツ疎ニ簇生シテ長穗ヲナス。ツノ形ヌカボノ穗ノ態アリ。瓣五裂頗ル開展。略サク  
 ラクデノ花ノ如クメ小。大ナ一分ニ不足。白質ニメ夫紅暈。或ハ紅色ノハケコミア  
 リ。莖亦微紅色ヲ帶。一種花葉ニ紅色ヲ不帶モノアリ。實硬扁尖膨脹殆トニ柱雄蕊  
 五莖白蒴淡紅粉ヲ吐ク。實熟メ老褐色。附 全花實變兩益郭大圖





住々原野ニ生シ。葉ヤナギタデヨリ狭長ニメ。質剛厚面背共ニ細剛毛アリ。邊緣殊ニ多クメ撫之バ糙澁尤甚ク。箨上ホ細毛上縁長毛アリ。秋梢上細長穂ヲナシ細白花ヲ綴ル。ヤナギタデヨリ小。此種全形略ヤナギタデノ如クナレドモ辛味ナク。茎上粘稠液ヲ滿布シ手ニ粘着スルノ一殊性アリ。依テ普クソノ名ヲ傳フレ

西書中未見載此種






白イヌタデ

茎長シ地ニ塌シテ擡頭。葉頗ル厚強深綠色ニノ墨斑アリ。味淡ニノ苦辛ナラス。花  
 穂稍粗フメ少ク勾リ。花ヲ簇生ス。大サ乙種ノサクラタデノ花ノ如クナレ氏。五裂  
 半開ノ彼ノ如ク披展セス。白色ニノ瓜綠色。實礎扁尖ニノ殆ト二柱結頭白色。雄蕊  
 六莖約亦白色。共ニ瓣尖ノ下ニ居ス。實熟メ高ニメ膨脹老褐色此種素名ノ西郊溝  
 畔ニ多シ。他処亦普ク生ズルノ品ナラン。余未タ之ヲ詳ニセス。附實礎兩莖郭

大圖




七十一  
 水在表



サクラタデ 甲

茎二尺許。葉披針狀ニメ墨記アリ。味微ク苦辛。花穂頗ル直立。花鐘狀五裂殆ト展開。  
 色粉紅蓼類中尤大ニメ美ナルモノ也。實礎三稜一柱殆ト二裂結頭白色ニメ短ク。  
 雄蕊八莖長ク瓣外ニ出。葯淡紅白粉ヲ吐ク。一種花同形ニメ色淡殆ト白色ナルア  
 リ。惣テ蓼類多クハ夏草ナレド。サクラタデ。水タテノニ種ハ宿根込。附 兩莖部  
 大圖





一種サクラタデ

草形前種一略同ノ葉稍狭長ニメ墨紀淡ク花微小ニノ色淡ク三柱長ク瓣外ニ立  
千。八雄蕊短ク花心ニ居ス 附 兩葉郭大圖




博金郭大圖



白花サクラタテ


木曾川堤上多生ス高ニ三尺。葉狭メ長ク。花穂直立花五裂半開大ササクラタテノ  
花ヨリ小。ボントククタテヨリ大ニメ瓣少ク長メ白色。梗頗ル長シ。實礎扁三枝ニ柱  
長ク瓣上ニ出ヅ間ニ三柱ナルヲ交ユ。雄蕊八莖兩莖ミナ白色。味苦渋ニノ不辛。此種  
花形色略白イヌタテニ似レドモ。宿根ニノ直立スルノ性ニアツテハ。サクラタテ  
ニ同シ。故ニ或白花ノサクラタテトス。又一種微紅暈アリテ葯淡紅ナルアリ

附全花那大圖





茎高三四尺。節高ク色帯紅。葉披針狀ニノ頗大ニノ墨班アリ。肋脈頗密ニノ著ク。味微淡。花穂不長ノ少ク勾リ。花短梗密簇体扁ニノ稜ナク。四裂半開白色ニノ微々黄緑暈アリ。實礎扁ニノ柱ニ裂殆トニ柱。頭白色。雄蕊六ニノ白葯或ハ淡紅。長サ大抵辨ト齊シ。花衰テ帯紅色。ソノ色ニ淡濃ニ種アリ實熟ノ扁ニノ老褐色」 附一 全花 二 實礎 并柱 三 花衰色實礎者 共郭大圖





茎高三四尺。節頗ル豊大。葉柳葉ニ似テ大ニ。オホイヌタデノ如クメ肋脈被ノ如ク著カ  
 ラズ。茎葉共ニ長毛茸々ニノ一種ノ香アリ。味苦澁ニノ不幸。茎并ニ葉ノ大筋ニ帯紅色。鞘様  
 箨ノ上縁分裂ノモヲナス。全体<sup>オホイヌタデ</sup>茹草ニ似テ稍小ニノ葉狭長。花盤口展開ニ至ラス。色粉  
 紅。實稜三稜ニノ殆ト三柱。雄蕊六或ハ茎ニノ葯淡紅白粉ヲ吐ク。花老テ紅色更ニ加  
 リ。ソノ看ホントクタデノ如ナレ氏。鮮瓜緑変セズ及テ暗紅。實熟メ黒褐色蕎麦ノ  
 如ク小 附 全花部大圖

按此種林氏第八種ニ載ル

*Polygonum orientale*

*glaucum*

*Polygonum*

前ノ圖説ニ大ニ相似レ氏。ソノ五雄蕊三柱ト云。又實扁圓

ト云ニ不符合。或ハソノ一種トセンカ





啓蒙形状ヲ詳ニス。籐他ノ蓼類ト異ニシ。上ヒロク喇ハ様ヲナシ。花五裂。粉紅雄蕊  
七莖白粉ヲ吐ク。實瓊圓扁一柱殆ト二裂」附 全花部大圖

第十二種

カリゴユム

カリシキターレ

カリスナルス


ドイセンドコノア

*Polygonum orientale*

華 *castroch*

*Smith & Knapp*

蘭





吾郷所栽ノ者ニ圓葉長葉大葉シカニ葉ノ四種アリテ。ソノ葉形ニ各々些異アレ  
 ドモ。花實ニ異ナシ。藍ト蓼トハ。全形相似テ鞘様葉ノ上縁平ニメ頗ル長毛アリ。花  
 鐘狀五裂白質紅暈アツテ。花後紅更ニ加リ。實礎三稜。間。扁ナルヲ交ユ。扁者柱  
 三裂殆<sub>三</sub>三柱頭白色。雄蕊七莖。間。六 莖。蒴淡紅白粉ヲ吐キ。實熟メ黑色ニノ三稜。已上ノ  
 諸事。蓼ト略同シケレド。蓼ハ一苞内ニ三花。藍ハ五六花ヲ出ノ異アリ。又味淡ニノ  
 辛苦ナルヲナク。専ラ海家ノ用ニ供ス。附 全花郭大圖

按本条ノ *Polygonum* ホリゴメム ノ属タルヲハ勿論ナレド。西書中の當ノ種名ヲ未考。

春氏 *Polygonum chinense* ホリゴメム ノ名ニア井又イタドリノ名ヲ下ス。今林

氏ノ文ヲ閱ルニ藍ト不同。春氏何等ノ品ヲ指ヤ不詳





イタドリ 虎杖

啓蒙形状ヲ詳ニシ。且産處ニヨツテ大小不一ヲ載ス。又花莖ノ形状条下ニ詳ニ  
 ス故ニ略之。花白色ニメ淡黄華アルヲ常トス。又紅華ナル一種アリ。ベニイタドリ  
 ト云。又八丈イタドリハ。高八九尺ニメ。葉木方へ膨起シ未狹長ナリ  
 附一全花 二側面見花頭 共郭大圖

ホリゴヌム  
*Polygonum*

ムユルチアロルユム  
*multiflorum*

春氏






マイゲツサウ

虎杖一種

茎葉イタドリト一撮ニノ差小。花微大ニメ帯紅色。茎并葉腋亦紅ク。梢上葉腋ニ花  
 莖ヲ出ス。二寸許。細莖ヲ分チ有梗細花ヲ以テ略穂状ヲナス。莖三稜。每稜頂ニ各  
 一瓣アツテ内ニ二瓣ヲ包モ。併セテ五瓣花ノ状ヲナス。此ニ見テ五瓣花ノ如ナレ  
 凡。每稜ノ三瓣ハ内ノ二瓣  
ト形異ニ。稜頭内ニカハへ背紅色殆ト等ノ如ク。更ニ内ノ二瓣ヲ合テ花弁ト見ル  
 モ可ナルガ如ナレド。即チヨホリゴス。此ノ常態トシテ併セテ五瓣花ト見テ可ナラ  
 ン  
 實。稜三稜半ハ莖ニ着レ。稜上紅色頂三片ニ分レ。頭花又ヲナス。雄蕊八莖。白色短  
 葯。五瓣ミナ不脱。子室ヲ包ミ實状ヲナス。又云花數多ケレド。結實ニ及ブモノハ一  
 莖中ニ三五ニ過ギス。附一全花 二半熟實 共郭大圖





何首烏 通名

啓蒙草状ヲ詳ニス故ニ略之莖三稜蕎麥ノ如クシテ纖細短梗アリ。花五出披針狀  
白色微黄緑暈アリ。實礎三稜頭三出筒狀。雄蕊八ニノ白葯。我邦根尾山ニ自生アリ。  
漢種ト同シ 附 全花郭大圖

第二十五種

ポリゴナム ゴニホルブルニス

ジークウヤク

トイセ

*Polygonum cordobolus*, *bocklinde*, *Distichlis*

春氏并西勃氏所定

余林氏所説ノ関ルニ。簡畧不詳。又ソノ第十九種 *Shinngae* ノ下ニ

ヤツパンス

トイセ

*Japanych Distichlis* ノ一種ヲ舉。ソノ圖説尤本条ヲサスモノ、

如シ。只莖并ニ花四裂ノ一語。本条ノ五裂ナルニ背ケドモ。林氏本ト吾乾腊花葉ヲ  
以テ檢スルナレバ。或ハ誤認ニ出ルナラン



本草綱目 卷之六 何首烏 八十一 平水全成



ツクバ子サウ 王孫

深山幽谷ニ生。莖高七八寸。卵圓披針狀ノ四葉莖頭ニ攢生シ。色淡緑ニシテ本ニ暗紫  
暈アリ。中心一梗一寸餘。頂ニ一花ヲ開ク。花被四糸ニメ。形色葉ト同メ小。下条ノ花被  
四弁ノ萼ト見無花。子室圓ノ四匹。四柱頗ル長ク。莖上ニ出色紫褐。雄蕊八莖黃約。根  
ハ横行スル。下条ノ根ト同シ。又御嶽ニハ一種小シテ高僅ニ二三寸ナルヲ産ス。

第一種

*Paris quadrifida* (タエアドリホリア) *Paris quadrifida* (ヒールブライガフ) *Paris quadrifida* (ウツレルフスベニー)

按林氏所說阿須氏所圖等ヲ檢スルニ。ミナ葉ハ本条ノ如ク四葉相對シ。花ハ次条種  
ノ如ク萼四片花四瓣。而モ萼大ニノ瓣狹細ナリ。依之看之ハ。本邦所産ノ二種共ニ  
的當ナラザレソノ一種タルニ論ナク。功用亦同シカルベキヲ推テ可知。林氏云。或  
云此草有麻性或云否。又云狗ノ信石及升車丹五分ヲ食ヒタルニ實ヲ制毒劑トシ用テ治セリ。又云人ノ  
半痴ヲ復治ス。又草ヲ持テ芭布ヲ製シ。陰処ノ腫瘍及他ノ焮腫ニ貼メ消散ス。



四味蓋



東北寒地山中ニ生ス。高一尺許。葉披針狀ニメ色淡緑。八葉攢生シテ一蓋ヲナシ。中心梗ヲ挺ク。二三寸。頂ニ四大瓣四細瓣併テ八瓣ノ一花ヲ放ク。ツノ大者ハ披針狀ニメ四瓣ヲ以テ花體ヲナシツノ細者形糸ノ如ク。四大瓣相接スルノ上ニ出テ。葉下シ大瓣下ニ至テ反卷ス。色ニ淡黄ニメ葉ノ如シ。實礎上圓ク下ニ至テ縦ニ四ノ凸凹ヲナシ。色褐紫黒。柱頭四裂殆ト四柱ニメ未放開シ。雄蕊八莖纖長尖銳。莖長クノ莖ノ中間兩側ニツキテ黄赤色。根ハ長ク地中ニ横行シ。粗サ著ノ如ク処々結節アリ。此品草狀差キヌガサ、ウノ看アレヒ。根形ツクバ子サウニ不外。惣テキヌガサ、ウ。ツクバ子サウ。エニレイサウ。ミナ花被脱セズ。漸ク緑変シ。實ノ熟ルニ至ルマデ固著シテ共ニ枯ル


説詳前条下





深山幽谷ニ生シ。茎高一尺許。圓尖三葉茎上ニ並ヒ生シ。中心一小梗ヲ出シ。一花ヲ開ク。卵圓三瓣。見テ為綠色或ハ帶紫或白色或粉紅色等ノ數品アリ。子宮圓尖六稜ニメ三匹。頭僅ニ三裂。雄莖六莖葯白色。辨莖共ニ久ク不脱。實ノ熟スルニ至ルハ似類ノ品ト同シ。實熟メ綠色或黑色。此種ノ根ハ頗ル塊結シテ。ツクバ子サウト不同

按ニ辨莖ノ數不同レトホ *Pachys* ノ屬ニ可收西書中未見此種





キヌカサ、ウ

北地高山白山乘鞍等ニ産ス。自生ノモノハ高サ二三尺。一葉ノ長サ尺ニ及ブ。之ヲ  
園中ニ移セバ。漸ク小ニシテ花ヲ開キ成全ナラズ。終ニ不育ニ至ル。一葉一莖ノ頂大  
低八九葉ヲ以テ一莖ヲナシ。中心ニ葉ト共ニ花アリ。長スレバ梗ニ寸許。瓣純披針  
狀。其數葉ト同ク。色初メ白色微々黄色ヲ帶。後淡緑トナツテ實ト共ニ終ル。子室圓  
メ六縱條ヲ具シ。頂ニ褐色ノ六裂片アリ。雄蕊大抵二十許。子室ヲ圍ヒ長約黄色。根  
深ク地中ニ横生シ。形略菘蓂根ノ如ク大ニメ白色

所属未詳 按此草蓋數ニヨレバ第十一綱ノ四五目中ニ可收モノナレト全

形ヲ概視スルニ *Parsons* ノ属ニ外ナラザルモノ、如シ。故ニ姑クコ、ニ載セ

テ俟後賢訂正



卷之十

八十四

平林全載




山足垣下砌間等ニ多ク宿根ノ芽ヲ出ス。纖細ノ長柄上ニ三葉一莖ニツキ。每葉缺  
 刻三起圓頭齒アリ。根葉間莖ヲ抽ク一尺許。三五枝ヲ分ツ。ソノ枝本必ス一葉アリ。  
 形根葉ト同メ柄短ク木朔様ヲナシテ枝ヲ抱キ。梢ニ至ツテハ無柄猶三葉相聚  
 ヲテ擁之。每枝頭一花。形略ホウカヅウノ花ノ如メ至ラ小ニメ向上。無萼ニメ五瓣  
 披針狀淡藤花色。瓣内鑽狀ノ五蜜槽辨アツテ兩蓋ヲ抱擁ス。色淡綠白。實礎圓長四  
 筒。雄蕊八ニメ黃約。根横生白色。

附一 全花 二 蜜槽辨 三 實礎并雄蕊

共郭大圖

所属未詳





キツ子ノオ

甲種

溝漬止水ノ中ニ生シ。圓莖長ク延キ四緒葉投生層ヲナス。小緒大低十對細メ絲ノ如ク。恰モ扁翅ノ状ヲナス。ソノ初水底ニアルヤ。葉大ニ。梢ニ至テ漸ク小。夏未擡頭水面ニ出ルニ至ツテ。ソノ状大ニ異ニメ。中筋小緒共ニ稍粗メ短シ。然レモヒ種ノ葉ノ潤ノ且小緒ノ數少キト不同。夏秋ノ際。梢葉腋毎ニ花アリ。葶即裸子室ニメ圓長四縱道アツテ殆ト鈍方。頂ニ四尖起アリ。花鈍披針狀四瓣淡黃殆ト白色。四柱頭花底ニ並フ。雄蕊八。短莖長約ニノ黄色。瓣蓋脱メ柱頭漸伸開。毛球ノ如メ白色。葶下ニ四裂小片ノ二葉アツテ。又葶ノ用ヲナス。

附 一 全花 二 葶并葶 三 柱頭伸開者 共郭大圖



附 全花并葶

ハキツ子ノオノ葶葉腋ニハ花アリ。葶葉腋毎ニ花アリ。葶即裸子室ニメ圓長四縱道アツテ殆ト鈍方。頂ニ四尖起アリ。花鈍披針狀四瓣淡黃殆ト白色。四柱頭花底ニ並フ。雄蕊八。短莖長約ニノ黄色。瓣蓋脱メ柱頭漸伸開。毛球ノ如メ白色。葶下ニ四裂小片ノ二葉アツテ。又葶ノ用ヲナス。



梢葉二倍圖





キツ子ノオ

乙種

水田中甲種ト同処ニ生シテ殆ト混同シ易シ。此品ハ三葉相對シ。間四葉小鱗ノ數  
 少シテ恰モ魚骨ノ状ノ如ク。甲種ト同時ニ花アリ。花至小ニメ内眼辨シガタシ。萼  
 鐘狀四縱道アリテ四尖。頂ニ四箇ノ白色旋毛球アリ。開之麥粒狀ノ四箇。實稔各一  
 柱。頭穂ヲナスモノニメ。甲種ノ瓣蓋脱シタル後ト一般。ソノ花將開ノ際ニアツテ  
 モ。更ニ瓣蓋ヲミズ。鐘狀萼ノ四尖ノ中ヨリタゞ毛様ノ綻出スルヲ見ルノミ。或ハ  
 ソノ中ニ雄蓋アルモ至細ニメ檢シ得サルニ由ルカ。或ハ別ニ雄花ノアルモ未タ  
 之ヲ見サルカ。又或ハ甲種。雌ニメ此種ソノ雌ナルカ。存疑姑ク後考ヲ期ス。又甲種  
 ノ水中ニアルヤ。葉翅毛様ニメ稍葉ト大ニ異ナレ也。此種ハ脚葉翅毛様ナラス

附 全花郭大圖



葉一倍圖

蘇材以是種...

日...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



レンブクサウ

コリンバナ

高四五寸ノ宿根草ニメ早春茎ヲ抽キ、葉莖三叉ニ分レ略延胡索ノ葉ノ如クノ大  
花莖ハ中間ニ二葉ヲ對シ、莖頭四花向側輪位シ、中心一花向上、合テ五花ヲ以テ一  
房ヲナス。瓣卵圓ニメ尖リテ正開セズ。色淡綠殆ト白色。上位ノ一花ハ、瓣四裂ニメ  
八雄蕊、側位ノ四花ハ五裂ニメ十雄蕊、各、瓣ハニツキ短莖ニメ淡黃、子室半、萼ニ  
截レ扁圓ニノ頭四裂。或ハ五裂萼厚メ三尖起アツテ展開ス。西人花香ニヨツテソノ  
名ヲ下セ也。今檢之ニ微ニメ著カラズ

附 一 全花 二 柱并萼 共 鄂大圖

アドキア モスカトルリナ  
*Sata moschattelina.* モスカトルリナ  
*europaeica* エウロピス  
*muskius Ktoid.* モスクニスコロイド

按林氏産数種々アルヲ云テ八綱四目トス今從之



本種...  
花...  
葉...  
莖...  
...



山野ニ生シ。茎細メ如線地上ニ引キ。每節鬚根ヲ出シ漸ク擡起五六寸。葉大サ豆ノ如クノ尖頭鋸齒アリテ對生シ。莖頭數枝ニ分レ細花ヲ下ニ向テ點綴シテ穂ヲナス。葶擔圓ノ裸子室ニメ四葉ノ三角形ノ萼アリ。花大サ一分許。披針狀四瓣淡黃帶褐色。長葯ハアツテ下出ス。色紫褐破綻黃粉ヲ吐ク。瓣蓋尋テ落チテ後雌蓋漸ク見エ淡紅旋毛様ノ四箇萼ノ上ニ並ブ。又一種莖地上ニ引カズ擡頭スルモノアリ。葉形花狀異アルヲナシ。附 一或花ニ瓣蓋露雌蓋僅見 三雌蓋盛開 共邦大圖

所屬未詳

按奈氏第四綱ノ下ニ

*Gonosarpis nicotiana* Kun.

一條ヲ奉テ、ハゴグソト云

和名ヲ下シ。精圖ヲ以テ其形ヲ示ス。視之本奈ニ異ナラズ。西勃氏亦アリノトウグサナリト断ズレドモ。参考スベキノ書ナク。且ソノ所収ノ綱ヲ異ニスレバ疑ナキヲ不能。姑記シテ後ノ考ヲ俟





ヤマゴボウ

高陸

往々山林陰地ニ生ス。宿根苗ヲ生シ圓莖高三四尺。葉烟草葉ニ似テ小ニモ互生シ。夏稍葉間ニ花莖ヲ出ス。五五六寸。有梗無萼ノ花ヲ以テ穂ヲナス。五弁卵圓初ノ白色漸ク淡緑ニ変ス。實瓊柯子状ニメ長淡綠色。八箇並集各頸一白片ヲナシテ外反ス。雄蓋八莖。初メ淡紅葯アリ。己ニノ脱落ス。梗ニ二三ノ細片葉アリ。一種花色淡暗紅色ノモノアリ。漢人所謂赤呂コレナリ。附 全花部大圖

第一種

ヒトラツカ

ヲクタンドラ

ワットマニニ

ラックアラント

*Phytolacca*

*astanica*

*agtemanrice*

*lakblant*

藺





第九綱 九雄蓋

エニチアンドリア  
*Cume andria.*

漢種大黃

春宿根苗ヲ生ス根葉白桐葉ハコヤクヤニ似テ大ニ長ニ尺許中亦潤ノ尖リ。初生ハ邊縁微ク皺縮波紋ヲナシ。柄一尺許上面溝道アリテ帶紫色。夏圓莖ヲ抽。高六七尺葉ヲ互生シ。梢上葉腋共ニ枝ヲ分チ穂ヲナシテ花アリ。形略羊蹄花ニ同フノ色淡黃綠白。雄蕊九莖ニノ黃鈔。實礎三稜三柱ニノ結頭白色。羊蹄花ノ六雄蕊三柱ニノ頭花又ナルト同シカラズ。實形亦羊蹄ノ實ニ似レトモ。ツノ三萼瓣ハ實ノ三稜下ニツキ。三瓣花此萼并花瓣ノ稱ハ羊蹄下ニ詳ニス可併見ハ扁面中心ニアタフテ頗ル粒起スレトモ。羊蹄ノ花瓣ノ中心扁面ニ珠塊ヲナスト同シカラズ。

第一種

レユム ラボンチクユム

レフアントセ

ラバルブル

*rhizoma raphanosticum.* 單 *lobentzke rhubarbarum.*

苗

按本条莖葉花實ノ形略羊蹄ニ類似スルヲ以テ往々誤認シテ羊蹄ト一屬ノ看ヲナスニ至ル。林氏ハ *cinost.* ルユノキス 蹄ハ六雄蓋ニノ三柱 *rhubarbarum.* レユム 大ハ九雄蓋三柱ナルヲ以テソノ別屬タルヲ明ス。尤モ證トスベシ。又林氏レユムノ屬ヲ分ツテ五種トシ。ソノ普通下劑トスルモノハ第二第三第四ノ品トシ。本条ハ普通所用ノ品トハ異ニノ乾末ニテハニ莖ヨリ四莖。煎服ニハ八莖ヲ以テ緩下ヲナシ。收瀉尤甚クノ下劑赤利ニ用テ功アルノ品トス。

附一 金花 二 半熟實 共邦大圖





卷之七  
九國八目

九十二  
五木正成

五木正成



卷之七  
九國八目

五木正成

九十二



草木圖說前篇卷七終



卷之七

草木圖說

草木圖說



