

草木圖說前篇草部

十一

年

八

古

柏

一八  
學  
校

中  
華  
書  
局

古  
柏

柏

570,3

337

vol.8

彦立校印

草木圖說前篇卷八目錄

草  
木

部  
大

第十編

第一目

決明

ウエストインチセセンナ

大葉ゼンナ

ムメガサ、ウ

第二目

ユキノシタ

大文字サウ

紅花大文字サウ

人字サウ

ハルユキノシタ

毛大文字サウ

卷之ノ

ゼンダイサウ

ヤハタサウ

イセナデシユ  
デシコ

カラナデシユ  
セキ

ハマナデシコ

フヂナデシコ

ハマナデシコ

ヤグルマ

王不留行

ラセンサウ

オホヤマブスマ

ツノクサト映

大葉ツメクサ

ノフシグロ

ノミノフスマ

細葉ツメクサ

マンテマ

ヒランギ

第五目

ベンケイサウ

加賀ベンケイサウ

ミセバヤ  
タチモセ

キリンサウ

ヤマベンケイサウ

ツメレンゲ

小葉ツメレンゲ

圓葉マンチングサ

カタバミサウ

ヲキサリスローサ

センジユガニビ

ミツバベンケイサウ

ハマベンケイサウ

タマノオ  
バヤ

同一種

イハレンゲ

同一種  
ヤツガ

マンチングサ

ケレイ子ドンドルベールド

ミヤマカタバミ

マツモト

ガンビ

卷之八

白金

フシグロ

オグラゼンノオ

ハコベ

ミヤマハコベ

青ハコベ

ナンバンハコベ

サハジョン

オホヤマハコベ

ミナグサ

ヤマハコベ

草木圖說前篇卷八

大垣 慾齋 飯沼長順著



草部

第十綱 十椎蓋

デカンドニア

夏草ニメ苗高二三尺。葉鱗様ニシテ互生。初生ノ者ハ二對。後出者三對。小鱗ノ形倒卵形ニメ。末對ハ大。本ハ漸小。ソツ本鱗ノ中筋上ニ短刺様ノ黃赤色ノ一小体アリ。或ハ本鱗ト第ニ對トノ上ニアリ。林氏夏葉腋ニ二花。末ニ至ツテハ一花ヲ生此刺ヲ腺ト稱シ。カヌシア。概標ノ一トス。梗長ク。萼仰圓披針狀五片。花倒卵形五瓣。正中ノ一瓣ハ頂ニ一缺アリ。色深黃子室長角様ニメ曲り。雄蕊四種。ソノ二莖ハ長メ角ヲ挿ミ。四莖ハ短メノノ上ニ居ス。三十長薬。又角ノ下邊ニツイテ稍短メヒ様ノ薬アル。一莖又上邊四莖。後ニ莖短頭ヒ様ニメ項ニ短薬アル。三莖等アリ。已上雄蕊四種ニメ合テ十莖トス。雄蕊如此ナル。亦カヌシア。即此類ノ殊標ニカヽル。後莢ヲ結ブ長五六寸。内ニ子アリ。形赤小豆ニ似テ一頭尖リテ斜ニソギタル如クアリテ色黃褐ニメ光アリ。

按此種カヌシアノ屬ニ可収レトモ。林氏書中ニ的當ノ品ヲ不見。其第十六種ニ二花ヲ放ク。ヲ載レバ。或少少ノ一種ナランカ。

### 越後守節草

### 草木圖鑑 卷八



卵圓披針狀ノ小葉四五或六七對ヲ以テ一瓣ヲナシ。末大ニ本小。本ナルモノハ蓋後ニ向ヒ。柄本細小針狀ノ托葉アリ。瓣末中筋頭ニ針狀。又本瓣ト柄本トノ中間柄上ニ尖頭ノ一腺アリ。固詳之各以郭大ツノ葉夜合セズ。夏莖頭房ヲナンテ花アリ。莖捲圓ニメ五序。花五瓣略梅花ノ如ノ深黃色。各瓣大小アリ。上ノ一瓣大ニ。次ヲニ瓣稍小。下ノ二瓣更ニ小。位置下ニアツテ大ニ間<sub>ス</sub>子室角様決明ヨリ短メ勾ラズ淡黃綠色。雄蕊十莖。形決明ノ苦<sub>シ</sub>ノ如ク。只角下ノ一莖彼ヨリハ纖細ナルノ異アリ。後莢ヲ結バ。巨サ小指許長二寸許。中ニ扁圓子二行ニ並バ。此草土窖ニ藏レバヨク冬ヲ凌ケアリ。

按林氏

カスシア

第九種

カスシア

*Cassia Selecta*

サルカタ

華<sub>コムダラヘ</sub>

カスシア

蘭<sub>コムダラヘ</sub>

カスシア

ナル者本条ノ如ナレバ。小瓣四對ノ文ニ懼アリ。記<sub>レ</sub>于俟後考



ウエスティンヂゼセンナ

卷之ノ

五木

春實生シ直立五六尺。莖ニ粗キ線楞アツテ五縱道ヲナス。葉大葉旋那ノ葉ノ如ク。卵圓ニノ頭末尖銳。邊縁不可華細刺毛アツテ。觸之糙淡。初葉ハ三對。後大抵五對ニメ。末對尤大ナリ。中筋上一道ヲナシ。ソノ終莖ニツクノ處ニアツテ。鈍頭扁圓暗黒色ナル一腺。又中筋末端ニ同色ノ一刺アリ。秋晚梢上房ヲナシテ花ヲ綴ル。決明如ク。革瓣亦同メ稍小。雄蕊ノ形一般。只實礎鈎ラズノ稍細長。

此品嘉永年間ノ舶來。只センナト称ノ種名ヲ不傳。按ニ木本大量旋那ノ如クナレモ。草本ニメ中筋上ノ腺一。ソノ所在亦異ニ。雄蕊ノ形望江南決明等ト同フタ木本ノ品ト些異アリ。又嘗之ニ無味ニメ阿片ノ臭氣アツテ。大ニ望江南ニ道ノ。林氏所舉ノ第十種ノ形状ニ吻合ス。故ニ断ゾソノ品トス。但林氏ノ初ハ五對盛大ニアツテハ三對ト云ニ慊アリ

第十種 カヘシア フセイテンクリス

*cuspidata*

羅

ウエスティンヂゼ

カスシア

*Mutinlyche cuspidata*

蘭



嘉永年間舶來。灌木ニメ高五六尺。葉ニ枝ヲ分ナ枝末ヲ互生ス。每葉柄本針狀ノ小托葉ニアリ。小鱗ハ赤大ニ木漸ク殺キ。形橢圓ニメ畧決明葉ノ如クノ稍々重ノ小色暗綠ニメ面脉淡綠背淡黃綠色。四五對ヲナシ。每本對ノ中筋上ニ鈍針狀ノ一小腺アリ。夜ニ至テハ小鱗垂レ合ス。秋ま枝梢ニ有梗花ヲ以テ房ヲナス。五弁黃色形望江南花ト同シク。雄蕊形状亦同ク只じ様ノ三莢尤短ノ異アルノミ。子室角様ニメ上ニ勾リ。後蕊ヲナシテ長一寸余狭細ニメ扁レ。

按林氏ヨシムラノ偶。草本木本ヲ合ナ三十種ヲ舉シテ。林氏灌木類中草本ヲ取ム全數便草類ニ木本ヲ併ス。ソノ第十種ハ葉用是也。ソノ條下二數種アルヲラ云ヘ不精密叔墨盧氏ハ第一アレキサンドルセ。第二アメリカニセ。第三イタリアンセノ三種ヲ舉ク。シナ木本ニス。ソノ第一種ハ葉用ノ常種ニメ今舶來スル乾腊葉品ニ當ル。近來種子ヲ舶來スル木本二葉小葉ノ二種アリ。亦ソノ類ニ外ナラサレバ。其小葉即本ハ或ハ林氏所謂セシナ大葉ナシセシナ也。ナラ故林氏并叔墨盧氏等ノ考説形状容ナガハ難得其證。故ニ今形狀ヲ詳記テ後覽ノ断ヲ俟ツ。此二種ヲ試用スルニミナ下利ノ功著シカラズ。



大葉センナ

此品亦嘉永年中ニ舶來ス。高丈許ノ灌木ニノ。葉大抵三四對ヲ以テ一鱗ヲナス。小鱗ノ形卯圓披針狀。奇種ニ比スレバ大ニノ尖銳略。望江南莢ノ如ノ更ニ大。每小鱗相對スル處ノ中筋上ニ。鈍針狀ノ細腺アリ。又中筋末端ノ背ニ往々細小ノ針狀腺アリ。奇種ニアツナ不見。夜ニ入テ葉不合ク、垂レテ將萎モノ、如ニ夏花アリ。形前条三同メ稍小。又唯莢ノ勾リサク。莢ラナスニ至テハ不同。直ノ指ノ如ク長三寸許。略望江南莢ニ似。橫文アリ。内ニ多子ヲ収ム。色茶褐ニノ光澤アリテ差決明子ノ如ニ。

按詳前条下



イチヤクサウ

鹿蹄草

山林樹陰ニ生ス。葉橢圓ニノ厚ク。面深綠色。助脉綠白毫甲故ノ如ク。背淡綠ニノ暗紫草柄長ノ亦紅紫色ノ帶ノ數束叢生シ。經冬不凋。夏月中心一二莖ヲ抽ク。高七八寸梢。疎穗ノ如クニ數花ヲツク。梗曲リ下ニ向テ開ク。萼五片半披針狀。花五瓣白色形。茶花ノ如クメ小。實球扁圓五級道アツテ五區。中心一柱ヲ出シ下邊ニ沿フテ長ク輪外ニ延ビ十雄蕊實破ノ圓ニ。蕊黃色一種葉邊波紋ヲナシテ花色淡紅ナリモノ曾ニ產ス又一種草差小ニノ葉剛ク好テ地ニ墜シ面淡綠背淺黃色。花葉同形ニノ亦微小ナルモノアリ。先輩コレノ繁背天葵トス。阿須氏云。性收鴻愈創革トナス。ベク又肺癆ニ称用ス」


## 第一種

ローランカホワ

コンクリード

カキラルケーン

蘭

*Pyrrola rotundifolia* Linn. *Endlicher*



原野樹陰ニ生ス。莖高四五寸。葉卵圓披針狀。大サ四五分許一寸許。細尖鋸齒アリ。色深緑ニノ中筋粗フノ帶白色殆白班ノ如シ。二葉間ニ三葉相對シ。經冬不凋木様リナシ。莖帶紫色。春末梢頭一二ノ新枝ヲ出シ一二對ノ葉并鱗狀淡綠ノ數擣葉ヲツク。每頭一花。萼長ノ五片淡綠色。花五瓣白色。點頭或ハ向側ナル。鹿蹄草ノ花ト同シ。子室圓ノ五瓣道アリ。頭扁圓ニメ雄蕊十莖。葯双管狀ニノ色黃褐白粉ヲ吐ケ。莖下白色軟毛アリ。實熟スレバ形タケモミノ實ノ如ク。後新枝ト共ニ枯レテ。次年花取ニ至ツテ猶存ス。附 子室兩蕊郭大圖。

第五種 マクユラク

*Persicaria maculata.* 罂

ウサンテルグムー

葛

*Polygonum persicarioides*

葛



ミヅキンバイ

スマノグリ

東國水澤池邊ニ生ズ。圓莖蟠地シ茎頭尺許葉互生シ形卵圓披針狀ニノ葉二似  
タリ。秋梢葉腋ニ寸許ノ花莖ヲ出シ黃花ヲ開ク。扁圓五瓣キンバイサウノ花ニ似  
テ小。蒂筒様即裸子室。ソノ下際ニ珠様ノ細珠アリ葉互葉披針狀一柱莖頭五起雄  
蕊十蕊藥淡黃粉々吐ク」附兩蕊耶大圖

可屬未考



## ユキノシタ

虎耳草

草状啓蒙詳之衆亦通知。故ニ略之。莢披針狀五葉。花亦披針狀ノ五瓣。ソノ二瓣尤長大ニノ白色。三瓣ハ短小ニノ本ニクリコミアリ。白色ニメ紅葯四ノ紅點ニノ黃點アリ。子室柯子狀二顆並位シ。頸柱ヲナシ。頭縛ニ開反。雄蕊十二ノ薬淡紅色。綻テ白粉ヲ吐ク。ソノ大瓣間ニアル一莖ハ微扁大ナルモノ多シ。子室ノ前面ニ黃色帶綠ノ蜜鱗アツチソノ本ヲ被ヒ。後面ハ然ラズメ子室直ニ可見。附全花郭大圖。

按ユキノシタ。大文字サウ。ノ類ミナ

*Jack-in-the-pulpit*  
サキシラガ

ノ属ニ不外レ也。未得的

當種名



ハルニキハシタ

葉狀虎耳草ニ似テ小ニメ綠色。莖微紫色ヲ帶ヒ。細鋸齒アツテ大缺刻ナク。花形亦全ク同フノ細瓣ノ點紅ナラズノ黃。藥亦黃色。根側苗ツ生シテ達ク線ヲ引カズ。花早ク三四月ニ盛ナリ。故ニワク名ヲ得。



大文字サウ

虎耳草ノ一種ニメ。葉質志ハルユキノシタニ似テ。六七ノ岬起邊緣鋸齒アリテ毛ナク。面淡緑背黃緑白色。根側芽ヲ出シテ線ヲ引カザルト。亦ハルユキノシタノ如シ。秋花アリ。一瓣長シテ恰モ大字ノ形アリ故ニ名トス。生殖部異ナシ。山間溝地ニ多ク生ス。又地ニヨリテ葉形鎖様ニテ頭蕊刺アルモノアリ。



毛大文字サウ

白山ニ産ス。形大文字サウニノ莖葉共ニ毛アリ。花瓣稍闊短。



卷之八

○十種二目

五本鼎鼎

紅花大文字サウ

形状總テ大文字サウノ如クノ稍小。莖葉紅色ヲ帶テ毛アリ。花色亦帶紅。ソノ色ニ  
淺深二種アリ。共ニ南紀ニ產ス。



卷之八

○十一月二日

平木家藏

人字サウ

葉大文字サウノ如而ノ缺刻尤深久殆トカエテ葉ノ形ヲナシ。色淡緑ニノ毛アリ。  
花形略大久字サウノ如クナレ氏。下ノ二瓣長シテ恰モ人字ノ形ノ如シ。故ニソノ  
名アリ。山澗ニ生シ。大文字サウト同取ニ花アリ」



クワクモアクの圖久  
セントアイソウの説明久

白山ニ多ク自生シ。葉扁圓ハルユキノシタノ葉ニ似テ邊緣圓尖ノ粗齒ヲナシ。西  
背共ニ現著ナル毛ナク。根際葉柄ノ本ニ腺様ノ細粒多ク。又舊茎ノ痕残ツテ鱗起  
スルト略ニヤマカタバミノ如キ態アリ。夏秋ノ際花莖ヲ抽ケテ七八寸。梢上分又  
穗狀ヲナシテ花アリ。萼鐘形五尖。花半披針狀五弁大サニ三分。色淡黃褐ニメ暗紅  
暈アリ。牴凹ミテ齧槽ノ形ヲナン。子室柯子狀ニ箇相並ヒ頸延テ柱アナシ結頭ア  
リ。雄蕊大小十莢。藥淡黃色。附全花部大圖。

按虎耳草(ユキノレタ)ノ類ニ於テ此種ソノ花形ヲ異ニシ。根狀亦不同シテ。兩書中所說ノ「サ  
キシフラガ」ノ形状ニ尤近似スレモ。莫大的當ノ種名ヲ考ヘバ。



クロクモサウ キクブキ

白山ニ多々自生シ。葉扁圓ハルユキノシタノ葉ニ似テ邊縁圓尖ノ粗齒ヲナシ。面

背共ニ現著ナル毛ナク。根際葉柄ノ本ニ腺様ノ細粒多ナ。又舊茎ノ痕残ツテ鱗起  
スレ「略」ニヤマカタバミノ如キ態アリ。夏秋ノ際花莖ヲ抽ク「七八寸」。梢上分又

穗狀ヲナシテ花アリ。萼鐘様五尖。花半披針狀五弁大サ二三分。色淡黃褐ニメ暗紅  
暉アリ。林凹ミテ壺槽ノ形ヲナン。子室柯子狀二箇相並ヒ頭延テ柱ヲナシ結頭ア  
リ。雄蕊大小十莖藥淡黃色。附全花莖大圖。

按虎耳草ノ類ニ於テ此種ソノ花形ヲ異ニシ。根狀亦不同シテ。兩書中所說、「サ  
キシフラカ」ノ形状ニ尤近似スレ氏。また的當ノ種名ヲ考ヘバ、



イハニキノシタ ヤマニキノシタ

イハニキノシタ

豆州農石上ニ多ク生入葉卵圓披針狀ニメ鋸齒アリ。質厚シ硬ク。面淡綠背尤淡綠冬不凋。葉邊ハ臂帶紅色。己ニタ面背共ニ暗紅ニ變ス。春簇葉間花莖ヲ抽ク。五六寸。二三小葉ヲ互生シ。多ク枝分シ房穗穗狀ヲナシテ細碎花ヲ結ル。花無莢ニメ披針狀五瓣白色。子室二箇並接シテ柯子狀フナシ。各頭為尖柱。雄蕊十莖或ハ六或ハ八。高ク瓣外ニ出。药淡黃白色。夏根際線ヲ出シ。地ニ引テ處々ニ根ヲ下シ葉ヲ生スル。虎耳草ノ如シ。按ニ此種葉形花狀ニキノシタニ不同レ。五瓣十蕊ニ柱。又根際線ヲ引テ分窠スルノ一等ニアツテハ大ニ趣ヲ同スレバ。ノノ所屬ト断ベキカ

カ 附 一全花 二子室共郭大圖

所屬未詳



妙葉ハセキノシタ也。葉ニ下承



新緑葉淡紅色。葉基部有毛。葉邊有鋸齒。

莖葉少數。葉卵圓披針狀。葉邊有臂帶紅色。

溪間陰地ニ生ス。毎柄一葉。形略大文字サウノ如クノ大ニノ粗鉛滿アリ。大低七尖  
ヲナシ。萼サク内ニ向テツク。然レ氏荷葉ノ中心ニツクガ如ナラズ。葉間臺ヲ抽ク  
「一二八。三葉ヲ互生シ。梢ニ二三枝ヲ出シ。每枝數亞ニ分レ。五月ニ花ヲ放ク。各並  
短梗一花。萼鐘狀五尖。花五瓣披針狀ニノ先三齒ヲナシ正開セズ。色淡黃子室柯子  
状ニノ半裂。殆トニ顯ノ如ク。各一柱ニノ結頭アリ。熟ノ細子ノ收ム。雄蕊十二ノ短  
蕊。色淡黑白粉ヲ吐ク。莖葉共ニ微纖毛アレ氏。淡綠微紫葢ヲ帶ヒ。滑澤ニメ光アリ  
シ。

按或ハサキシフラガノ属ニ可取カ



## 卷之八

## 十編二日

聖參

平木井草

ナデシコ

カハラナデシコ

聖參



然圖

第十三種

デントニス

*Dianthus plumarius*

羅

*Gypsophila*

羅

*Gypsophila*

蘭

原野自生。河側沙地尤多。故ニ本条ヲカハラナデシコト称シテ家植ノ品ニ合ツ。萼鱗短ク圓尖ニ及不及。花瓣薄而裁深ノ翅毛ノ如ク。又系ノ如ク。色淡紅紫ヲ常トス。フノ濃淡些異アレ。純白濃紅等ノ品ニアツテハ余未見。ナデシコ石竹ハ本同屬別種ニ。共ニ莖高一二尺。節頗レ高ク。葉狹細對生色淡綠ニメ帶白。邊緣觸之ハ微糙滑。稍上方又各頭一花ヲ放ク。萼筒樣五尖。萼下鱗形ノ小葉二對ヲ具シ。花五瓣。子室圓長ニノ尖。ツテ二柱。雄蕊十二ノ短藥。柱ト共ニ瓣外ニ出ヲ以テ概標トス。殊標ニ在テハ。ナデシコハ萼鱗短ク圓尖ニメ不及。花瓣薄ク剪裁深ノ如毛。石竹ハ萼鱗長メ尖銳外反。花瓣厚ク剪裁粗ノメ不深。或ハ鋸口ヲナス。附兩蓋子室本



イセナデシコ サワマナデシコ

洛陽花



前条ノ一種ニメ近道野生ナク人家多ク種藝シ。傳ヘ云始メ薩州ヨリ來ルト。延時  
南朝ヨリ多クフノ奇花ヲ出スフ以テイセナデシコノ稱アリ。形状前条種ト同ア  
ノ花稍大ニ草葉重葉。色ニ紅白紫ノ濃淡間駁等アリ。又剪裁ノ形亦不一メワノ觀  
尤美ナリ。萼形晝状ハ全ク前条種ニ同シ此種ニ花形ノ異ナル又重瓣ノモノ等多  
々アレビ今一々セズ

按西書中未見此種名

卷之二

カラナデシコ

石竹通名

此種野生ナク。人家多傳播シテソノ花ヲ賞ス。啓蒙カラナデシコノ名ヲ舉レハ。思  
フニ漢種ナラン。ナデシコノ一種ニメ。花瓣鋸ロニシ前裁糸ノ如ナルヲ必トセズ。  
外萼稍長ノ尖鋭外反ス。ソノ花色ノ種々アルヲハ。ナデシコト一般異ナシ」

第十一種

デアントコス

シナンシス

レチーノ

アーテリーナ

蘭

Dianthus

chinensis

羅

chinensis

aygulus

按林氏所說形狀簡ナレ氏不遺。且漢種ト云者亦符合。故ニ斷之。



オランダセキチク

アンジヤベル

和蘭種ニノ莖粗ヲノ高サニ尺許。葉羣ノ色尤白綠。外葉闊短圓尖ニノ不及。花瓣厚  
ノ剪裁不深。世人普ク所裁ヲ換スルニ。此種ハ多ハ重弁ニメ。色白質ニノ紅ノカ入  
リアルモ。間草弁紅色ノモリアル。多種アルヲ不見。ソノ草弁ナルモノモ。似類  
他種ノ五弁ナシガ如クナラズ。或ハ六七或ハ八九弁ニメ一定ナラズ。又ソノ草弁  
ノ中心多ハニ三ノ細弁ヲ交ニレバ。真ノ草弁ニアラズ。亦重弁中ノ弁差サキモノ  
ニカヘル。子室ハ他種ノ如ク圓長ニメ尖リ。内ニ多卵ヲ藏シ。二柱或三柱ヲ出シ。雄  
蕊ハソノ數定マラズ。重弁ノモノハ多クハコレヲ不具。草弁ニアツテモノ。或ハ無ク  
或ハ有。或ハ七八或十二三莖ニ及モアレル。或ハ薺ヲツケ或ハ薺ナク。長短亦一奇  
ナラズシテ。似類他種ノニ柱十薺ノ花心ニ並フノ概徵アルト不同。故ニ偶ニ兩薺  
ツ具スルモノモ。十全ノ熟實ニ及ブ。希也是以此種ニ在テハ分根種哉シテ實生  
スルアルヲ不見。花形ノ変化ヲ不得。亦コヘニ由ル。林氏トインアニーリールノ下  
ニ。花ノ形色多々アルヲサ云ヘバ。本條ト不同ガ如クナレビ。蓋シ本邦ニ舶來スル  
品。モトソノ重弁種ノミニアリシユエ。今ニ至テ変化ノ多種ヲ不得モノナラン。依  
テ余ソノ名ヲ下シテ不疑。林氏云ソノ香氣ニ因テ壯心ノ功アリ。蒸餾シテ緩キ獲


- 汗制ヲ製シ又コンゼルヲ舍利別等ナシ用テ同功ヲ得。阿波氏亦功用種ミタ載ス。
- |                    |                                |            |                     |
|--------------------|--------------------------------|------------|---------------------|
| 萬七種                | カリヲヒルニス                        | トイン        | アーリー                |
| <i>Dianthus</i>    | <i>caryophyllus</i>            | <i>tin</i> | <i>angustifolia</i> |
| ゲノベシ               | ゲローレン                          | ブルーノン      | ゲルーノン               |
| <i>genopphulus</i> | <i>or genopphulus - blumen</i> |            |                     |
|                    |                                | 輝式         |                     |



ハマナデシコ

性々海邊ニ自生ス。莖剛強高ニ尺ニ超ヘ。葉潤短ニノ綠色。革質尖銳ニノ微反。花小ニノ石竹ノ如ク。鋸口尤粗ニノ不深。花色紅紫。又邊緣白色ナルアリ。一種剪裁稍深クメ色深紅ナルモノアリ」

按萼状花形石竹一種ニノ即第十一種ニ係ル





海邊ニ自生ス。高一尺餘。葉對生形畧ハマボツスニ似テ大ニ。本潤ノ末尖リ厚メ光アリ。夏梢頭三岐。各岐又三分。每頭短梗三花ヲ著ク。ソノ状略ナナシコ類ノ如ク。萼下狹細ノ花葉アリ。葦筒様五穴。花五瓣大サ五六分。瓣頭濶ノ鋸齒狀ヲナシ。脚細長子室軸圓鈍方ニゾニ柱。雄蕊十二ノ短蕊淡藤花色。花瓣藤花色。或ハ白色。或ハ紅色。實熟シテホナデシコノ如ク多ノ扁子ヲ收ム。主能藥鏡詳之。

## 第一種

サボナリア  
*Saponaria officinalis*

ラブミナス  
*Saponaria officinalis*

ゲニースカラクチア  
*Gennakragtig Hypoleuca*

セーブロイド  
*Serpylloides hypoleuca*

蘭

按鉢氏ノ圖亦的當ナレモ。阿須氏ノ圖ハ花稍大ニメ萼ニ毛茸アルガ如キニ慊アリ。鉢氏林氏モ其事ヲ云ズ。他ノ形狀尤當ナレバ。假令的當ナラザルモノ一  
種ナルト不容疑。春瓦ハ本条  
*Dianthus saponaceus*  
ヤボニクニス  
デアントニス  
ノ名ヲ下

ス。亦可備考



啓蒙形状ヲ詳ニス。子室圓長ニメニ柱。雄蕊十莖ニノ。藥水紅色。ツノ形瞿麥類ノ常套ニ不外。故ニ署其圖。萼筒樣五尖。五棱高々起テ箭羽ノ如ク。花淡紅五瓣。形瞿麥ノ如クノ小。緣邊鋸口アリ。實熟メ橢圓。内ニ褐色丸圓ノ細子二十許ヲ収ム。

## 第二種

サボナラア

*Hyperanisus lucania*

羅

フナツカラア

*Medicago hyperborea*

カエイドランギ

*Medicago hyperborea*

蘭



ヤグルマ

鬼燈檠

百品考所説形狀可見。老莖ハニ大葉ヲ互生シ。大ナルハ高三尺ニ超ニ。莖頭小枝ヲ  
分ナ細花ヲ攢簇シ。球ヲナシテ一大穗ヲナス。花萼アツテ萼ナク。卵圓披針狀ノ五  
瓣白色微青ヲ帶ブ。子室林中ニアツテニ柱。雄蕊十莖萬決黃粉ヲ吐ク。附全花

郭大圖

所屬未考



雀巢巻飛州ニ得。余ハ遠州ニテ採ル。共ニ山蘿原野ニアリ。春子生シ高ニ尺余。葉辨圓テノ尖リ粗鰐齒アリ。茎葉共ニ纖毛アリ。皮剛強芋トナスニ足ル。葉腋枝ヲ出シ各頭又分シ。夏秋ノ際花ヲ簇生ス。一亞三花短梗ニノ梗本ニ針状葉アリ。葉邊毛アリ。革被針状五序。花亦同形五瓣黃色。萼淡黃ニメ紅褐色ヲ帶ビ。雄蕊十莢藥黃色。子室圓夫一柱頭僅ニ哆久。後二三分ノ毛刺球ヲナス。刺長ノホ夫鈎リ觸之バ粘著ア不脱。熟ノ茶褐色。内ニ扁三棱ニノ夫アルハ小子ヲ收ム。全草一種ノ異異アリ。ノノ異畧野羊ノ臭氣ニ似タリ。

所屬未詳

按其花形ノ相似タルト皮ヲ以テ芋トナスニ足ルニ在ツテハ頗ル黃麻ニ類似スレ也。ソノ細異ナレバ同屬ニ收メガタシ。附一蓄 二字室并柱 三全花

共部大圖




大ヤマアスマ

卷之三

山中ニ生シ。草狀。ノミノフスマト同メ稍大ニ。種子葉ノ長七八分ニ至ルソノ花タ  
ル。葉五葉瓣亦五片。圓長ニノ尖微ノ缺刻アルアビズ。ノミノフスマノニ裂葉十瓣ノ  
看アルガ如クナラズ。子室長柯子狀ニノ三柱。雄蕊十莖内外二列ニ位シ。蔚黃粉ヲ  
吐ク。莖剛ク内ニ有強縲。ツノ瓣並兩蕊ノ數等。ノミノフスマト異ナレバ。亦ツノ一  
種大葉ナルモノニ不外。

按此種林氏ノ *Connexia* 種 *Paraceraspis* 蘭ノ懶括所說ノ五辨本分裂シテ十雄蓋ト云ニ吻合スルバ。ソノ種タルヲ不容疑。然此ノ種中ニ專ラ此品ニ的當スルモノヲ不見。



葉大山アスドヨリ小ニメ莖中雄アリ。萼被針狀五葉。花白色小メ萼ノ大ニ齊ク。  
半裂五瓣殆ト十瓣ノ看アリ。子室長柯子状ニノ三柱或ニ柱。雄蕊六七或ハ五茎ニ  
ノ黄蕊。花後實ヲ結フ。形繁縝ノ實ノ如シ」附全花郭大圖

## 第九種

*アレナリア*

セントナリニア

*clavata*

アルデルケインステ

ムール

Perfoliata

サンダムール

*acutifolia*

ムール

Thymbleagy undulata

蘭

*acutifolia*

ムール

蝶式

林氏ノ「アレナリア」ノ總括ニ所詳アモレバ。花瓣不分裂雄蕊十莖ノ品ト又  
レバ。本条ニ吻合セザ」也。已ニ蝶式ノ「アルデルケインステ ムール」ヲ併ス  
ルニヨンバ。直ニツノ品トスルニ害ナキガ如シ。故ニ茲數ニ不況之ヲ出于此

## 附全花郭大圖



ツメクサ

庭砌ノ間普ク生ル處ノ雜草ニ。年中種殖シテ不施モノナリ。高二三寸。壠地シテ  
叢生ス。葉尖長披針状ニメ。兩對シ。葉腋梢頭共ニ梗ヲ出シテ花アリ。卵圓五瓣白色。  
實球形子狀ニメ。五柱。雄蕊五莖。白蕊。萼鈍披針状ノ五葉ニメ。花辦ヨリ長シ一莖ハ  
マタカノツノハ葉大ニノ厚ノ光澤アリ。蓬嶺ニ產ス。附全花郭大圖。

按本条ハ五綱五目ニ可收品ナレトモ。下ニ舉ル處ノニ種ハ三柱十雄蕊ヲ具シ。  
且此諸種ミナ茎中ニ縷アル。繁縷雀舌草等ト同ケレバ。共ニムユールノ属ニ不  
外ガ如シ。故ニ併セテコヘニ收ム。宜ノ上条ト照シ考フベシ。



細葉ツノクサ

東北國高山上ニ生ス。莖細フタ帶紫色。葉常種ヨリ細長ニノ枝葉繁密發生ス。花大  
サ三分許五瓣白色。子室柯子状ニメ三柱頭曲リ。雄蕊十茎蕊黃色。此種花辦ハ常種  
ニ同ノ微大。兩蕊ノ形數ハ下条ノ大葉種ト全ク同ニ。

按兩蕊ノ數上条不同レ氏リノ一種ニ不外。



多子細葉ツノクサ

細葉種ノ花不似ツノクサ也。葉之大者

又、細葉諸人參照

卷之八

大葉ツメクサ

十種三日

白山ニ生ス。草ツメクサト同ノ稍大。葉幅一分許。木根莖長一寸許。花萼ノ形亦同。シケレトモ微大ニメ十瓣。實硬柯子狀ニノ三柱長ク主十。雄蕊十莖ニノ薦黃色柱上ニ出。實熟ノ扁細子ヲ收ム。附子室兩蕊莖大圖。

按花辨ノ數不同。レモツメクサノ一種ニ不外。蓋繁縝ノ類辨數不同ノ種アルト  
趣ヲ同フス。宜備考。



夏草ニゾ歟。子生シ。初メ地ニ堀シ。葉對生軟毛茸リツテ根耳ノ如ク。春ニ生サ直生

尺餘。節微鷹起スル。剪秋羅類ノ如ク。漸ク數枝ニ分レ。梢葉腋毎ニ左右互ニ短梗一  
花ノ出シ。各側ニ向ヒ七八花リ以テ殊穂ノ形ソナス。葉鐘様五裂。蕊粧或ハ剪  
秋羅ノ葉ノ如クノ。質膜様ニメ縫ニ線條アル。野西瓜苗ノ色ノ如ク。花七状ノ五  
瓣。頂ニ一凹アリ。白質紅心喉ニ白色ノ十瓣鱗アツテ花心ニ立ツ。ソノ状剪秋羅ノ  
蜜鱗ノ花瓣ニ沿カ如クナラズ。子室圓長ニメ三柱白色ニメ毛アリテ筒中ニ居ス。  
雄蕊十二ノ药暗褐色花喉ノ中ニ出ツ。實熟ノ卵圓暗褐色。内ニ多細子アリ色亦暗  
褐ニメ栗紋アリ。傳云此草近年ノ舶來ナリト。マシテマノ名ハ余未詳出处

三

第  
五  
章

卷之三

按林氏、シレ子ノ種類ヲ挙ル。三十三種。ソノ初ノ六種ナルモノ。ミナ木条ノ  
類ナヒ如ク。就中第五種尤的當ス。但花色ヲ暗スレバ。フノ名義ニヨレバ紅色ト  
ルヲ疑ナシ。依テ断之。又云林氏シレ子ノ概様ニ子室三凸ト云。今マンテマノ  
類ヲ撮ル。子室一腔ニメ細子ヲ數列ニ填テ三凸ト云キニアラス。宜ノマツモトイタク併セ考ベシ。



山野ニ自生ス。秋實生。綠冬不枯。草形フレグロニ似テ高三四尺。葉雙フシグロノ如クノ差ヤ狹ク。殆ド無毛。葉腋枝ヲ分ナ。フシグロト同時ニ葉腋梢頭共ニ花ヲ出ス。梗一寸餘。葉鐘様胸脰ニメ五尖。縱脉分明。花長八五分。頭ニ裂ニノ開展略。フシグロノ花ノ如メ大僅二三分ニメ白色。每弁喉間ニ蜜蠍アツテ堅起。子室圓尖ニノ三柱。雄蕊長短十茎ニメ黃蕊。花後子室漸ク長シ萼上ニ出。圓長ニノ尖リ。内ニ多細子ヲ収ム。色茶褐ニメ粟紋アリ。附全花二倍圖。

按本条草形フシグロニ似レドモ。萼並蜜蠍ノ形不同。且柱數三ニシテシテ属タル「胞然」タツナクリ。林氏書中的當ノ種ヲ不考レトモ。之ヲコニ出ス。



ランヂ

細茎高不及人。葉生嫩嫩。葉對生形官柳葉ニ似テ小。莖葉共ニ葉色。帶夏莖稍  
三五莖ニ分レ。每頭一花。ノ花夏ニ初アリ。晚秋ニ至テ尚アリ。莖葉ニ比スレバ花更  
大ナリ。萼筒様五尖。花半裂五瓣。瓣長ク筒中入ル。瓣麥類ノ如ク。色淡紅紫。喉  
各瓣樣白色ノ細瓣四アリ。中者長ク側者短。前秋葉ノ先可併見。子室圓長三柱アリ。瓣  
蓋十條。ソノ五者子林ニ出テ長ク。五者瓣爪ニツイテ短共ニ褐色ノ丁字約アリテ  
灰白粉ヲ吐ク。附子室兩蓋邦大圖。

第二十二種

シレ子 ボルテンシス ボルトセ フリードカルス

*Jilene porteri* *Jilene porteri* *Jilene porteri*

按一本条ノ形狀。剪秋羅ノ類ニ可屬如ナレド。三目五目ノ異アリテ。シレ子ノ屬

タルト可見。故ニ断之。



春舊根苗ヲ生ス。一科數圓莖。葉形匙頭ノ如クニノ肥厚色淡綠ニメ帶白。互生或ハ對生。多クハ周邊細鋸齒アリ。秋ニ至テ高二三尺。梢間枝叉ヲ分ナ花ヲ開キ攢簇房ヲナス。萼五裂花半披針狀五瓣大ナ三分許白色或ハ淡紅。長柯子狀ノ五子室中心ニ立ナキ雄蕊閨之似類ノ品花形如此ヲ常ナス。茲ニ以郭大圖示之。一種草稍小ニノ莖並ニ葉背ニ紫色ヲ帶グモノアリ。

## 第二種

セドーム

セレニウム

*Desmodium*

羅

ヘンルスレウアル

ホイスローツ

*Humulus**Kobort.*

蘭

按景天仙甲草ノ種類。フノ形状一樣ナラサレ瓦。皆同屬ニノ性味不相遠モノ、如ニ。故ニ茱鏡佛甲草下ニ所載ノ功用。共ニ相通スベシ



卷之八

二本草

ス

三葉ベンケイサウ

伊吹山ニ生ス。圓莖一二尺直立暗紫色ヲ帶グ。葉ノ形質前条ト略同ノ稍尖銳ニシテ鋸齒亦銳リ。一處ニ三葉或ハ四葉モ對生ノ層ヲナスノ異アリ。花形ハ似類一般ナレモ。他種ノ如ク辨開展セズ。色淡黄緑白ニメ薺黃色。

第一種  
セドエヌ  
ユリチシルラトヌム  
*Julien luteo-illuminatum.* 茎  
Gutmann Kuehn.

ガオウニスト  
ホイスカーラ

蘭



加賀産ベンケイサウ

ミセバヤノ一種ニノ莖尺餘。葉圓長卵形ニシカ、ヘ。密附シ。脚ニアツテハ三々相對シ。梢ニ至ツテハ互生ス。稍葉腋枝ヲ出シ多ク分叉シ。每項花アリ。ミセバヤノ如ク淡紅色故ニ或ハミセバヤノ一種トス。一種相似テ葉密附セズ内ニカ、ヘテ色

白粉ヲ帶ズアリ花戸之ラセイカウラント称ス

按此種林氏第七種載ル

*Lam. cyprip.*

*sp. polygalinacea*

*hirs.*

ローラ  
蘭  
ノ概標ニ的當スレド也。其文簡ナレバ。他書ノ參較ヲ俟テ當否ヲ決セ

ントス



ハマベンケイサウ

卷之八

五木辨別

莖常種ヨリハ柔軟ニノ直立セザレドモ。タマノオノ垂ル、ガ如クナラバ。葉散布シ形短ノロカ賀產ノ葉ニ似テ未圓ナラズノ微鋸齒アリ。莖葉背等ニ暗紫色ヲ帶ヒ梢葉腋枝ヲ出シ花ヲ結ル形亦タマノオノ態アリ。瓣開展シ子室ト共ニ淡黃緑白薬

黃色

種名未考



ミセバヤ

タチミセバヤ

莖初ノ地ニ沿ヒ漸ク檣起シ高一尺許葉倒卵形ニメ微尖リ。タマノオニ似テ稍ヤ厚メカヘテ鋸齒ナク重疊密附スル「イハレンゲ」ノ如ク。梢上末聚房ヲナシテ花アリ。形色タマノオノ如シ」

第三種

アナカヘアセロス

アーチナ

ワールア

ウンドコロイド

アーチナ

按春氏此名ヲ「辛テ」<sup>レ</sup>「シゲサウ」ト譯スレ氏所指不詳。今林氏ノ所說ヲ聞スルニ本条ニ酌當シ。鐸氏ノ圖說亦尤明白ナレバ。斯然不疑。



タマノオ

エセバヤ

卷之八

五十九

ミセバヤノ一種ニノ莖茎挽直立セズ。盆種スレバ長ク盆外ニ垂ル。葉三々相對シ  
疊ヲナシ。形扁圓ニメ或ハ微鋸齒アリ。又邊緣紅暈ノ有無アリ。秋稍頃花ヲ放ク攢  
薪織拂ヲナス。瓣蓋ノ形似類一般ニノ粉紅。子室蔚等色深フヲ頗ル美ナリ。ソノ葉  
綠紅暈ナキハ花色大ニ淺シ。一種全形稍小ニメ。葉ニ鋸齒アリテ背紫暈多キモノ  
アリ

第五種

セドーム

羅

バステード

ホイスマーク

蘭

*Salvia officinalis*

*Bastard*

*Hosmer*

*Lan*



キリンサウ

曹葉

西濃山中生々自生ス。莖高一尺許。葉散布。形景天ヨリ狹小ニメ尖。披針狀ニシテ鋸齒アリテ帶黃色。莖頭簇葉心多花聚り著ク。形景天類ノ常素ニメ黃色。一種御嶽寺ノ高山ノ頂ニ生スルモノハ。莖葉共ニ柔軟ニメ數莖簇生ヌルアリ。オヤマキリ

ンサウト云

第四種

セドニム

アイソーン

シバリス

ホイスローラ

蘭

*Polianthes nikkon.* 花瑞  
*Litsea kirkii* 崑



葉上条ノ葉ヨリ稍長ク厚メ捨シ。鋸齒尖統。花蕊ノ形色ニアツテハ一般異ナシ。

上条一種



ヤハラシケイサウ

景天一種

莖高五七寸。葉橢圓二ノ微鋸齒アリテ景天ニ似テ小。梢頂分枝多花ヲ放ク。花亦小。淡黃白色ニメ綠暈アリ。雄蕊長ク立テ黃蕊。又一種同形ニメ大ニ莖高廿一尺ニ條。

アリ 附 全花部 大圖



The illustration depicts a botanical specimen, possibly Salvia (Sage). It features a central, upright stem with several pairs of opposite, ovate leaves. At the apex of the stem is a whorl-shaped inflorescence bearing numerous small, tubular flowers. To the right of the main stem, there is a separate, magnified view of a single flower cluster, highlighting its structure and the individual florets.

イハレンゲ

石蓮華

山中石上ニ自生シ人家亦多ク栽ニ。葉質景天ノ如ク肥厚ニ。淡緑帶白色。或ハ葉心又ハ葉邊白斑アルモノアリ。莖ニ長ニ寸許未潤メ鈍頭。疊々相重テ恰モ千葉蓮花ノ如シ。夏秋中心臺ヲ抽下一人許。梢ニ至テ葉漸ク小ニメ鱗片ヲナシ。時ニ又枝ヲ出シ共ニ穗様ニノ。毎葉腋一花ヲ放キ後莢ヲ生ズ。形略ツノレンゲト同ニ。故ニ別ニ花圖ヲ不載。一種葉ニ白色ヲ不帶モノアリ青ノイハレンゲト云。此類ミナ實熟ノ根枯ル。

按ニ春氏ハ林氏ノ第三種

*Lilium candidum* Linn.

ノ名ヲ奉テ。レンゲサウノ

名ヲ下シテ本条ヲサスモノ、如クナレバ。林氏ノ所說形状不的當可疑

アメーチ

ゴローテ

ホイスローツ

物印滿

*Genus*

*Lilium*

*Lilium*

物印滿



卷之八

十種五目

五才書

ツナレンゲ

昨葉荷草

イハレンゲノ一種ニメ葉をモ厚ク狭メ尖リ。背面隆面平扁。梢上花ヲ放ク。イハレンゲト同ク。萼鐘狀五裂披針狀萼下ニ二小葉アツテ護之。花亦披針狀五瓣白色。子室兩蓋ノ形數似類一般。蕊淡紅色ニメ黃粉ヲ吐レ。附全花郭大圖。

按ニ上条ノ一種タルハ勿論ナレ。氏未タ種名ヲ詳ニセズ。



卷之八

一  
三

五  
木

ツメレンゲノ一種ニメ草高五七寸。葉狹長肥厚ニメ尖銳。根際ニ多クノ苗ヲ分生スルノ殊性アリ。故ニ花戸ヤツガシラト稱ス。葉并花共ニ稍小ニメ色淡黄緑。雄蕊

多クハ五莖トス

・上条一裡



小葉イハンシゲ

葉ニシテ子シグサヨリ潤短ニノ茎ノ對生或互生。莖高三四寸。半ヨリ上ハ。每葉腋一  
花ヲ放。花萼鐘状五出。花被針状五瓣白色莖葉ニ比スレバ花頗ル大ナリ。兩蓋ノ形  
似類ノ常套ノ如シ。此種南勢ニ產ス其莖長歲ナルニアツテハ殆トマン子シグサ  
ノ態アリテ或ハ白花ノ佛甲草トスレ也。ソノ稚苗イハレンゲノ形ヲ存ス

卷之九

A vertical decorative illustration of a flowering plant, possibly a magnolia, featuring large, dark green leaves and clusters of white, star-shaped flowers.



卷之八

二十一

五木

マン子ングサ

佛甲草

大小二種アリ。山野所在コレアリ。草多液肥厚ニシヨク生活シ。莖地ニ堀ニテ處々  
ニ根ヲ下ス。ソノ大者ハタカノツノ又雄ムン子ングサト云。擡頭六七寸葉三箇ツ、相對シ  
形扁圓ニメ細ノ尖リ長す許。小者ハユマノツノ又雌ノヘン子ングサト云。擡頭二三寸葉密々  
五生シ。小ニレテ不失冬春ノ際ハ紅紫色ニ染ム。花ハ景天類一一般ニノ瓣蕊共ニ黃色又コマ  
ノツノノ一種葉尖圓キモノアリ。ツマキリニシ子ンサウト云。附全花部大圖。

按鐸氏

ケレイ子

ドンドルベリード

ニニ種ヲ奉ク。ソノ第一種ハ葉長ノ尖リ

花色黃第二種ハ葉稍短ク末鈍ニメ花白色。

此種ハ即チ林氏セドムフルブロム羅

ケリット　カイスローカ

Kit  
heislook

蘭ト同物ニメ共ニマン子ングサニ外ナラス。但ソノ白花

ト云ノニシ子ニゲサニ背クヲ以テ或ハ之ヲツメレンゲノ小者トスレバ園ヲ闇ルニツノレ  
ニゲニ非ス。擦室山本氏云四國ニハマン子ングサノ葉尖鈍ニメ白花ナルヲ產スト。即キ  
鐸氏ノ第二種ナルモノニ的當ス。



圖鑑マン子ングサ

卷之二

平本草書

前条ノ一種ニノ葉椭圓。對生或ハ互生擡頭二三寸枝ヲ分ナテ花ヲ放ケ。前条ト同ジフメ花莖稍細ノ長ク。花莖ノ形色前条ト同シ。此一種ニ葉形鈍方ナルアリ之ヲミヅウヒシ一云。

按前条ノ一種ニノ西书中此種名ヲ不見



本草圖 西道種六圖



卷之八

十編五

平木草譜

ケレイ子ドンドルバーレー

根葉石連革ノ如ク。莖薄ク。又粉條兒葉ニ似テ小ニノ厚而光澤アリ。莖ヲ抽、一尺許葉ヲ散布ス。形略ツメレンゲノ如ク。梢ニ至テ漸尖銳。梢上ニ短梗花ヲ散布シ穗状ヲナス。梗二三分。五片ノ鱗状葉ヲ以テ萼葉ヲナシ。披針狀ノ五弁相集ウテ鐘状花ヲナス。色淡紅大サ三四分。子室五箇併接柯子狀ヲナシ。色黃。雄蕊十莢約黃色。此種嘉永年間、舶來ニノ普ケレイ子ドンドルバーレードノ名ヲ傳フ。按ニ鐸氏所称ノドンドルバーレードノ名ハ。景天佛甲草等ノ屬稱ニメ。就中ケレイ子ドンドルバーレードノ一種ヲ舉ク。ソノ圖說ヲ據ルニ。全ク佛甲草ニノ本条ノ形狀ニ的當ナルザレバ。本条ノ草狀亦景天類ニ外ナラズ。花形ニ於テ正開セザルノ異アレバ。専數兩蕊ノ妙ニ在テ全ク一般ナレバ。鐸氏所称ノドンドルバーレードノ屬タルト然タレバ。所傳ノケレイ子ドンドルバーレードノ名モ文ア妄称ト断ズベカラズ。但之ヲ鐸氏所載ノ其品也トスベカラズ。又云林氏ハ此属ニドンドルバーレードノ名ヲ用ヒス。Hans Loeber、ノ名ヲ下シテ多種ヲ舉レバ本条ニ的當ノ品ナシ。附花色

本然圖 西藏邦大圖



三脚草科

庭砌間ノ雜草ニ。形狀衆ヨク通知ス。葉五葉花輪様五裂黃色。野州ニ粉紅子室長角五稜ニメ五柱。雄蕊十二ノ黃蕊。五者ハ長ノ柱ト有ク。五者短ノソノ半ニ至ル。實熟ノ分折細子ヲ飛ス。一種莖葉帶紫色ナルアリ。赤孫施ト云。花色同シケレバ花底ニ微ノ紅晕アリ。附兩蕊郭大圖。

## 第十三種

サキウリス

コレニラニヲタ

otatis

Connivula

. 雜

guthorme

klasla - kuaning

蘭

主用藥鏡載之



山中樹木ニ生シ。根莖地下部有毛。葉三出複葉。小葉三枚。花淡紅色。莢果圓柱形。子多數。花期夏秋。

ミヤマカタバミ

酢漿草一種

山中樹陰ニ生シ。每窠數葉。々形常種ノ酢漿草ト同フノ大ニ。色淡緑。根際ニ舊葉ノ柄殘ル。一二三分。重疊鱗狀アナス。春三月葉心數梗ヲ出シ。每頭一花。傾垂五瓣鈍被針狀。白色ニメ微紅暈。淡紅線條アツテ頗ル美ナリ。子室麦粒状五箇相接シ。各一柱。柱頭僅ニ開キ。十雄蕊擁之。柱ヨリ短ク。藥淡黃白色。本曾ニハ一種。小葉ニノ高純ニ一寸許ニメ葉背紫色ヲ帶ルモノアリ」

## 第二種

ツキワリス  
*otatus*アセトセルラ  
*rectigulla*

羅

ゲウラー子  
*Lunaria*カラム  
*klamtmunning*

蘭



蝶  
皆ニ唯大樹下に生れ。花茎  
ハ大ナリナリ。葉ハ五  
枚十枚。春子  
合子莢生葉外。莢斜長  
殊極少。花子葉  
開未まじゆ。子葉五  
枚。子葉子葉

ヲキサリスローサ

酢漿草一種

十餘年前舶未ニメ。漫ニヲキサリスローサノ名ヲ稱ス。西書中ニ於テ余未見此品トモ。味酸ニノヲキサリスニ不外レバ。ソノ名真ニ不背ト云ベシ。宿根數葉ヲ簇生シ。柄長七八寸。頂ニ三葉一蒂ニ聚ル。形橢圓ニメ頂微缺凹面深綠背淡メ帶白色。葉間花莖ヲ抽ク。尺許上二十數花ヲ繖狀ニ出ス。繖萼針狀。梗二寸許細フソ姍姍。萼披針狀五葉。花五瓣爪長ク頭扁圓。瓣緣相重り蓋狀ニ開展シ。大サ一寸許色紅紫可愛。子室麦粒狀五箇併接シ。頸延テ五柱ヲナシ。結頭黃綠色雄蕊ノ間ニ出ツ。雄蕊長短十莖。五者長ク五者短。共ニ黃蕊。根ニ珠アリ味亦酸。近時又小葉ナル一種アリ。葉ノ大サミヤマカクハミノ如クメ光澤サク。花形亦小ニメ淡紅色。根亦珠アリテ味

酸附二郭大圖示兩蕊形色位置





卷之六

本草綱目

平本草書

センジニカンヒ

信州ニ自生アリ。草オグラセンノウヨリ稍小ニ。高一尺餘。葉亦相似テ披針状ニ。ノ本狭アノオグラセンノウノ如ク瀬カラズ。色淡緑ニメ毛茸ナク。五月マツモト上同時ニ花アリ。形オグラセンノオヨリ稍小。白色ニメ。蕊淡黃灰白。萼子室喉鱗兩

蓋ノ形數等一般ニナシ。




全形マツモトニ似レドモ。莖稍高ク三尺許ニ及ビ。葉本末共ニ殺銳。質厚クノ微糙  
滑アレ。毛草ナクメ先リアリ。五月盛ニ花アリ。瓣頂剪截齒様ヲナシテ大缺刻ナ  
ク。花色赤黄ナル。常トシ。又紅白駁班等種々アリ。候嬌兩蕊ノサマツモトニ同ニ  
按春氏 リクニス コロナタ ノ名ヲ掲テ「ゼンシユンラ」又「カニヒ」ノ名ヲ

下セドモ。檢閱較考スベキニ由ナク。姑俟後日考



クルマガンヒ

花葉ノ形質惣テ前条ト同シクシテ一節ニ三四葉ヲ輻次シ。莖頭十數花ヲ攒簇ス。  
故ニ車ガシビノ名アリ。林氏アグロステムマノ第三種ニ莖頭攒簇花ノ一種ヲ舉  
ルヲ見レバ。此類ニ如此異種アル。亦リノ一珠性ニカ、ルモリ、如シ」



フシグロ

畠ノフ  
シハ

剪夏羅一種



ガシニノ一種ニメ往々山中ニ自生ス。形ガシニ似テ稍大。葉腋枝ヲ抽ケリ亦長ク。節帶紫黑色。葉背亦紅紫色ヲ帶ブ。花形ガシヒノ如ナレドモ。瓣緣鋸口至微ニメ殆ンドナキガ如ク。黃赤色。又白色濃淡紫色等ノ種アリ。喉鱗兩蕊ノ形似類ト一般。

セシノウ 荀秋羅  
肥タリモノハ高五六尺ニ至ル。葉形ガニヒノ如クナレ。毛茸多クメ糙洁シ。七月

花ヲ開ク。瓣頭剪裂深ク缺刻アツテ色深紅ニメ美ナリ。一種花白色ナルアリ。花候

曉レテ八九月ニ全ル

説載ヤツモト之下



卷之二

三木本草

葉

オグラゼンノウ

葉モトゼンノ如クメハ本潤ノ末漸狭ク殆ト無柄ニテ微ク及シ。莖亦細ノ高  
ニ尺許共ニ微纏淡アリ。五月花アリ形ゼンノウノ如クメト色亦同シ又白花ナル  
アリ。生殖部似類一般。此種葉狀ニ見レバマツモトゼニ近ク花形ハゼンノウノ


如シ



正ンビセン

茎葉、形オグテセシノウノ如ニメ。軟嫩毛ナキニアラサレ既始ト滑沢糙淡ナラ  
ズ秋センノウト同時ニ花アリ。形センノウノ如クナレハ。瘠ト且弱裁尤深ク。大抵  
四裂ニノ頭心燕尾ノ態アリ。色尤深紅可愛。追時此一種大葉ト稱スルアリ。花葉稍

大ニノ葉質剛シ



ハコベ 繁縷

平本草

啓坐 形状ヲ詳ニシ。人々亦通知ス故ニ略之。多種アレ此ミナ葉五葉。花五瓣白色各  
瓣ニ二裂シ殆ト十瓣ノ看アリ。子室九圓五柱ニメ頭外及シ。雄蕊十莖ナルヲ常トス

附 全花二倍圖

按

*Arenaria*

羅

*Rosa*

ムニール

蘭

*Orchis*

十雄蕊ノ中ニ水レヒムニール

蘭ノ下ニ林氏云。從前ムニール

トテ

十雄蕊ノ中ニ水レヒムニール

蘭

ムニール

蘭

甲 深山に生シ。全形常種ニ同メ葉潤大ニノ厚ク。花常種ト同ク五弁十裂ナレバ。大ニ五六分雄蕊十茎雌蕊三柱ノ異アリ。又此一種ニ草稍小ニノ花ノ大サハ同シク  
「希微ノ狹キモノアリ」

説詳前条下



ヤマハコベ

卷之八

平木舟

山原沙地ニ生ス。全形常種ニ似テ小ニメ莖稍剛ク葉心臟狀ニメ大リ。莖微強ノ硬軟纖微毛アリ。花常種ト同ジケレバ微大ニメ三柱ナリ。又一種草稍小ニメ莖及シ粗タノ柔滑。色淡綠ニメ不帶紫。常種ノハコベノ如クシテ花ハ本条ト同シキモノアリ。



卷之二


平本草書

卷之二

平本草書

赤山下ニ生ス。形山ハコベニ同シテ花辨ナク葉上直ニ子室兩蕊アリテ。ソノ草花辨ノ看アルヲ以テ。アラハコベノ名アリ。附全花邦大圖

青ハコベ




卷之八

又木辨

オホヤマハコベ

山中ニ生シ。葉披針状ニメ墨オグラセノオノ葉ノ如ク。ソノ枝ヲ令チ花ヲ放テ  
ハ形ニ於テハ常種ノハコベノ花蘋ニ同メ大ナラズ只葉狀ノ不同ナルヲ異トス



ナシバノハコヅ

卷之八

本草書

山中ニ生ス。藤蔓長ク延テ強ク葉頗ル長メ女婁菜ノ葉ノ如クメ微糙滑アリ。夏枝  
梢每ニ花アリ。萼鐘様ニノ扁五稜アツテ五尖及巻シ。花五瓣。爪細。末潤ク端ニ裂シ  
每頭二三蕊ヲナシ。裂下ニアツテ折レテ外反ス。色淡黃綠白。子室圓尖ニノ三柱細  
メ如毛。雄蕊十莖。ソ、五者ハ子室ノ下ニ出テ長ク辨間ニ列シ。ソノ五者辨ノ半ニ  
出テ短ク。辨端外反ノ處ニ至ル。各黃蕊アリ。實熟ノ圓ノ黑色。

*Convolvulus macrorhizus* 錄氏

按此品

*Convolvulus*

ノ屬ニカ、ル如ナレニ。林氏ワノ篇中ニ不載。別ニ

有所見テ然カ。姑期後考



繁縝ニ似テ稍小。高五七寸莖葉共ニ微毛アリテ剛少微暗紫色ヲ帶フ。葉五葉披針状。花半裂五瓣亦披針状ニメ白色。子室圓長五柱或ハ三柱ニメ。二柱ハ岐シテ頭尖五房トナルアリ。雄蕊十二ノ蕊淡黃色。花後實形赤ハコベノ如シ。伊吹山嶺ニハ葉稍小ニノ花尤大ナルアリ』附全花部 大圖

## 第二種

セラスチム

*Cleastium oligogynum*

羅

*Lamium galeobdolon*

ケターノ

ホーリンブルーム

*Lamium galeobdolon*

蘭



サハジオン

タコノアシ



七十二



所属未考

水澤池邊ニ生ス。莖高二三尺。葉狹長細鈍齒アツテ。形山梗茱萸ノ如メ長ク。密々散布シ。夏曉莖梢多ク分歧シ。頭卷回シ各々穗ヲナシテ花ヲツク。大サニ分許。萼蓋状五裂ニメ無瓣子室五箇並接シ。各一柱柯子狀ニメ長ク。結頭アツテ白色。雄蕊十二ノ黄薺。花後五子輪次並置シ。内ニ細子ヲ収ム。ソノ形章魚ノ足ノ如シ。故ニタコノアシ又タコノテノ名アリ。附一全花二半熟實共四倍圖。

草木圖說前篇卷八終



