

草木圖說前篇 草部

十一
二一
細紙

九

植物

二八

二
〇

學 滋
技 中 質

草木圖說

470.3
537
vol 9



圖說前篇卷九目錄

第十一綱

スベリヒユ

ツタヤクシ

同一种

カンアフヒ

第二目

キンミツヒキ

蘭茹

同一种大葉者

ミツハギ

ウスバ細辛

フタバアフヒ

ノウルシ

甘遂

葉ギクサウ

ミコノス、

白山大戦

ハル大戦

イハ大戦

ニシキサウ

第十二綱

第三目

ナツユキサウ

第四目

ツルナ

第五目

オランダイチゴ

大戦

伊吹大戦

仙臺大戦

ホルトサウ

シモツケサウ

白花ヘビイチゴ

ノヲゴイチゴ

ヒメヘビイチゴ

オヘビイチゴ

カハラザイコ

同一种

ミツバツチグリ

ツルキンバイ

深山ダイコンサウ

ヘビイチゴ

コガ子イチゴ

ミナモトサウ

ツチグリ

大葉ツチグリ

小葉ツチグリ

ダイコンサウ

コキンバイ

...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

草木圖說前篇卷九

大垣 惣齋 飯沼長順著



草部

第十一編

自十一雄蕊 至二十雄蕊
ボドカドリア
Puccinia

田園普ク自生ス。莖圓ノ帶赤色。地ニ布テ直立セズ。全草肥厚多液。葉持圓ニ長五七分。夏梢頭葉破三五花ヲ簇生ス。萼鐘狀ニ夕圓尖二葉。花亦鐘狀五裂瓣頭缺刻アリ。子室半萼ニ蔽レ一柱頭五裂。雄蕊十二ニノ圓藥。瓣黃共ニ黄色。日出テ花開キ午前ニ至テ閉ツ。花後萼葉落テ子萼中ニ熟シ細ニノ黑色。又種植ノ一種アリ。莖葉頗ル大ニノ高尺許ニ及テ他ノ異ヲ不見。故ニ不載別圖。即漢人所謂狗耳草コレナリ。

林氏亦 ウヰルテ野ト タムソノ種ト ノニ種ヲ オククツノ タムノナルハ 純耳草ニアタル

林氏云。稚草ヲ採テ煮或ハ蒸シ食フ。無毒美味ニノ大便ヲ軟ク。煎汁搾液等ハ。諸般ノ内蔵焮衝ニ利アリ。殊ニ石淋痛小便艱澁ノ治ニ實用ス。阿須氏云。全草石碱様ノ液アリ。稀薄潤燥清涼ニノ差ヤ強壯ノ性アリ。附兩蓋邪大圖

第二種
 ポリトユラカ ヲレラセア
portulaca oleracea
 菜
 カラツトブライズ
glaublitige
 ポルセイ
portulaca
 葡



溝瀆ノ畔ニ生ス。莖方ニノ線稜アリ。高三四尺。葉柳葉ノ如ク對生。葉腋枝ヲ出シ。各梢葉腋ニ短梗三五花ヲ簇生シテ穂ヲナス。萼筒様ニノ稜條アツテ六尖。ソノ尖間ニ六ノ針狀細葉アツテ側ニ向フ。落花後。尖内ニ向テ口ヲ塞キ。針狀葉微ク起テ角様ヲナス。花卵圓六瓣。淡紅紫色。子室麥粒狀。一柱長ノ菌頭。雄蕊六者長ク喉外ニ出。六者短ノ筒中ニ潛ム。共ニ黃藥アリ。一種花形稍小ニノ色淡。殆ト白色ナルアリ。

附萼部大圖

第一種

リトユム

サリカリア

Lythrum salicaria.

群

ゲアールドテ

guardite

ハルテーク

partite.

前



山嶽陰地ニ生ス。葉恰モノユキノシタニ似テ短ク薄。綠色ニ不帶紫亦刺毛茸アリ
 五月葉間ニ莖ヲ抽ク。七八寸。二三葉ヲ互生シ梢ニ疎穗状ニ細梗花ヲ綴ル。花被
 ニノ鐘状五裂。子室ヲ被ラ披開セズ。白色ニノ細紅點アリ。梗紅紫色。子室柯子状ニ
 ノ長ク頸延テ一柱ヲナス。細檢之ニ披針状ノ大小二片ノ併合ニナリテ。内ニ多ク
 ノ圓長細子ヲ收ム。ソノ状一奇。即コレ此草ノ標徴ニシテ。ユキノシタ類ト不同処ナ
 リ。雄蕊十五葯。淡黃褐色。附 一盛花 二花稍衰子室漸長者 共都大圖

所属未考



葉杜衡ノ如ナレド稍薄ノ。光澤ナク斑故ナク冬葉ナシ。故ニウスマハ細辛ノ俗稱アリ。根際ヨリニ葉双生スレドカモアフヒノ如ク高ク地上ニ出テ岐ヲナサズ。兩柄相對スルノ間ヨリ一梗ヲ出シ花アリ。花被ニノ鐘狀縁三裂尖外捲スルノ形。カモアフヒト同様ナレド。瓣稍短シ。惣テ此類ノ雌蕊ハ一柱ホフノ短。未六出殆六柱ノ如ク。頭側ニ向ヒ雄蕊十二ニノ柱外ヲ圍ム。葯紫色ニノ開綻黄粉ヲ吐ク。附兩蕊位置郭大圖。林氏云。葉根共ニ菜用ニ供ス。惣テ烈キ佳香アリテ味苦辛。用量少ケレバ利尿催経又凝血ヲ釋キ肺ニ利アリ。多量殊ニ酒浸ナルハ。吐ヲ催起ス。故ニ腦質鋭敏ナルニハ用ベカラズ。吐劑トスルニハ根末五分ヨリ一匁。浸劑ハ一「ロ」ト。葉ハ二三「ロ」ドヨリ八「ロ」ドニ至ル。輕ク水煎スレバ下利ニ濃煎スレバ只利尿シ。荏苒タル沈疴ニ功アリ。然ルノ功用体質ニ從テ不一。用之須ク慎ムベシ。搾汁ニ在ツテハ尤然リ。又嚏茶トシテ持久頭痛ヲ治ルノ名アリ。

第一種


アサルニム エウロピウス
Asarum europaeum. 羅 *europaeum* エウロピウス
 按或林氏所載ノ第一種ヲ以テフタバアフヒト為シ。第二種ヲ以テ本条ニ當ル者亦可ナルガ如シ。余孰カ是ナルヲ知ラズ。故ニ記シテ後賢ノ斷ヲ俟ツ。



上条一種稱漢種者

トウサイシン 花片

漫ニ漢種ノ稱アレバ余未詳産処葉形實上条ト略同ノ花筒稍長キノ異アリ



Handwritten Japanese text in vertical columns, likely describing the plant's characteristics and its classification as a 'Han' (Chinese) variety. The text is somewhat faded and difficult to read in detail.

フタバアフリ

カモアフリ

行根地上ニ延キ。処々ニ鬚根ヲ出シ。ソノ処ヨリ一柄ヲ抽ク。二寸餘ニメ。又分シ
 上ル。三四寸。各頭一葉。形細辛ニ似タレ。尺稍圓扁ニメ尖リ。光澤アツテ脉理分明。
 柄又股ノ間ヨリ一梗ヲ出ス。一寸許ニメ花アリ。ホ細辛類ト殆ト同メ。本尖リ末
 漸クヒロガリ。弁稍長ク。柱頭總ニ六裂外反シ。雄莖十二双耳葯。細辛杜衡ミナ一柄
 根際ニアツテ直ニ又分ス。此種ハ地上ニ上ル。一ニ寸ニメ分ル。ヲ以テ。双葉相
 並ノ状顯著ナリ。是以テ特リ此品ニフタバアフリノ稱アリ。一種小葉ニメ高二三
 寸ニ不過モノアリ

第二種

アサルユム

カナデンセ

カナダース

マニス

カール

Spatum umbellige. *Kunze's Arznei-kr. 1807.* 蘭



カニアフヒ

杜衡

形状啓蒙ニ詳説ス。故ニ略之根際ニ冬ヨリ花アリ。無梗ニシテ形略細辛花ノ如クナ
 レ。筒稍長ク淡黄緑白色ニシテ暗紫ヲ帯フ。縁三裂ニシテ尖リ。外及スレハ筒ニツク
 ニ至ラズ。筒内暗紫色。中心六裂柱上リ立チ。各尖又純ニ二裂シ。其木ノ背本ニ葉故アル
 淡黄褐色ノ一圓球アリテ。柱頭ノ用ヲナス。雄蕊短クノ長弱。色淡黄ニシテ白粉ヲ吐
 キ球下ニ住シ。長短十二茎相間ノ柱ヲ圍ム。ソノ状細辛ト別ニ一異趣ヲナス。又苞
 葉ニ葉アツテ。ソノ内ヨリ一新葉ヲ出ス。 附 一兩蓋 二雄蓋 三雌蓋共郵

大圖

第三種

アサリユム

ヒルギニクユム


ヒルギニス

ミニス

ラール

Platanus virginiana, *virginica*, *maris-orientalis*

按春氏此名下ニウスバ細辛ノ名ヲ下可疑



二葉...
 三葉...
 四葉...
 五葉...
 六葉...
 七葉...
 八葉...
 九葉...
 十葉...
 十一葉...
 十二葉...

キンミヅロキ

龍芽草

原野ニ多ク生ズ。莖高二三尺。單繖葉ヲ互生ス。ソノ繖鋸齒アル大小葉ヲ以テ交ヘ成ル。大抵大葉三對小葉ソノ間ニ交リ柄本ニ缺刻鋸齒アル托葉ヲツク。莖葉共ニ毛茸アリ。葉腋枝ヲ出シ。莖梢亦數重ヲ生シ。夏ニ至テ共ニ穂ヲナシ花ヲ綴ル。莖葉ニ五尖梗ニ小鱗葉。莖ニ短針狀葉アツテ覆之。花卵圓五瓣黃色。雄蕊十二約深黃色。子室半莖ニ載レテ二柱。頭開哆。花后實アリ。刺毛アツテ人衣ニ著ク。附一兩莖ニ等共郭大圖 主用藥鏡

第一種

アグリモニア

エニハナリア

ヤメーキ

アグリモニア

agrimonia eupatoriæ 藥
gemma
agrimonia 藥



水澤濕地ノ地ニ生シ。早春芽ヲ叢生シ初メ淡紅色ヲ帯ブ。圓莖高サニ三尺葉金絲
 桃葉ニ似テ狭ノ微毛アリ。莖ニ多葉散布シ梢上ニ五葉ヲ冠次ス。上ニ五葉ヲ抽出
 シ各ニ三寸。每頂瀾短ナル三葉アツテ上ニ細莖ヲ出シ。莖頭ニ小葉々心一花ヲツ
 ク。莖鐘狀上縁四片ニ分レテ外反ス。形扁ニシテ差半規形ヲナス。ソノ内側ニ數尖ア
 ル鱗様ノ四花瓣アツテ花心ニ向フ。筒狀大戟耳逐ノ類花形一殊態アリテソノ形
 只莖頭ノ四片ヲサシテ花瓣ト見。筒内鱗形鱗ニ於テハ明辨ヲ缺クモ
 ノ、如シ故ニ今之ヲ莖ト花瓣トニ分ツテソノ狀ヲ記ス。不知當否如何。ソノ花瓣相
 並フノ位ニ一间隙アリ。即チ後ニ子室ノ垂下スル処ニアクル子室圓夫三縱道有
 テ純三稜皮ニ多ノ疣瘻アリ。初ノ細莖上ニ直立シ。莖漸ク伸テ傾歪シ終ニ花瓣ノ
 外ニ垂ル。頂上三柱一併。未三分シ各頭又又開シテ反ス。雄蕊幸子十九。初ノ瓣下ニ
 潛ヲ漸ク伸長ス。藹分又蛤様黃粉ヲ吐。ソノ伸ルヤ必ス一齊ナラズ。一一ニ後ル。故
 ニ齊ノ全數ノ見ルコトヲ不得。又大撒及小撒ノ中心亦各一花ヲ出ス。而モ大撒中ノ

モノハ。子室ヲ不具。小撒中ノモノハ多クハ具ス。惣テ似類ノ品。花形大抵皆然リ。故
 ニ之ヲ此ニ詳説ス。又ソノ肥瘠ニヨツテ。梢上ノ五葉或ハ三。又小撒上葉三。又小撒
 花梗ヲ挾テニ小莖ヲ出シ各ニ葉一花ヲ開キ。或ハ葉腋枝ヲ出シ花アル等ノ不同
 アリ。細莖子室ニ淡黃帶綠色。後ニ至テ黃色更ニ加ル。已ニノ小撒下葉黃變シ。四
 五月ノ際苗枯。根直ニノ頗ル粗大ナリ。此種類ハミナ莖葉ヲ切レバ白汁ヲ滴ス
 附 全花部大圖

按蘭苗大戟耳逐ノ類。共ニ *Cypripedium* エウホルビア

calceolus カフホルスノケ

カ、ル。鐸氏十餘種。林氏六十四種ヲ奉レバ。ソノ中本邦所在ノ品ニ的當ナルモ
 ノ多カラシ。然レモソノ諸種ノ形狀彷彿難述シテ遽ニ決レガタシ。故ニ姑期他
 日之考

此草生於水邊，葉長而尖，花小，色淡紅，味甘，性平，能治一切瘡毒，消腫止痛，其功甚大。此草在江蘇、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、四川、廣東、廣西、雲南、貴州、陝西、甘肅、山東、山西、河南、河北、遼寧、吉林、黑龍江等省均有分布。此草在民間被廣泛應用，其藥用價值極高。



此草生於水邊，葉長而尖，花小，色淡紅，味甘，性平，能治一切瘡毒，消腫止痛，其功甚大。此草在江蘇、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、四川、廣東、廣西、雲南、貴州、陝西、甘肅、山東、山西、河南、河北、遼寧、吉林、黑龍江等省均有分布。此草在民間被廣泛應用，其藥用價值極高。



添頭蘭

冬末春初宿根ヨリ芽ヲ叢生ス。色紅紫ヲ帯テ頗ル美ナリ。二月ノ頃圓莖高一尺余
葉ヲ散布ス。形ノウルシノ如クノ稍小。未鈍ニノ深緑筋脈白色。背ニ微毛アリ。時ニ
紅紫色漸ク褪キ僅ニ葉末ニソノ餘ヲ見ル。莖頂五六葉蓋ヲナシ。葉上細莖ヲ出シ
每頭潤短ニ小葉相對シ。内ニ一花ヲ擁ス。形ノウルシノ花ノ如クノ弁色帶緑ニメ
淡黄ナラズ。又鱗片頭尖銳ナラズ。子室上ニ疣瘰ナク。其他兩莖ノ形散等ニアツテ
ハノウルシト一般。小莖心別ニ一花アルヲ亦同シ。此品每葉腋ヨリ頂ノ如キ一細
莖ヲ出シ各頭一花ヲ放ク。根ハノウルシヨリ粗ノ小蘿蔔ノ如ク。色黄ニノ微黒ヲ
帶ビ切レバ黄汁ヲ出ス。附 去兩莖諦視辨莖形即大圖

按鐸氏所考ノ

Bucht アレーゴト

Melipsmucke ウエルフスメルソ

ノ圖說本条ニ的當ナル如

シ宜他書ノ参考ヲ得テ之ヲ決スベシ



早春宿根ヨリ芽ヲ叢生シ。色帯紅。圓莖高尺許鈍披針狀葉ヲ散布ス。三月莖頂五葉
ヲ以テ一蓋ヲナシ。上ニ五細莖ヲ繖狀ニ出シ。每頭二葉本淵ク未夫リ。葉心短梗一
花アリ萼鐘狀。邊緣四裂ノ八尖ヲナス。恰モ四鈎月ヲ保スガ如ク。内側ノ鱗片亦
數尖起ラナシ色黃赤。子室圓尖鈍三稜ニノ。頭上三柱。每頭二裂色紅紫。雄萼率十
五ニノ黃結。草狀啓蒙詳之可併見。附 一金花 二萼 鱗片共邪大圖

按鐸氏

Wickstr.

opt.

polypala.

ノ大小二種ノ圖說本条ニ當

ルモノ、如シ宜ク他書ノ参考ヲ要ス



大葉甘遂

西濃処々山陰溪間ニ生ス。茎高一尺餘。全体軟ニメノウルシノ類ノ如ク。葉卵圓披針狀ニノノウルシノ葉ヨリ濶ク。茎ニ四五葉ヲ五生シ。梢頭五葉ヲ冠次シ。頂上五細茎每頭ニ葉中心一花。又ノノ兩側ヨリ一細茎ヲ出シ。二葉一花。又茎ノ葉腋亦同ク花ヲ出ス。萼鐘狀邊縁四出。鈎月様ナルト上条ト同形。雄蕊率子十八。子室柱形亦一般ニメ色淡黄緑。附 一全花 二雄蕊



卷之九
○十二圖
五木至茂

余未詳産地。或云海濱ニアリ。茎高五七寸。葉月逐ノ葉ノ如クメ小ニノ密附シ。頗葡
 花ノ態アリ。故ニ葉ギクサウノ名アリ。茎頂心狀葉三筒ツ、密通ニ重ニ對生シ。
 每葉上五七分ノ細莖ヲ出シ。殆トニ嫩ノ如シ。細莖頭扁田ノニ葉相對シ。中心一花
 兩側又細莖ヲ出シ花ヲ放ク耳逐ノ如ク。花嫩心一雄花ヲツクル亦同シ。葉片
 ノ兩端少ク尖起アリテ差ヤ耳逐葉ノ釣月様ナルノ態アリ。又嫩下一ニノ葉腋亦
 細莖ヲ出シ花ヲツクアリ。花候亦耳逐ト同時ナレバ。耳逐ノ一種ニ不外カ如シ

附 全花部大圖



Handwritten text in vertical columns, likely a commentary or additional botanical notes. The text is written in a cursive style and is partially obscured by the main illustration.

八九月實生シ。卷ニ至テ一根數莖ヲ出ス。高尺許。葉五生形倒蛋形ニノ機細鋸齒アリ。質大戟類ト同ク。莖葉ヲ搗ノハ白汁ヲ出ス。三月莖頭五葉ノ對生シ。上ニ五枝ヲ分チ。每頭大小二葉ヲ對シ三枝ヲ出シ。葉ノ大小ニ從テ枝亦長短アリ。每頭二葉對シ二亞ニ分レ。其頭又二葉ヲ對シ二ノ短梗花ヲ開ク。分枝ノ中心亦雜性花ヲ出ス。莖扁圓四片黃綠色。瓣蓋黃色子室ノ形奇特テ大戟ト同シ。

四十八種

エニナルビア

ヘリヲスニコビア

epithorbia fulioscopia.

藥

ソニチウエンガフ

Konmurtzig. ntokymult.

ウラルフスノルク

商



本草綱目卷之六十一 澤漆 澤漆一名澤漆。生於澤中。葉五生。形倒蛋形。機細鋸齒。八九月實生。卷ニ至テ一根數莖ヲ出ス。高尺許。葉五生。形倒蛋形。機細鋸齒。質大戟類ト同ク。莖葉ヲ搗ノハ白汁ヲ出ス。三月莖頭五葉ノ對生シ。上ニ五枝ヲ分チ。每頭大小二葉ヲ對シ三枝ヲ出シ。葉ノ大小ニ從テ枝亦長短アリ。每頭二葉對シ二亞ニ分レ。其頭又二葉ヲ對シ二ノ短梗花ヲ開ク。分枝ノ中心亦雜性花ヲ出ス。莖扁圓四片黃綠色。瓣蓋黃色。子室ノ形奇特。大戟ト同シ。

タカトウグイ

大戟

筒茹大戟并逐澤漆續隨子等ハ同一屬ニシテ形狀略一様ナレドモ各々殊標アリテ其
 分別ヲナス。就中大戟ハ産地ニヨリテ大小形色一ナラズ其種亦多クナレドモ概スル
 ニ草筒茹ヨリハ茎葉シマリテ差剛ク。茎ニ毛アレドモ儼々無キガ如ク。夏ニ至テ莖
 ニ秋ニ至テ漸ク衰フヲ常トス。香ヲ裁テ漢種ト稱シ。又秋ニツノ茎紫色ヲ帯ルヲ
 以テ護ニ紫大戟ト稱スル品ハ吾近境木曾川堤上ニモ多ク自生シ。肥タルハ高三
 四尺。瘠タルハ一尺餘ニヨク花ヲツク。多葉散布シ梢頂五葉樹蓋ヲナシ。
 蓋上五小枝ニ分レ各三葉ヲ對シ。又三又ニ分レ。每又又二葉ヲ對シ數層ヲナシ。各
 頂花ヲ開ク。花實莢狀草筒茹ト同ノ差小ナルノミ。故ニ只郭大圓ヲ附シテ子細ヲ
 略ス。又蓋下ノ二三葉腋ヨリモ枝ヲ出シ花ヲ開ク。此種白山種ヨリハ葉小ニシテ中
 筋粗トカラス。尤伊吹赤坂等ノ種ニ似テ稍大ナリ。大戟ノ多種ナル。其根ノ形色亦
 一般ナラザレバ。功用亦一様ナルベカラサレドモ。余未ダソノヲ詳ニスルノ暇ヲ
 不得。今只數種ヲ掲テ以テ後日ノ考資トス。



白心大戟
 此種ハ根ノ形色亦一般ナラザレバ。功用亦一様ナルベカラサレドモ。余未ダソノヲ詳ニスルノ暇ヲ不得。今只數種ヲ掲テ以テ後日ノ考資トス。

白山大戟

莖頗ル粗ク高二尺許。多葉散布シ差大ニメ色深緑。中筋粗ノ白色。梢五六葉蓋ヲナ
シ。每葉上一小枝ヲ出シ長二三寸。上ニ三葉ヲ對シ葉心又二三小又ヲ出シ。又上ニ
葉中心花ヲ開ク。此種ハ梢葉腋ニ枝ヲ出サズ



白山大戟
十八
本草綱目

伊吹大戟

伊吹山金生山等ニ多ク生ス。莖高二尺許細ク剛クノ赤色ヲ帯ビ。葉小ニメ長一寸餘ニメ五生。梢頂ニ五葉ヲ攢簇シ。每葉一枝々上三葉ニメ三枚。上ニ二葉アツテ一花ヲ放ク。花側又一梗ヲ出シ。又二葉ニメ一花アツテ往々續隨子ノ如ク十數相重ルニ至ルモノアリ。又蓋下ノ葉腋処々ヨリ枝ヲ出シ赤花ヲワク



本草綱目卷之六十一 木部 大戟 伊吹大戟

ハル大戟

産处未詳。草状伊吹等ニ産スル細葉大戟ト略同シケレド。茎稍粗クノ高一尺餘ニ
過ズ。三月耳遂ト同狀ニ花アリテ殆ト耳遂ニ相似レド。葉形鈎月様ナラスレテ懸
テ大戟花ニ同シ。故ニ別ニ詳圖ヲ不載。稍葉腋梗ヲ出セド。伊吹産ノ如ク花梗長ク
相重ルニ至ラス



此草ハ...

仙臺大戟

此種ハ蘭若及ヒハル大戟等ト同時ニ花アリ。莖色暗紅ナルヲ伊豆産ヨリ深ク。葉
 微布シテ伊豆産ノ密布スルガ如クナラズ。色綠色ニノ中筋白色。新葉ニ紅紫暈ノ
 リ。又梢上及蓋下ノ一二葉腋ヨリモ花梗ヲ出シ。ソノ下ノ二三葉腋ヨリハ小枝ヲ
 出シ葉ヲウクル。草簡茹ノ如ク。又花ヲ色ムノ小葉扁尖ニノ帯紅色。他種ノ湖短
 尖銳ニノ淺黄ナルト同シカラズ。又莖頭微凹ニノ兩尖ヲナシ。幹小ニノ頭平扁。又
 根長ク延テ遠ク苗ヲ分ツ等ノ殊標アリ



トハ大戟
 仙臺大戟

イハ大戟

紅芽大戟

伊豆等ノ海邊石間ニ生ス。晩秋ヨリ新芽ヲ生シ色紅紫。葉ハ狭長白綠色ニノ邊緣
 紫暈アリ。寒キ間ハ葉背紫色。茎紅紫。春暖ニ至レバ漸ク淡緑ニ変ス。茎高一二尺。葉
 密ニ散布。梢上亦多葉攢簇シ。葉腋毎ニ一梗ヲ出シ花アリ。雌雄莖狀ニ異アルヲナ
 シ





ホルトヤウ 續隨子

啓蒙堂黃花實ノ

形ヲ説ク下ニ詳

明。故ニ畧之。但稍

上五葉ニノ五枝ヲ

分ツトハモノハ。其肥

大ナルモノニ因ル多ク

ハ四葉四枝ヲ常トス。故ニ林氏亦四葉ヲ正トス。此種大戟耳遂

ノ同属ナレト。惣テ一家ノ殊標アリ。花形ハ大抵同様ナレト。等

鐘様ニノ四裂ニ。頭兩起アツテ。差々鈎月ノ形ノ如ク。花弁ハ

披針狀ニ。尖微裂アリ。實礎同ノ三起。柱ニノ頭ニ裂。何須氏可圖

實熟ノ果褐色同ノ大。四五合三品ニノ三子アリ。子莖麻子ニ似テ小。林氏云葉ノ白汁味甘ノヨク。莖替ヲ

除ク。子味亦同ノ峻下ノ性アリ。莖麻子ト同シ。又分曉催起ニ用テ功アリ。附一全花ニ。莖共耶大圖。

三十五種

cuphorbia

lathyrus

prunella

蘭



ニシキサウ 地綿

田野園中ニ生スル小草ニシテ夏苗ヲ生シ秋ニ至テ盛ナリ。根際ヨリ多枝ニ分レ地ニ敷テ擡頭
 セズ。葉兩對移楕圓ニシテユカミ至細ノ鋸齒アリ。葉腋枝ヲ出シ枝腋葉腋共ニ花ヲツクルノ形大戟類
 ノ如ク。花形亦一級等鐘樣五裂雄蕊長ク瓣外ニ出テ柱リ。頭ニ三摺三角ノ子室アツテ。頂上三柱每柱
 ニ分スルアリ。雌蕊三莖葯合又様色暗紫ニシテ黄粉ヲ吐ク。ソノ草狀大小大戟ノ類ト大ニ異レシ。花實ニ
 アツテハ全クソノ趣ソ同シ。且莖葉共ニ切テ白乳ヲ出スコ亦同シケレバ。之ヲ「エウホレヒカム」ノ属ニ收メザル
 ベカラス。鐸氏云。此種性酷烈ナルト大戟類ト同シ。故ニ自然汁ヲ塗擦シテヨク洗滌類ノ息肉ヲ除ク

附 一 一枝 二子室并莖 三兩莖共郭大園

第 二十四種

ニシキサウ *Siphonanthus* *shonanensis* 雄 雌
umbellata *oblonga* *oblonga* *oblonga* 雄 雌
oblonga *oblonga* *oblonga* *oblonga* 雄 雌
 按西島氏林氏二十一種ノ *thyrsopodum* ヲ以テ本条トスレバ不穩



草部

第十二綱

多雄英附葉

イコナンドリヤ
icosandria

ナツユキサウ

シモツケサウト同類ニノ。共ニ葉掌様ニノ重複不存ノ尖鋸齒アレ氏。此種ハ根葉
 脚葉共ニ長柄ノミニメシクヒ葉ノツクナク。シモツケサウハシタヒ葉アツテ
 殆ト鱗様ヲナシ。托葉亦大ニ花色淡紅。ナツユキハ。紅白ニ種アリテ。紅花ナルヲ京
 ガノコト云。ミナ等四葉ニノ外及シ。花四瓣圓ノ周邊ニ雲頭齒狀アリ。子室三箇表
 粒状ニノ聚接シ。各一柱ニノ結頭アリ。多雄英等ニツキ葯黄色。附 全花郭大圖
 可属未詳



三十五
草木全書



形状詳前条下

シモツケサウ

卷之六

二二二

二六

海辺沙場ニ生ス。實ヲ取テ蔬圃ニ移シテホヨク繁殖ス。莖一二尺初ノ塌地シテ直
 主セス。葉蕨葉ニ似テホホ共ニホクク。多内鬆疏。面背共ニ滑ナラスシテ色淺緑差
 鹹味アリ。每葉腋ニ短梗一花或ハ二花ヲ并ベ。又共ニ枝ヲ出ス。萼鐘状ニシテ四尖起
 或五
 起。アリ。頭四裂開展。表淺緑裏黄色ニシテ別ニ花瓣十シ。子室莖ニ依レテ四柱或五ニ
 ヲ及シ。雄蕊十二或ハ十五六。萼ノ内側ニ出テ黄色。花底外面粟紋アリ。實熟ノ莢實
 ノ小ナル如ク。内ニ四五ノ細白仁アリ。 附 全花部大圖

アトラ、コニア
Asplenium japonicum
 イヤホニカ

春氏



第一節
 第二節
 第三節
 第四節
 第五節
 第六節
 第七節
 第八節
 第九節
 第十節
 第十一節
 第十二節
 第十三節
 第十四節
 第十五節
 第十六節
 第十七節
 第十八節
 第十九節
 第二十節
 第二十一節
 第二十二節
 第二十三節
 第二十四節
 第二十五節
 第二十六節
 第二十七節
 第二十八節
 第二十九節
 第三十節
 第三十一節
 第三十二節
 第三十三節
 第三十四節
 第三十五節
 第三十六節
 第三十七節
 第三十八節
 第三十九節
 第四十節
 第四十一節
 第四十二節
 第四十三節
 第四十四節
 第四十五節
 第四十六節
 第四十七節
 第四十八節
 第四十九節
 第五十節
 第五十一節
 第五十二節
 第五十三節
 第五十四節
 第五十五節
 第五十六節
 第五十七節
 第五十八節
 第五十九節
 第六十節
 第六十一節
 第六十二節
 第六十三節
 第六十四節
 第六十五節
 第六十六節
 第六十七節
 第六十八節
 第六十九節
 第七十節
 第七十一節
 第七十二節
 第七十三節
 第七十四節
 第七十五節
 第七十六節
 第七十七節
 第七十八節
 第七十九節
 第八十節
 第八十一節
 第八十二節
 第八十三節
 第八十四節
 第八十五節
 第八十六節
 第八十七節
 第八十八節
 第八十九節
 第九十節
 第九十一節
 第九十二節
 第九十三節
 第九十四節
 第九十五節
 第九十六節
 第九十七節
 第九十八節
 第九十九節
 第一百節

蘭種ニノ柄長サ五七寸。一葉三葉形心截状ニノ粗鋸齒アリ。柄葉背共ニ微ク織毛アリ。葉葉間花莖ヲ抽ク一尺許。梢頭散枝ニ分レ。每梗一小葉或ハ鱗状苞アリ。葉ノ葉披針状。花指圓五瓣白色大サ一寸餘。子室每様織柱滿布シ。三十餘ノ雄蕊圓之。兩莢共ニ黄色藥色尤深シ。實熟シテ點頭形頗大ニノ粒平塌突起セズ。色紅味淡ニノ不美。此種蛇毒ノ如ク蔓蔓延セズ。葉根際ヨリ長ク糸蔓ヲ延キ処々ニ新苗ヲ分ツ。已下ニ種ホツノ趣ヲ同シフス。 閉函英郭大圖

第一種

フラガリ ススカ *Fragearia vesca* 薔
 按林氏此条下ニ *Linnaeus, Miller* ウツルデ
 其種ヲ得ズ。コウキルデナルハ本条ニ當リ。コロイゲハ次条ニ當ル。林氏云第一種ハ專
 ラ食料菜用ニ供シ稍強心ノ功アリ。第三種ハ清涼ノ能アリ。子ハ碎石利尿ノ峻
 カアリ。又實ヲ以テ氈布ヲ製シ癩腫ニ貼ノ利アリ。



白花ノヘビイチゴ

蛇莓一種

余未クツノ産処ヲ詳ニモズ草形花萼ノ状オランダイチゴニ同ノ小葉背柄共ニ不可筆織細軟モアリ。花白色五瓣大サ六七分。時ニ六瓣ヲ交ニ。萼ハ常種ノヘビイチゴノ實ノ如クノ微大。此種亦根際ヨリ系蔓ヲ出シ。処々ニ葉ヲ出シ根ヲ下シ苗ヲ分テドモ。ツノ葉間ヨリ花ヲ出ス。ナシ。一種乗鞍山ニ産スル者ハ。花裏レバ微紅色ヲ帶實微ク長シ

按前条下所載ノ

Wiggen


ナルモノナラン林氏云

Wiggen

ハ *Thunbergii*

ヨリハ

味美ナラスシテ酸味少シ云々



本草綱目卷之十 蛇莓 一種 白花ノヘビイチゴ 余未クツノ産処ヲ詳ニモズ草形花萼ノ状オランダイチゴニ同ノ小葉背柄共ニ不可筆織細軟モアリ。花白色五瓣大サ六七分。時ニ六瓣ヲ交ニ。萼ハ常種ノヘビイチゴノ實ノ如クノ微大。此種亦根際ヨリ系蔓ヲ出シ。処々ニ葉ヲ出シ根ヲ下シ苗ヲ分テドモ。ツノ葉間ヨリ花ヲ出ス。ナシ。一種乗鞍山ニ産スル者ハ。花裏レバ微紅色ヲ帶實微ク長シ

ノヲコイチゴ

蛇苺一種

我州能御山嶺ニ生ス。長柄上一蒂三葉。形普常ノ蛇苺ノ葉ノ如メ小。質差厚ク面緑白背淡白ニノ粗鋸齒アル。頭ルオランダイチゴノ如ク。又トウ、チサウノ葉態アリ。柄葉脈歧ニ紅色ヲ帯テ頗ル美ナリ。根際寸許ノ幹様ニ立チ十數葉ヲ簇生シ冬ヲ凌テ不枯。春夏ノ際葉間寸許ノ細梗ニ三ヲ出シ。每頭一花ヲツク。摺圖七瓣六或ハ八瓣。白色ニメ大サ五六分。萼十片。兩葉ノ形似類一般。實熟ソ深紅。形オランダイチゴノ如クメ小ニシテ微長。紅肉陷凹ノ心ニ各一子ヲ壞シ。味厚カラサレト酸甘オランダイチゴニ勝ル。根際長ク紅糸ヲ延キ苗分ツ。ソノ糸亦紅ヲメ可看。


亦前条ノ一種ニシテ西書中未見載此種



ヘビイチゴ

蛇莓

原野甚々多ク。秋新苗ヲ生シ地上ニ蔓延シ。葉ハ長柄ニシテ一葉三葉。形心臓狀ニシテ粗鋸齒アリ。微毛茸アリツテ滑ナラス。互生ナレバ時ニ對生アリ。正二月ノ際葉腋ニ二寸許ノ梗ヲ出シ。各頂一花。萼ニ重ニシテ十片。外者ハ未瀾ヲノ三四尖ヲナシ。形恰モ葉ノ如クシテ萼葉或ハ花葉ト稱スベキモノ、如シ。内者ハ卵圓尖銳。花五瓣黄色圓ノ尖微缺。子室柯子狀ニシテノ萼様滿面ニ黄色ノ細柱ヲ布キ。雄蕊二十ニメ黄藥。此種類ノ生殖部大抵ミナ然リ。而ノ各々些異ナキニアラス。此藥ハ扁圓オウライサイコ。姜陵菜ニアツテハ差長カ如シ。實ハオウライサイコノ實ノ如ク。安ノ如メ小。大サ六七分。熟メ紅色。味不佳ニシテ食フニ堪ヘズ。一種莖葉稍小ニシテ黄色ヲ帯ヒ。實初メ白ク熟メ黄色トナルモノアリ。尾州貞部ノ地ニ産シテ之ヲキボウズト云。又每葉五箇一蒂ニツキテ。殆トオヘビイチゴノ葉ノ如クシテ。莖ハ蛇莓ノ如ク蔓延シ。葉間花實ヲナスモノアリ。附 全花部大圖



按オウライサイコノ類。又カハラサイコノ類ハ葉葉間ニ莖ヲ抽キ枝分シ數花ヲ攢生シ。本条ハ。茎塌地蔓延シ。每葉腋有梗一花ヲ放クノ殊標アリ。ソノ實紅熟スルニ至テハ。オウライサイコノ屬ニ外ナラズシテ。或ハ *fragrans* 佛二種 *monophylla* 雌 *umbellata* 雄 *var. obtusa* 雄 *fragrans* 佛二種 前ニ當ルカ如クナレバ。林氏所說精シカラザレバ。須ク諸書參考ノ要ス。





Handwritten text in vertical columns, likely a botanical description or classification in a traditional East Asian script. The text is faint and partially obscured by the illustration.



Handwritten text in vertical columns, likely a botanical description or classification in a traditional East Asian script. The text is faint and partially obscured by the illustration.




Handwritten text in vertical columns, likely a botanical description or classification in a traditional East Asian script. The text is extremely faint and mostly illegible.

ヒメヘビイチゴ

蛇莖一種


草形常種ノヘビイチゴニ似テ尤小ニシテ葉背微ク白ク。花形實状亦常種ニ異ナラズ。花ノ大サ僅ニ二三分ニ不過。此種北地山中ニアリテ。近道野生アルヲ不見



コガ子イチゴ

蛇草一種

亦北地山中ニ産ス。ヘビイチゴノ一種ニシテ茎地ニ延テ処々ニ根ヲ下シカブヲナシ。フノ葉腋ヨリ一梗ヲ出シ。花ヲ開キ實ヲ結ブノ形色惣テ常種ト同シケレド葉ノ葉共ニ稍強厚ニシテ鋸齒細尖重複ナルノ殊標アリ



Handwritten text in Japanese, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the page. Some characters are visible, such as '科' and '属'.

オヘビイチゴ

蛇含

五兒頭苗

田野路旁ニ多ク生シ。根葉叢生一帯五葉長柄上ニアリ。形蛇舌葉ヨリ長ク殆ト五
 如葉ノ如ク。西深緑背淡緑白色。又七八葉ノ一帯ニフクルモアリ。春末葉間數茎ヲ
 抽ク。初ノ地ニ塌ノ高起一尺餘。數葉ヲ五生ス。莖葉ハ一帯三葉ニシテ蛇舌ノ如クノ
 多クハ兩對シ。ソノ本ニ鱗様細小ノ數葉ノ苞アリテ枝又一花梗ヲ出ス。萼蛇舌ノ
 如ク濶カラズ。披針狀ニシテ全ク十葉萼ノ如ク。花蛇舌花ヨリ小ニシテ實ハカハラサ
 イコノ實ノ如ク。蛇舌ノ紅熟ナルト不同

第二十一種

ホトテナナナ

Potentilla reptans.

羅

Kuipian

gryphoid.

蘭

Plantaginifolia

Kingubianii

錫

按錫氏等印葉園寺ヲ檢ルニオヘビイチゴヨリハ莖延長スルモノ、如クナレ
 トモ他ノ形狀空異ナケレバ。タトヒ正當ナラザルモソノ一種タルニ外ナラス
 林氏云。水瀟愈創ノ性アリ。根ヲ煎服ノ赤利ヲ治シ。又含漱葉トナスヘシ



四十
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十

ミナモトサウ

狼牙

処々高山ニ生ス。莖高サ尺餘葉蛇含葉ニ似テ三葉一蒂ニノ五生。柄本披針狀ノニ
 葉兩側ニツイテ托葉ノ如ク。又ソノ側ニ一小葉ヲツクルテアリ。莖柄共ニ微毛アリ。
 萼ニ重ニノ十片。外者披針狀内者卵圓ニノ尖リ。花蛇含ニ似テ稍小瓣頂圓ノ缺
 凹ナク。實礎兩莢ハ似類一般。實菱陵菜ノ實如シ。根亦委陵菜ニ似テ小長。僅ニ一
 寸許

第三十五種

ボラニキルヲ


モリスルリーリス

モリスルリーリス

ガシヤカ

potilla montpuliensis / *montpuliensis garywick*

苗



原野沙地ニ多シ。葉ハ多ノ小葉ヲ以テ蟻様ヲナス。小蟻鋸齒深ク夫銳缺刻アツテ殆ト重蟻ノ看アリ。面緑色背白色柄莖共ニ白毛茸アリ。葉葉間莖ヲ抽ク下尺餘。稍上枝ヲ分チ。股間一花莖ニ每頭數花ヲ放ク。五瓣黄色形オヘビイチゴノ花ノ如ク。莖亦同様。實雌兩莖ノ形似類ト一般。實熟ノホオヘビイチゴノ實ノ如シ。根ハ直條頗ル粗フノ長ク。形色略紫胡ノ根ノ如シ。故ニソノ名アリシヨリ遂ニ誤テ代用スルニ至ル。高麗龍白草下所載ノ主治惣テ此類ニ通用スベシ。附兩莖部大圖

按カハラサイコツチダリノ類ミナ *potentilla* ノ屬ニ外ナラズ。就中林氏

ノ第二種ニ奉ル *potentilla argentea* 難 *Kikyo-shoon san*

ナラザレドモ孰レヲ正當種トセンヤ未得其斷。故ニソノ種類ヲ集ノ奉テ後ノ

考ヲ期ス



ツチグリ

ブクリヤウサイ

雞腿兒

翻白草

傳云薩州産ト。葉地ニ塌シテ叢生シ。形披針狀ニノ脊鋸齒アル五或ハ七小葉ヲ以テ一轄ヲナス。莖葉背柄共ニ白毛尤多ク。殆ト純白ナル如クノ光リ。葉面深緑色葉間莖ヲ抽キ地ニツイテ擡頭尺許。二三ノ小葉並ニ柄本ニ数夫ノ托葉アリ。莖頭分枝黄花ヲ放ク。辨萼兩莖實形等委陵菜ト同ク。根ハ彼ノ如ク長カラズ。只鬚根ヲ出シソノ先ニ玉團兒ホドノ如キ圓塊數顆ヲ生ス。赤皮白肉ニシテ苦澁ナラス。ヨク生食スベシ




非ハ味ハ其ノ女味ヲナシ
 心肝ハ味ハ失リ則チ心肝
 調イキナリ味ヲナシ
 小葉背葉葉ニ白毛アリ
 葉面深緑色
 葉間莖ヲ抽キ地ニツイテ擡頭尺許
 二三ノ小葉並ニ柄本ニ数夫ノ托葉アリ
 莖頭分枝黄花ヲ放ク
 辨萼兩莖實形等委陵菜ト同ク
 根ハ彼ノ如ク長カラズ
 只鬚根ヲ出シソノ先ニ玉團兒ノ如キ圓塊數顆ヲ生ス
 赤皮白肉ニシテ苦澁ナラス
 ヨク生食スベシ



上条一種

草形上条種ニ似レモ稍大ニ。葉卵圓ニノ尖リ鋸齒アル七或ハ九小葉ヲ以テ一鱗
 ラナス。早春所出ノ葉ハ小ニシテ小鱗ノ數多ク。夏ツノ小鱗ノ未ナル者大ニシテ本ハ
 小也。背葉莖ニ纖細白毛アレモ。前条種ノ如ク多カラズ。又草形同フシテ毛尤少ク
 殆トナキガ如キモノアリ。共ニ花萼莢實ニ於テハ一般異ナク。根ハ木様ノ塊ヲナ
 シ小指ノ如ク尖リ。肉褐色味微澁ニシテ前条種ノ無味ナルガ如クナラズ。又莖葉
 根ノ細ノ長キガ如クナラズ



下条一種
 草形上条種ニ似レモ稍大ニ。葉卵圓ニノ尖リ鋸齒アル七或ハ九小葉ヲ以テ一鱗
 ラナス。早春所出ノ葉ハ小ニシテ小鱗ノ數多ク。夏ツノ小鱗ノ未ナル者大ニシテ本ハ
 小也。背葉莖ニ纖細白毛アレモ。前条種ノ如ク多カラズ。又草形同フシテ毛尤少ク
 殆トナキガ如キモノアリ。共ニ花萼莢實ニ於テハ一般異ナク。根ハ木様ノ塊ヲナ
 シ小指ノ如ク尖リ。肉褐色味微澁ニシテ前条種ノ無味ナルガ如クナラズ。又莖葉
 根ノ細ノ長キガ如クナラズ

大葉ツチゲリ 或云大葉カハラサイコ

向陽ノ山中ニ多ク。略前種ニ同ノ葉稍大ニ楕圓ニノ粗鋸齒アル七葉ヲ以テ一鱗ヲナシ。全葉ノ長サ尺ニ過ク。質厚強ニノ微毛アルト又殆ト毛ナキガ如キトアリ。花實根形別ニ異ナク。只ツノ大葉ナルノ不同ヲ見ルノミ



三葉ツチグサ

翻白草

近道山野ニ尤多ク。一柄尺許三葉一蒂形蛇荅葉ニ似テ大。又白花ノ蛇莓葉ニ似テ
 稍長大ニノ剛ク。冬ヲ經テ凋マズ。春花實アリ。形上条ト同シ。亦葉背ニ毛有無ノ二
 種アリ。根ハ初メ珠塊後稍長ノ七八分ニ至ル。味前条種ト同シ



小葉ツチグリー一種

キヂムシロ 名府

草状ツチグリーニ似テ小。茎葉彼ノ如ク剛カラズノ微毛アリ。大抵五七ノ小葉ヲ以テ一鱗ヲナシ。春葉葉間茎ヲ抽クテ数寸。三葉一蒂ノ細葉ニミヲツケ。又分シテ花アリ。鱗葉形等常種ノツチグリー同ジケレド。葉ノ大葉ナルニハ。往々缺刻アル。蛇莓ノ葉ノ如キヲ交ユ。又葉ノ形ニ比シテハ花差大ニノ色亦濃シ。己ニノ根際線茎ヲ出シ長ク引キ処々ニ苗ヲ分ツ。稚苗ハ三葉一蒂ナレド後必ス鱗葉ヲ出ス時ニ葉柄共ニ紅紫色帯ヲ帶フ。此品名府ニテキヂムシロノ名ヲ称シテ蛇莓ノ類ニ分ツ。又此一種ニ花差小ニノ鱗重複ナルモノアリ此種ハ葉間線ヲ引クヲナシ共ニ根形結節アツテ下条ト同シ



ツルキンバイ

小葉ツチダリ一種

山中山崖所在コレアリ。草小ニノ窠ヲナシテ簇生シ。葉小葉蛇莖ノ如ク三葉一蒂
 ニノ鋸齒鋭リ。地ニヨリテ葉尖鈍ニノ
 コキンバイノ如モアリ。茎葉背共ニ微毛アレ。キヂムシロノ如ク
 多カラズシテ秋ニ微紅暈アリ。春葉葉間茎ヲ抽キ高三四寸。茎ニ一二葉並ニ小托
 景アリ。梢上三五分又シ花ヲ開ク。形オヘビイチゴノ花ノ如ク萼共ニ熟實ノ形亦
 同シ。根際茎ヲ出シ苗ヲ分テドモ。キヂムシロノ長ク線ヲ引ガ如クナラズシテ。蛇
 莖トキヂムシロトノ中間ニ主ツモノ、如シ。根ハ結塊小指ノ如クノ小。外皮黒褐
 裏肉白色帶褐。味微渋ナレ。氏猶生食ニ堪ユ。故ニツチダリノ下ニ收ム。此種産地ニ
 ヲツテ草状些異アリ。本曾産ハ鋸齒尤尖鋭。又菰野産ハ。茎差高ク主テ葉並ニ花ヲ
 ツクルト多ク。叢簇一窠ヲナシテ殆ト特生草ノ如クナレ。氏後總ニ蔓様ニノビテ
 苗ヲ分ツノトアルニ至テハ。ソノ態ヲ同シフス



ダイコンサウ

水揚梅

山林陰地ニ多ク生ノ宿根。葉略蘿蔔葉ノ如ク。大小相間シテ鱗様ヲナシ柔毛アリ。夏月茎ヲ抽クニ尺餘數葉ヲ互生シ。梢ニ至ツテ漸小ニテ鱗様ヲナサズ。莖葉柄本心ス印圓尖裂アルニ托葉アリ。莖頂分枝每頭一花ヲ開ク。萼大小十片ソノ五者大ニシテ半放針狀ニノ籠下シ。小者ハ各、大者ニ間シテ翻セズ。花五瓣圓ノ黄色形梅花ノ如ク稍小。中心實礎並様。頭延テ柱ヲナシ未曲ツテ頭釣狀ヲナス。實礎ノ下底多クノ長白毛アルヲ殆ト薊類ノ冠毛ノ如シ。多雄莖圓之莖莖共ニ深黄色。實熟メ毛球狀ヲナス一種白花ノ品又細葉ノ品等アリ。主用葉鏡載之。附實礎并柱郭

大圖

第二種

Geum carolinianum

Geum japonicum

Geum nagaii

薊

按林氏可説形状的當ス。然ルニ春氏
レニ大根サウノ名ヲ施セバ。林氏ノ第二種者我大根サウニ些異アルニヨルカ。
今試之ニ氣味功用全ク同シクレバ余ハ同種ト断ス。



深山大コンサウ

白山立山等ノ嶺上ニ生ス。草常種ヨリ小柄頭扁圓ニシテ缺刻鋸齒アル一大葉ソノ
 本ニ精様ノ小葉二三アツテ常種ノ大小葉相間スルト不同。質厚ク光澤アツテ毛
 茸ナク。萼并花莖ノ形色ハ常種ト同ジケレバ瓣稍大ニシテ柱未織細ニシテ鈎頭ナラ
 ズ試之ニ根氣味常種ニ劣シ



深山大

深山大ノ葉ハ味クナク大葉頭扁圓ニシテ
 缺刻ニシテ鋸齒アル一大葉ソノ本ニ精様
 小葉二三アツテ常種ノ大小葉相間スルト
 不同。質厚ク光澤アツテ毛茸ナク。萼并
 花莖ノ形色ハ常種ト同ジケレバ瓣稍大
 ニシテ柱未織細ニシテ鈎頭ナラズ試之
 ニ根氣味常種ニ劣シ



三葉一柄上ニ聚テ一葉ヲナシ。每葉大缺刻鋸齒アリ。葉剛フノ背柄共ニ微毛アリ。初葉ハ殆ドミツバセリノ如ク。心葉ハ缺刻差ヤ深シ。多葉一窠ニ簇生シ。冬ニ至テ不枯シテ微ク紫色ヲ帶フ。葉下幹ノ如ク根ノ如ク木様地上ニ立ツ。一ニ寸。春新葉ト共ニ數花莖ヲ生スル。五六寸。二三枝分シ三五ノ細小葉ヲツケ。每頭一花莖大小十葉委陵菜ウツクサ蛇莓等ノ類ノ如ク。花五瓣圓ノ深黄色。大ニ毛茛花ニ似アキノアザミ實礎圓尖織銳ノ多柱併接ノ柯子狀ヲナシ。多雄蕊等一ツヒテ黄葯。熟テ純黄ニシテ殆ト毛茛花ト同類ノ如クナレド。生殖部ニ在ツテハ其態ヲ異ニス。

所属未考



草木圖說前篇卷九



