

草木圖說前篇 草部

十三編

十

植

植物

二〇一八

學校 廊中 遊藝

植

三

470.3

537

Vol. 10

彦立校

報本圖說前篇卷十目錄  
中藥部  
印章第十三綱

第一目

ケシ

クサノオウ

同一种

チヤンバキク

ハス

ヒツジグサ

三葉升麻

大葉升麻

ヒナゲシ

ヤマブキサウ

ツサツ

ギンバイサウ

カハホ子

サラシナ升麻

イヌ升麻

トリアシ升麻

アカ升麻

ヤマブキ升麻

第三目

芍薬

カブトギク

レイジンサウ

クサレンゲ

第五目

オタマキ

ハウカゾウ

第七目

シリシサウ

節蘇

菊サキ一リンサウ

アハモリ升麻

チダケサシ

ヤブ芍薬

ハナツル

クサアジサイ

黄花オタマキ

セツブンサウ

ミスミサウ

五加葉黄連

フクジュサウ

カラマツサウ

ノガラマツ

モミヂカラマツ

同一种小葉者

同一种

タ、ラビ

キンバイサウ

ガシヤウサウ

ヲキナグサ

黄連

三葉黄連

キブ子ギク

ミヤマカラマツ

アキガラマツ

リウキンクワ

丑シコサウ

キツ子ノホタン

ヒキノカサ

オトコゼリ

一 草木部  
 二 草木部  
 三 草木部  
 四 草木部  
 五 草木部  
 六 草木部  
 七 草木部  
 八 草木部  
 九 草木部  
 十 草木部  
 十一 草木部  
 十二 草木部  
 十三 草木部  
 十四 草木部  
 十五 草木部  
 十六 草木部  
 十七 草木部  
 十八 草木部  
 十九 草木部  
 二十 草木部  
 二十一 草木部  
 二十二 草木部  
 二十三 草木部  
 二十四 草木部  
 二十五 草木部  
 二十六 草木部  
 二十七 草木部  
 二十八 草木部  
 二十九 草木部  
 三十 草木部  
 三十一 草木部  
 三十二 草木部  
 三十三 草木部  
 三十四 草木部  
 三十五 草木部  
 三十六 草木部  
 三十七 草木部  
 三十八 草木部  
 三十九 草木部  
 四十 草木部  
 四十一 草木部  
 四十二 草木部  
 四十三 草木部  
 四十四 草木部  
 四十五 草木部  
 四十六 草木部  
 四十七 草木部  
 四十八 草木部  
 四十九 草木部  
 五十 草木部  
 五十一 草木部  
 五十二 草木部  
 五十三 草木部  
 五十四 草木部  
 五十五 草木部  
 五十六 草木部  
 五十七 草木部  
 五十八 草木部  
 五十九 草木部  
 六十 草木部  
 六十一 草木部  
 六十二 草木部  
 六十三 草木部  
 六十四 草木部  
 六十五 草木部  
 六十六 草木部  
 六十七 草木部  
 六十八 草木部  
 六十九 草木部  
 七十 草木部  
 七十一 草木部  
 七十二 草木部  
 七十三 草木部  
 七十四 草木部  
 七十五 草木部  
 七十六 草木部  
 七十七 草木部  
 七十八 草木部  
 七十九 草木部  
 八十 草木部  
 八十一 草木部  
 八十二 草木部  
 八十三 草木部  
 八十四 草木部  
 八十五 草木部  
 八十六 草木部  
 八十七 草木部  
 八十八 草木部  
 八十九 草木部  
 九十 草木部  
 九十一 草木部  
 九十二 草木部  
 九十三 草木部  
 九十四 草木部  
 九十五 草木部  
 九十六 草木部  
 九十七 草木部  
 九十八 草木部  
 九十九 草木部  
 一百 草木部

草木圖說前篇卷十

大垣 愍齋 飯沼長順著



草部

第十三綱

多岐草 附子林

ポリアンドリヤ

*Polygonaria*

ケシ 罌子粟

人家多栽テ花ヲ實シ形状環ヨク通知ス。二苞アツテ花ヲ包ミ泡開テ苞脱ス。別ニ  
萼ナク。花大小四瓣子室罌ノ如ク頂ニ菊坐アリ。多雄蕊子株ニツキテ長筒アリ。未  
熟ノ子室ヲ割シテ阿片ヲ取ル。花色紅白粉紅紫。或ハ白質紅邊。或ハ紫質紅邊瓣頭  
或ハ圓ク。或ハ鋸齒。或ハ多瓣等。其種尤多シ今一々セズ。 主用諸書載之

第七種

パコケル

ソムミルユム

*Papaver somniferum*

罌

ムラー。フホル

*Herpelt.*

罌

大罌 罌子粟 罌子粟

草木圖考 罌子粟 卷十



ヒナゲシ

虞美人草

前条ノ一種草小ニテ微毛アリ花七美ナリ。瓣黄子室ノ形一般ニテ只大小アルヲモ此種花色右美ニテ玩愛スベシ。其花ノ種々アル衆ヨク通知ス故ニ略之

第五種

ルース

ルース

ルース

*populus rheas*

*Kollblom maunkop*



Vertical text on the left side of the page, likely a list of plant names or descriptions, written in a cursive style.

莖高一二尺。葉柔軟形略扇葉ニ似タル鈍頭缺刻アル七葉ヲ以テ一全葉ヲナス。中頭大ニ左右各三對。鱗様ニツキ本ニ至テ漸ク小。ツノ中莖ニツクノ処多クハ鱗ノツビキアツテ他ノ鱗様ト不同一種ノ異態ヲナス。面黄綠色暗帯白色ニノ微毛アリ。一莖數葉ヲ五生シ。葉腋枝ヲ出シ。梢ニ一二ノ細莖アツテ上ニ有梗ノ七八花ヲ攢簇ス。緞下鱗状ノ細莖アリ。花四瓣略菜花ノ如ク黄色。二葉ノ裏毛アル莖アツテ莖子ク。雌蕊角様。雄蕊二十四五花後一寸餘ノ莢ヲ結ビ。熟ノ子ノ飛ブ。鳳仙花子ノ如シ。莖葉斷之バ黄汁ヲ滴ス。多ク垣牆ノ間ニ生シ。四枝交々有葉。主用詳菜鏡

第一種

セリドニウム

*Chelidonium*

マニス

*major*

草

ゲノール

*geraniifolium*

ホルモロイテ

*chelidonium*

草



ヤマブキサウ 白屈菜一種

山麓陰地ニ生ス。高一尺許。葉卵圓披針狀ニシテ不齊ノ鋸齒アル。五葉ヲ以テ一結莢ヲ成シ。二三ノ大葉ヲ以テ一莖ヲナス。每葉腋一二花ヲ出ス。梗二寸許ニシテ無葉圓形ノ四群内ニカ、ヘ。大一寸餘。子室扁圓長角様。頭僅ニ開キ。内ニ細子ヲ收ム。多雄蕊林ニツヒテ圍之惣テ鮮黄色ニシテ。葉色尤深ク。恰モ楝棠花ノ如シ。故ニヤマブキサウ。又クサヤマブキ等ノ名アリ。莖葉ヲ切レハ黄汁ノ出味苦峻ナル。トホ前奈ト同シ。 附子室郭大圖

セリドニウム

*Chelidonium*

ヤボニクム

*Hyoscyamus*

春氏





前条一種

草状葉實前条種ト同シケレ氏。葉ニ深缺刻微細錯齒アツテ殆ト重結縁ヲナスノ  
 異アリ。花莖實状切テ黄汁ヲ出ス。等亦前条種ト同シ



Handwritten marginal notes in vertical columns, including characters like '中', '下', '上', and '一'.




ツナソ

イチヒ

黄麻

啓蒙尚麻ノ下形状ヲ詳説ス故略之。夏秋ノ際葉柄ノ側ヨリ一二分ノ莖ヲ生シ。三四枝分メ花ヲ開ク。萼ハ楕五片花五瓣。花倒蛋形ニメ頂ニ一缺アリ共ニ黄色。子室軸様瘡痕アリ。一柱ニメ結頭雄蕊二十餘ト休ニツキ。為深黄色。

所属未詳



本草綱目

七

本草綱目

チヤンバギク

タケニグサ

啓蒙博落廻ニ充テ草状ヲ詳ニス。故ニ畧之。秋莖稍枝ヲ生シ。多ク分又ノ穂ヲナシ  
 花ヲ攷ク。梗長二分許。花無萼披針状ノ二瓣ニメ。開ケバ即チ落テ。或ハ苞ナリ  
 多雄蕊ノミ遺ツテ。恰モカラマツサウノ花ノ如ク。莖葉白色。葯長ノ淡黄色ニメ。褐  
 白粉ヲ吐キ。雌蕊扁長角状。頭黄褐色。今附郭大一圖示辨形莖状略

所屬未詳



深山險地ニ生シ。莖高一二尺。葉有柄對生。葉頭岐シテ尖芒ノ如ク。邊緣不齊ノ缺刻  
 鋸齒アリ。面背共ニ糙澁。夏莖頭ニ圓形ノ苞四葉アツテ。中ニ四五梗ヲ以テ撒狀ヲ  
 ナシ。每梗二三花ヲ綴ル。萼鐘狀大抵六出。花六圓瓣ニメカ、へ瓣緣微ク外及シテ  
 白色。略茶花ノ如ク又梅花ノ如シ。子宮莖ニ成レ一柱頭圓長。數縱道アリ。雄蕊無數  
 弱淡黃白色ニノ塞心ス。又傍側ニハ白色紅暈アル圓尖三瓣相張テカク類ノ假花  
 ノ如キモノアツテ以テ一花体ニ代ルヲアリ。ツノ中心花ニアツテハ必ス然ルヲ  
 ナシ

所屬未考





ハスハチス 蓮

蓮ハ草ノ大小花色ノ  
種々。花頭ノ並列。実形  
ノ正圓ナル等ノ異種  
アリテ。亦邦玩花家ニハ  
殆ト數十百計ノ名  
ヲ下シ。又爛目花鏡  
所説亦頗ル多種ナレト  
具載ニ不暇。今只昔常ノ  
一種ヲ奉テ他ハヒ十略之。  
林氏書中亦花色ノ異ア  
ルヲ云フノミ

第四種

ニムシ  
*Nymphaea*  
手取草  
*Nelumbo* 蓮  
ハロウ  
*Benlunghende*  
*plumbea* 藍





五箇十...  
 八...

カハホ子 洋蓮草

水澤池邊ニ生ス。一葉形楕  
 圓ヲ更前アリ。夏秋ノ際葉  
 間茎ヲ抽ク。尺許。頂上一花。  
 黄色五瓣。二ノ無等。林氏ハ  
 辨リ。子室列子状ニ。堅  
 多雄莖形扁担ニ。外反シ。  
 淡黄粉ヲ吐ク。別ニ莖状ノ  
 密鱗二十許アツテ。雌莖下  
 ニ環列ス。共ニ黄色。此ノ花  
 辨ト。一種地色暗紅ナルアリ。密鱗大ニ  
 粗大ニ。結節アリ。根極深ヲ以テ。葉用トス。余未試其功。



...

第一種

ニハハ  
 花ニテア

gale planifolia

前

池清止水ノ中ニ生シ。根水底ニアツテ葉花水面ニ浮ブ。每葉每花各一茎。葉方ニノ  
 四葉。花大小十余辨。大抵自十至十五披針狀ニノ白色。實横軸圓柱短シテ齒頭。邊圓ニ細圓  
 ノ缺刺中心ニ一熟又全面ニ細點等アリ。雄蕊呈扁ニノ筒梯尖頭ニノ約ヲツク。數  
 三十餘重疊シ上者大下者漸ク小。又別ニ柱頭ヲ圓ミテ圓尖鱗狀無莖ヲ七八片ノ  
 竅鱗アリ。各本然大圖ヲ以テ其狀ヲ明ス。此花午後未牌ニ初テ開ク故ニヒツシグ  
 サノ名アリ。林氏云葉花ノ露水ハ清涼劑トシ花ノ搾汁ハ止血劑ニ用シ。又會  
 利別或浸油劑ハ軟和止痛ノ功アリ。

第二種

ニムハ

アルツ

羅

ウキツト

ブロムエン


蘭

*Nymphaea alba*

*Witt*

*plumpon*

按林氏所說並ニ阿須氏所圖等ヲ詳考ルニ。花辨ノ數吻合セザレドモ別種ト斷  
 スベキニハアラス。




五木全載  
 五木全載  
 五木全載





三葉升麻

一柄三叉每頭一葉形才ニモミチノ葉ノ如ク缺刻深ク最尖起鋸齒アリテ質頗ル  
 剛ク秋花莖長ク主チ本ニ二三枝ヲ合チ穂ヲナシテ花ヲ縹ルノ狀前条種ト同シ  
 夕無葇六弁白色ソノ弁形莢子實礎ノ狀但此種ノ實礎ハ夕バ一箇ヨリ花開テ年  
 先脱シ独多雄莢大抵四殘ツテ總狀ヲナスノフ等亦全ク同シ只彼ニ比スレバ花  
 候撒ニ早ク又無梗ニシ直ニ莖ニツキ花本ニ三箇ノ鱗形至細ノ葇狀ノ如キモノ  
 アルヲモルノ也 附雄莢子室郭大圖



Sanseki Shōma

三葉升麻

草状葉形略上条ト同フシテ只缺刻淺ク葉末尖鋭ナラズ美鈍ニシテ葉面ノ光澤有  
ツヨシツノ花俱形色ニ於テハ全ク同シ畢竟上条ノ一種葉状微ク異ナルモノニ  
カ、ル此他三葉升麻ノ類ニハ產地ニヨツテ葉形種々ナルモノアルヲ見レド余  
未ダ花形ヲ訂視セザルヲ以テ姑ク缺之

アキテア

ヤホニカ

*Atta*

*Japonica*

春五



一柄三葉々大ニノ蒂終ニ葉心ニ向ツテツキ。数尖起鋸齒アリテ質剛強ニシテ光澤アリ。枝股ニ暗紫色ノ帯ブ。秋前条種ト同肢ニ花アリ。花穂辨蓋子室等ノ形色全ク同シ

按己上三種ノ葉形ハサラシク升麻ト大ニ異ナレドモノ花候モ花蓋ノ形色殆ト同一様ニシテ  
イノチア  
列シテ下条ノ諸種ニ合ツ



トリアシ升麻 凡例

山中向陽ノ処ニ生ス。高二三尺一柄九枚ハ二十七小葉ヲ多ク  
 比サズニ升麻ノ如ク形指田ノノ無蓋程ヲ一夫長フノ更ニ細細  
 葉アリ。實陸ノ光緒仲夏ニ莖上ニ多数ニ分レ各々穂状ニ細花ヲ散附ス  
 葉即田五片花葉頭ニ縁ハ右細クノ細細。雄蕊十莖ニ實變度秋ニ  
 莖併接シ各頭延テ結リナス。花未開ノ間ハ淡綠色。開テ白色。花ニ黄  
 帯アリ。ササニ升麻ノ花ニ比シテ細小ニテ。莖葉ニ至テ毛茸脱ス。  
 根葉實變ト共ニ淡綠色ニ変ス。附 全北長安變度四倍間


按以下所載ノ升麻ノ類。ミナ五種ノ莖葉ハ二十葉ニノ  
 アサキア ノ四種ニ十葉ナレト細目同シカラサレ。而書中  
 別ニ百葉ノ考ヲ得テテラ以テ。若クニ列シ後日ノ訂正  
 願ス



卷之一  
 五木并流

アカ升麻

近山ニ多ク草大ナラズ高ニ尺許。茎脚又股等紅色ヲ帯ビ。一柯九枝大抵二十七小  
 葉ヲツケ。葉質剛強ナラズ形如條ノ葉ニ似仲夏前条種ヨリ是ヤ早ク花アリ。穂ノ  
 多枝ナル辨萼等ノ形色亦同ジケレモ。差小ニソ一二分ニ過ギス。アカ升麻ノ名ハ  
 伊吹山人ノ称ソノ根皮ノ帯赤色ナルニ取ルト云





アハモリサウ アハモリ升麻

此品數種アレ氏草ミナ小ニノ大ナルモノ高尺餘  
 小ナルモノ又ニ不及一柄三又各三葉ヲツケルアカ  
 升麻ノ如ク葉ハアカ升麻ヨリ小又花狭ク細長  
 ナル事ノ不同アレ氏ツノ質頗ル剛ク光澤アリ又  
 葉面ニ網様ノ白斑アルモノアリ其ニ五月 ツノ種ハヨ  
 ツナ草也  
 異リ多枝穂様ヲナシ花リ開ク五年十餘年  
 ニ柱ツノ状略アカ升麻ノ花ト同シ色ニ白アリ淡  
 紅アリ桃花色アリツノ大ニ葉状ニヨウテ種キノ  
 滋名アル概スルニ同一種類ナルヲ以テ今概ノ  
 之ヲコニ収ム



アハモリサウ

ヤマブキ升麻

山中ニ生シ草頗ル高ク三四尺ニ及ビ。葉差ヤ強ク居止重複一居止ノ中更ニ四五ヲ重複ニニテ色淺綠帶黄ニシテ光ナク。恰モ楮葉ノ如シ故ニツノ名ヲ得。五月ア  
 二十許実礎田夫ニ柱ニ分ル。惣テ白色ニシテ微黄褐ヲ帶フ。



一柄三並葉形細葉ノ升麻ノ如クノ不齊重複録畫アリ。茎剛強ニノ硬キ微毛アリ  
 テ升麻ノ類ト微、其態ヲ異ニシ。莖ヲ抽クト二三尺。夏ニ至テ短枝ヲ分チ各々穗状  
 ニ花ヲ綴ル。萼五片半披針状白色ニハ尖ニ一紅点アリ。花五弁形ヒ様ニハ瓜至テ  
 細ク。實礎長柯子状ニ箇併立シ。雄蕊十莖惣テ淡藤花色弱暗紫。又京師邊伊勢等ニ  
 ハ白花ヲ産ス。此種莖葉根形木様ニ升麻ノ類ト同ジカラザレシ。花葉ノ形升麻ニ異  
 ナラザルヲ以テ姑クソノ属中ニ收ム。 附全花郭大圖





園中多ク種植愛玩シテ草狀衆ヨク通知ス。其花ノ形色品種尤モ多クシテ每萃ニ  
 暇アラズ。萼大抵五片。扁圓或ハ葉狀ヲナシ。雄莖幾多ニ長葯邊縁黃粉ヲ吐ク。阿  
 氏物印氏等ノ所圖ノ葯形ハ、ミナ  
 田ノ本邦ノヒ楯ニノ長如ナラズ。子室指田ニノ大リ。每頭細柱ヲ戴キ。熟ノ開裂黒  
 子ヲ露ス。

二種  
*paonia* アノノヲ  
*anoneia* 羅

ラシキヤキヤトシ  
*officinalis peonie* 蘭

按林氏 *paonia* ノ下ニ種ヲ奉ク。ソノ  
 第一種ハ、草莖紫。第二種ハ家植種ニノ。  
 物印氏所圖ノ四種ナルモノハ、家植  
 種阿須氏所圖ハ山生ナルモノ、如シ。  
 二種草狀共異レシモ、氣味同シケレバ  
 功用尚トカシ。主用葉鏡戴之。



ヤマ芍薬

草芍薬

諸別深山ニ多ク。草家植ノ品ヨリハ差小。葉形微々四ツノ鋭ナラズ。花亦差小ニノ五  
 七弁。色タゞ紅白ニ種アルノミ。子室ニ或ハ三。雄英幾多ニノ長葯。実熟ノ開裂赤内  
 黒子。頗ル美ニシ。家植ノ品ト同シカラズ

第一種

ペラニア

*Paeonia*

*officinalis*

クソヒナリス

蘇

*generae*

クソヒナ

*ponae*

クソヒナ

蘭



諸別深山ニ多ク。草家植ノ品ヨリハ差小。葉形微々四ツノ鋭ナラズ。花亦差小ニノ五  
 七弁。色タゞ紅白ニ種アルノミ。子室ニ或ハ三。雄英幾多ニノ長葯。実熟ノ開裂赤内  
 黒子。頗ル美ニシ。家植ノ品ト同シカラズ

カブトギク

トリカブト

草烏頭

処々山中ニ自生シ。人家亦多ク栽テ花ヲ賞ス。苗高二四尺葉ヲ互生ス。形荒蔚ノ脚  
 葉ニ似テ厚ク深緑色ニシテ光アリ。秋茎梢枝ヲ分チ略穗状ヲナシテ花アリ。形伶人  
 ノ烏冠ニ似テ深碧色。ソノ花分ニハ五瓣。一ハ帽ヲナシ。ニハ翼ニハ裾ヲナシ。共ニ  
 兩葉ヲ擁ス。子室三箇角様。雄莖ノ茎ハ木扁薄ニシテ未細ノ曲リ。莖暗黒ニシテ白粉ヲ  
 吐ク。別ニ子室ノ本ヨリ出テ帽中ニ向テ立ツニノ鳥形ノ窠筒アリ。其状尤奇ニシ  
 他花アラザル也。彼鴨跖草ニアル一種ノ雄莖ノ如キモノト差ヤ類ヲ同フス。己上  
 此類ノ概標ニカ、ル。此品産地ニヨツテ茎ノ剛強軟弱葉形ノ些異花色ノ濃淡等  
 ニ不同アリ。我伊吹山中ニアルハ。茎強ク花梢葉間ニ攢リ穗様ヲナシ。北山ニアル  
 ハ。莖弱クノ莖葉間ニ花ヲ放クガ如シ。又莖尤弱ク長ク藤蔓ノ如ク葉腋ニモ多ク  
 花アリテ。色白又淡紫ナルアリ。コレヲハナカツラ又ハナヅルト云。又漢種ナルハ  
 葉岐淺ノ花淡紫色。己上ノ品種生殖部ニ於テハ三十一般。ソノ根ノ性功ニアツテ



或ハ不同アルカ余未タ之ヲ詳ニセザレ也。蝦夷ニテ毒箭ニ用ユルハ。葉缺刻深ク  
 分裂纖長ナルモノニシテ。一種缺刻不深形イタヤモミギノ葉ノ如キハ。ソノ用ニ不  
 堪ト云ニヨツテ之ヲ觀レバ。ソノ性ニ不同アルヲ斷然タリ。附一去辨典莖見子  
 室與窠筒本然圖。ニ雄莖郭大圖

第一種  
 アコニトニム  
 ナルルニス  
*Aconitum napellus*. 藍

第二種  
 ケメー子  
 モニクエカワペン  
*gemme manschkekyppen*. 蘭

按鐸氏林氏阿須氏所載ノ形状。我草烏頭ノ葉ノ缺刻深キモノニ的當シ。性功亦  
 同シ。然レニ春氏更ニ「アコニトニム」○ヤホニクニムノ名ヲ下モノ。或説アラシ。余未  
 詳其意。主用名物考雙葉前ノ下ニ載



レイジンサウ

牛扁

山中陰地ニ生シ。草狀高頭ノ如ニノ稍小。葉形亦相似レモ分裂尖細ナラズ。色淺緑  
 ニモ白斑アツテ滑ナラス。葉間茎ヲ抽ク高ニ尺許。葉ヲ互生シ。秋穂ヲナレテ  
 花アリ。形草烏頭花ニ似テ小ニノ帽細長。近道産ハ淡紫色。漢種並ニ木曾産ハ黄白  
 色。兩莖ノ形烏頭ト同シ。根亦相似テ小。阿須氏云。性功畧草烏頭ト同シ。火酒ニテ乾  
 葉ヲ丁裁制トシ痛風又腺ノ硬結ノ治ニ名香アリ。服量自一滴至十滴。又ソノ越幾  
 利ヲ「シキユータ」越幾利ニ和シ用テ腰痛ニ利アリ

第一種

アコトニム

リコトニム

カオトニム

モニトニム

*Aconitum* *luculentum*.

*Aconitum* *monifidum*.

按林氏亦此種ニ花色黄紫ノニアルヲヲ載ス

ナシ



クサアジサイ

クサガク

山陰樹下好テ卑湿ノ地ニ生ス。高二尺許。葉五生間ニ三葉ヲ相對スルモノヲ交ニ  
 形或短或長ノ。略桃葉ノ如クノ粗鋸齒アリ。莖葉共ニ微毛アリ。夏梢頭細画ヲ分チ  
 花アリ。圓長五瓣。子室半等ニ腋レ三柱ニ各結頭アリ。雄蕊二十許圓約。萼五夫。  
 別ニ二三ノ大瓣花ヲ交ユルコト。ゴガク<sup>アマキヤ</sup>土常山ノ類ノ如シ。即ソノ名ノヨツテアル  
 處也。花色白ノ微紅暈アリ


所屬未考



クサレンゲ      レンゲ升麻

駒ヶ嶽ニ産ス。葉一柄三極。各項三葉。每葉又三起。ニノ粗鋸齒アツテ略升麻ノ葉ノ如クナレ氏。質彼ノ如ク剛強ナラズ。高サ二尺許。夏葉間莖ヲ抽キ。高ク葉上ニ出數枝ニ分レ。針様細葉ヲ互生シ。每頂點頭一花ヲツク。大サ一寸餘。無萼ニノ瓣二重。外者大ニノ如圓十許。内者小ニノ橢圓十餘。即莖。槽即莖共ニ白質淡紫葷アリ。形カ、ヘテ蓮花ノ如シ。子宮角様三箇。瘦者。多雄。莖ニツキ七様ニノ葯淡黄色。

所屬未詳。蓋シ草状花形 *Aspidotria* ノ屬ニ可收モノ、如クナレ氏。雌莖ノ數ニ三ニモ。ヲダマキノ五ナルニ不同。若自生肥大ノモノニアツテハ。五雌莖ノ品或ハアラン。姑期後日之檢



ラダマキ

樓斗菜

草状枝莖啓蒙ニ載セ。魚亦通知。故ニ略之。花卵圓五瓣ニノ無葉。花頭歪邪殆ト點頭  
 シ。五葉アツテ卷回ス。即大瓣内ニアル五小瓣ノ一端ノ上ニ出ルモノニメ。密槽ト  
 ス。子室狭長五角或六角相環リ。頭尖鬚状ヲナシテ反捲シ一膜アツテソノ体ヲ包  
 ミ。上ニ幾多ノ雄莖長短順次シ。黄約ソノ体上ニ鱗列ス。花口純ニ開テ莖ソノ内ニ  
 藏ル。花色深碧或ハ紫或ハ淡黄等アリ。又全莖屈曲正直ナラザル一種アリ。コレヲ  
 ツルヲタマキト云。花葉異ナシ。西書中花色ノ種々アルヲ載レ氏。莖ノ撓曲スル  
 品アルヲ不言。阿須氏云。此草ハ禾様ノ微苦ナル惡味及酷烈ナル惡臭アリ。街  
 動排泄ノ能アツテ胆病痰癰ヲ治シ。殊其子ハ痘瘡麻疹ノ毒ヲ排泄ス。

第一種

アクニレギア

フユルガリス

雌

ゲノノ子

アケレエー

*Aquilegia vulgaris*

*scutellaria*

*geranium*

*akelyi*

節





黄花ヲタマキ

全形深碧色花ノ品ト略同シケレド。莖稍高ノ葉稍狭小。花淡黄色ニノ内瓣同様ナ  
レド。外瓣披針狀ニノ頗ル外及ヌ。兩莖ノ形全同也



全形深碧色花ノ品ト略同シケレド。莖稍高ノ葉稍狭小。花淡黄色ニノ内瓣同様ナ  
レド。外瓣披針狀ニノ頗ル外及ヌ。兩莖ノ形全同也

ハウカゾウ

種斗菜ノ一種。察捕嘴大辯下ニ屈シテ。上ニ不出モノナリ。多花ノ中ニハ。上ニ出ルモノ亦交ル。生殖部葉形等。常種ト異ナシ。故ニ略之。



Faint vertical text on the left side of the page, likely bleed-through from the reverse side of the paper.

根莖管ノ太サニノ淺ク地下ニ延長シテ結節アリ。莖高五七寸。一柄三極。每頂一葉  
ミツニ分シ。各深ク缺刻。狭長片鱗ヲナス。産地ニヨツテ裂片狭。極心一梗長二三寸。  
無萼ノ一花ヲ開ク。花ナルモノハ開ニ  
狀十數相聚リ。結頭淡黄色。多雄蕊擁之。藥亦淡黄。

第二十種

ア子モ子 子モサ  
*memora nemorosa* 節 *bochimirende amemore* 節  
ア子モ子 ア子モ子 又 アンデル ホス ハーネフウト  
*Pipilo amemore of arden bochi humulata* 鐸氏

按林氏、ア子モ子ノ概標ハ。花瓣六ヨリ九トスレバ。本条ノ五瓣ナルニ的當ナラ  
サレバ。一リン草中固リ多瓣ノ種アレバ。深クソノ數ニ泥ムベカラサル如ク。又  
所掲拳ノ二名ノ品。鐸氏阿須氏ノ圖ニ見ルニ。皆六瓣ニシテ草亦本条ヨリ差小ナ  
ル如ク。又物印滿所圖ハ花五弁或ハ六弁又重複等ニシテ色紅白黄ノ三種アリ西洋ニ多種

アルヲ以テ可見



菊ガキーリンサウ ルリー一花サウ

上余梅ガキノ品ト同属ニメ別種。葉彼ノ如ク缺刻不深。裂片亦鋭ナラズメ鋸齒ヲ  
ナス。丁圖ノ如シ。葉背淡紫色暈アリ。花ヲ出ス処ノ莖ニアツテハ。葉柄短フノ間ク。  
花瓣未伸ノ間ハ。色之テ苞ノ用ヲナス。花披針狀十瓣。色淡紫。兩莖ノ形一般異ナシ  
多武峯ニ産スル一種ハ草差小ニノ葉三ツニ分ル、ノ外缺刻ナク頗ル三角形ヲ  
ナシ。葉葉共ニ紫色ヲ帯花辦軟細ニメ二十許ナルアリ

テウエーデ  
*Telium*

ア子モ子  
*Anemone*

鐸氏

一花ニシテ葉ハ四角



三十三  
平木全成



幽谷樹陰ニ生。莖高三五寸。柄上四五葉輻次シ。每葉三五裂ニノ頭不有。中心短梗ヲ  
抽一花ヲ放ク。五瓣白色。略梅花ノ如クノ綴ニ條脈アリ。実瓊牛角状ニ三箇並置シ。  
雄蕊二十許林ニ出。葯淡藤花色。又雄蕊外ニ密槽八箇アツテ相圍ム。形漏斗ノ如ニ  
ノ頭殆、四裂。ゾノニハ小ニハ稍大ニ毎端滑沢黄色。此種全形略一リンサウノ如ニ  
ノ小。根ハ一リンサウト異ニシ。莖下長鬚根ヲ引キ末ニ一珠塊アリ。形零餘子ノ如  
メ外面黒褐裏白色。味微澁ニノ帶耳。一根一莖或ハ二莖ヲ出ス。ソノ葉芽寒ヲ冒シ  
早クメ花アリ。故ニ節々サウノ名ヲ得。附兩葉密槽部大圖

第十種

ア子モ子

ハルランニシ

*Anemone hortensis*

ア子モ子

ア子モ子

*Paebleige anemone*

*Anemone*

鐸氏

按林氏此種ノ形状詳説ナケレ。所引ノ鐸氏ニ可載葉形根状ノ圖本亦ニ不  
モノ、如ク。但花十二弁ニメ菊ザキナルト。ソノ兩葉ノ形状不詳トニ嫌アレ。此  
今此種ノ葉形根状他ノ一リンサウトハ一殊態アルヲニ於テハ同一般ナレバ。  
本条タトヒ正当ナラザルモ。ソノ一種タルモノ、如シ。猶俟後賢斷



啓蒙形状ヲ詳ニス故ニ畧之。雌莖如糸頂心ニ集束シ。雄莖普クソノ下ヲ圍ミ。莖黄  
 色。近世葉状花色ノ種々ナル品ヲ出ス。林氏亦ソノ多種ナルヲ云。可併見。今總一  
 異種ヲ附ス。他日ソノ異種ヲ集メテ諸書ニ較考セバ種名ノ詳ヲ得ン。往昔之ヲ有  
 毒ノ品トスレド。近時ソノ露水煎汁浸液等ヲ以テ頑固ノ諸病ニ大ニ適用スル  
 藥性論治驗書等ニ載ス可併見

第六種

ア子モ子

プニサナルラ

ゲノ子

ア子モ子

*Anemone*

*pulsatilla*

*gemma*

*anemone*

クニケンヤル

鐸氏

*Kiikyojikketsu*



ミスミサウ

深山陰地ニ生ス。一根叢生。每柄一葉。柄長三四寸ニノ軟毛アリ。葉三尖厚ノ深緑色  
 大サ寸許。早春數莖ヲ抽キ花アリ。ホ一莖一花。萼三片ニノ尖リ。花鈍收針狀ノ六七  
 或ハ八弁ニメ早葉菊花ノ如ク。中心尖礎每様ニ聚リ。多雄蕊擁之ス。ソノ葉尖ニ鈍  
 銳ノ二種アリ。銳者ヲ花戸イハスミサウニサウ。鈍者ヲスハマサウノ名ヲ稱シテ分之。銳者  
 ハ葉背紫色又雲母色アル等アレ下モ。花ニナ白メ黄葯。鈍者ハ花色不一。紅白紫翠  
 淡濃種々アツテ。葯色ホ一ナラズ。花後新葉出テ舊葉枯ル。根形杜衡ノ如クナレモ  
 香味ツノ類ト不同。林氏云。性温強壯ニメ肝ノ衰弱ヲ復シ。破傷漏精胸病等ニ稱  
 用ス。又ブールハーヘ云。梅毒團結其部衰弱ニヨルモノニ大利アリ。附一尖礎并  
 柱ニ雄蕊共邪大圖

第一種  
*Anemone*  
 第二種  
*Hepatica*  
 第三種  
*Celandine*  
 第四種  
*Hepatica*  
 第五種  
*Celandine*  
 第六種  
*Hepatica*  
 第七種  
*Celandine*  
 第八種  
*Hepatica*  
 第九種  
*Celandine*  
 第十種  
*Hepatica*



林

乙

甲



林  
 第一種  
 第二種  
 第三種  
 第四種  
 第五種  
 第六種  
 第七種  
 第八種  
 第九種  
 第十種



葉形大小種々ノ品アリ啓蒙具ニ載之可見此条河圖ハ菊葉ナルモノ又下条ニノ  
 ノ尤モ異ナルニ種ヲ擧ゲ他ハ畧之惣テ葉剛強ニノ鋸齒尖銳不有。經冬不凋早春五  
 六寸ノ花莖ヲ抽ク。莖下五六ノ鱗樣苞アリ。莖上數梗ヲ互生シ。每梗針樣一葉アツ  
 テ護之。各頭一花無萼ニノ五瓣或六披針狀。白色淡黄ヲ帶ブ。子室十許角樣ニノ三  
 稜。淡綠色ニノ尖ニ紫色ヲ帶。多雄莖約淡黄色。每莖間七枚ノ小瓣大抵十余アツテ。  
 形色花瓣ノ如シ。蓋シ蜜槽トス。花後小莢並ニ。熟シテ車輪ノ如ク。中ニ黄色ノ細子  
 ヲ収ム。草ニ大小アレバ。花形亦一般ナラズ。子室少キ者ハ四五。雄莖多キハ三十許。  
 又瘦小ナルハタゞ雄莖アツテ雌莖ヲ不具モノアリ。附 一花瓣 二蜜槽瓣  
 三子室 四雄莖 共三倍圖

按 ア子モ子 ノ属ニ可收レ在 西書中未見載此種


Ammonia



五加葉黃連

バイクワ黄連

五小葉輪次シテ一葉ヲナス。五加葉ノ如シ。故ニ五加葉黃連ノ俗稱アリ。又花卵  
 圓ニノ尖一凹アル五瓣略梅花ノ形アルヲ以テ梅花黃連ト稱ス。白色紅線有可  
 子室角様十箇相並ヒ。多雄蕊白葯。莖下ニヒ椽黄色ノ空罅五莖アリ。葉状花形殊異  
 ナレト。葉實根状黃連ニ不外。開花亦黃連ト時ヲ同フス。 附全花部大圖



三葉黃連 白山嶺上産  
白山富士等ノ高山ニ生ス。草小ニシテ五加葉黃連ノ如クノ。一柄上三葉ナルヲ以テ  
ソノ稱アリ。白山半腹ニアルハ葉稍大ニ。嶺上ニアルハ稍小ニシテ花稍圓五瓣殆  
五加葉黃連ノ花ト同クノ。葯ニ淡紅葦アリ。半腹ナルハ花辨狭ク披針狀ニシテ葯白  
色 附 一子室 二雄蕊 三蜜槽 共郭大圖



白山嶺上産  
白山富士等ノ高山ニ生ス。草小ニシテ五加葉黃連ノ如クノ。一柄上三葉ナルヲ以テ  
ソノ稱アリ。白山半腹ニアルハ葉稍大ニ。嶺上ニアルハ稍小ニシテ花稍圓五瓣殆  
五加葉黃連ノ花ト同クノ。葯ニ淡紅葦アリ。半腹ナルハ花辨狭ク披針狀ニシテ葯白  
色 附 一子室 二雄蕊 三蜜槽 共郭大圖

アクジユサウ 元日サウ 側金盞花

山中樹陰ニ生ス。早春葉ト共ニ花ヲ出シ。元日サウノ名アリテ科節ノ盆玩ニ供ス。茎脚根際三四ノ稜アツテ色之。大者高尺餘。小者三五寸ニノ花アリ葉再重錯楮ニノ互生シ。花紋ニ方ツテ葉未全伸織細難。柄本必スニ小葉アツテ挾之。茎頭枝梢ニ花アリ。萼五片形擔圓ニノ尖リ。一二ノ刺齒アリテ頗ル大ナリ。瓣大抵十二。往々十四五ニ及フモノアリ形卵圓ニノ長ク。初黃綠漸ニノ純黃。花心圓尖ノ多子室聚テ每狀ヲナシ。各頭延テ柱ヲナシ未結ニ又分ス。多雄蕊林ニ出。葯淡黃ニノ粉純黃色。実熟ノ各箇一子アリ。椒目ヨリ大ニノ鈎狀ノ一ハアリテ黒色。根ヲ用テ下劑トナス。

第三種

アドニス *Anemone nemoralis* *Anemone hepatica* *Anemone pulsatilla*



平林全成

キブ子ギク  
 シウメイギク  
 秋牡丹  
 処々山中ニ生ス。根葉長柄一蒂大抵三極ニメ三葉。殆ト牡丹葉ノ如クメ鋸齒アリ。  
 葉間莖ヲ抽ク一ニ尺餘。梢ニ二小葉ヲ對生シ。三五極ニ分レ。秋ニ至テ每頭一花ヲ  
 放ツ。形略菊花ノ如ク。卵圓披針狀重復二三。色淡紅紫。唯莖密被如球。色淡黃綠多雄  
 蕊伴ニツキ。蒴黃色。莢卵形五葉。

アタラゲ子

アホニカ

春氏



同種ノ葉ニ似テ根ノ形アリ  
 同一種ニ似テ根ノ形アリ  
 「本草綱目」ノ「蜀葵」ノ下ニ「蜀葵ノ葉」トアリ  
 「本草綱目」ノ「蜀葵」ノ下ニ「蜀葵ノ葉」トアリ



カラマツサウ

高山上吾伊吹能御山等亦自生ス。莖高三尺二起へ大抵ノカラマツサウニ同クシテ葉缺刻不深尖  
 頭鈍ニノ柄下必スニ圓扁ナル小托葉アリ。厚ノ淡白色。小柄台又ノ処モアリ。或ハ二或三。初夏ニ至テ梢上  
 分叉シテ花アリ。初メ苞アリ。開ニ至テ脱シテ。無葉無鱗又多雄莖ヲ以テ總狀ヲナス。其本細ク末粗。扁ニ  
 白色。莖長メ淡黄色。実礎麦粒状ニ長ク三脊稜アリ。体淡暗紫色ヲ帯ヒ。頭淡黄色。帽大抵十箇中ニ  
 聚リ立ツ。此種ハタノ白色ノミニノカラマツノ如キ黄色ナルモノナシ。或ハコレヲラシテ余未ダ見ズ。鐸氏也。此  
 品ニ *Melaleuca* *spicata* *Thunb.* 名ヲ下シ。阿須氏云根味苦甘テ滋潤ニ色黄ニノ大黃ノ性能アリ。以テ此ニ  
 代用スベク其量三倍ニ同功ヲ奏シ。大小便浸唾モ黄滯ス。煎服散用共ニ同シト又「アールハ」放泄内蔵  
 ヲ強壯ニスルノ主能ヲ證スルノ語アレバ。本条ノ性効凡ナラサルヲ可見。而余未試姑期他日。附西莖部大圖

第十種

*Melastema* *sp.* *Laburn.*

*Geelbloemig* *Thalictrum*

按林氏所説ハ。昔常ノカラマツサウニ的當ス。但主ト黄花ノ品ヲ撰キ。ヨゲールブルームニ黄花ノ莖  
 ノ名ヲ下セドモ。欽氏ノ白花ト云処ノ「ゴローア」タリクトルユムニ併セリヲ見レバ。花色ニ拘泥スベカラズ  
 「可見」又林氏欽氏共ニ大小種アルヲ載レバ。吾ノカラマツサウ。ミヤ「カラマツサウ」ノ種等亦ソノ  
 同一種ニ併スベキヲ因リ論ナシ。欽氏大小ニ種ノ圖ヲ奉ゲ阿須氏ハ黄花ノ「カラマツサウ」  
 ト同形ノ種ヲ圖ス亦可證



ミヤマカラマツ

深山溪間ニ生ス。高一二尺。莖細ノ剛ク。一柄三極。各極三葉。形牡丹葉ノ如ク。ノ三五ノ粗鋸齒アリ。ツノ大葉ナルハ。各極復テ三又ヲナシ。一莖ニ三柄ヲ五生或ハ對生シ。梢頭又分シ初夏ニ至テ開花ス。ツノ未開ヤ。卵圓四片苞アリ。ソノ苞尤大テ開合。故ニタマカラマツノ一名アリ。或開ニ至ル先。脱シテ不遺。子室五箇也。淡紅紫。本細ク未ハ様。尖頭ニ點鈍ニテ淡黃褐色粟紋アリ。即柱頭トヤ。ツノ初ノ花心ニ主チ。已ニメ四散シ。稍低下ニ雄莖ノ下ニアツテ。殆ト花瓣ノ形ノ如シ。多雄莖ツノ上ニ簇リ。形カラマツサウノ如ク。ツノ莖本細ク未粗ノ圓扁。頭ニ約アリ。惣テ白色。老テ約微黃ニ変スレト。開綻吐粉ノ状分明ナズ。此種全形カラマツサウノ如クナレト。ホニノ葉ノ分裂不細。子室ノ形狀位置大ニ不同。別ニ家ノ風アリ。他花ニ在テ稀ナル処トス。又產地ニヨリテ葉縁ノ鋸齒鈍ニシ。未開ノ花ハ淡紅紫色ヲ帯ルモノアリ。附 一雌莖 二雄莖 共非大圖

説詳カラマツサウ下



ノガラマツサウ


山麓原野ニ多クノ。カラマツサウノ深山ニ生スルト不同。故ニノガラマツサウノ  
 名アリ。初夏花アツテ。形状略カラマツサウト同ケレドモ。草長大莖ニ稜條アリ。小  
 葉ノ状。狭ノ長ク。カラマツサウノ三葉三箇ヲ以テ一葉ヲナスト不同。稍頭多  
 ク枝極ノ分チ。穗状ヲナシテ花ヲ放ク。雄蕊稍短ノ数亦少ク。大抵二十許。色ニ黄白  
 ノニ種アリ。黄ナルモノヲキカラマツサウト云。雌蕊四片形カラマツサウノ如シ  
 説詳カラマツサウ下



ノガラマツサウ



山野ニ生シノガラマツサウノ一種ニモ。晩夏初秋ノ際ニ花ヲ開クモノナリ。苞三  
 序。雄莖淡黄白色。萼淡黄色。一花大低十二三茎。雌莖ノ形。ガラマツサウノ如メ色淡  
 黄緑。頭淡白。大低ニ箇或ハ三ナルモ亦アリ。初夏花ヲ開ク処ノノガラマツサウヨ  
 リ莖数更ニ少シ。葉形ハカラマツサウノ如ク。三々相集ツテ一大葉ヲナス。カラマ  
 ツサウ。又ノガラマツサウノ下等併セ見ルベシ。附 一雄莖 二雌莖 共郭大圖



北地深山陰地ニ生ス。葉金剛葉ノ葉ノ如ク。深缺刻鋸齒アツテ。小ニノ葉ク。一柄一葉。モミチハグマ又遠州ハグマノ類ノ如クノ葉ナリ。夏葉間莖ヲ抽ク。高ニ尺餘。二三葉ヲ互生シ。梢上又分花ヲ綴ル。殆トカラマツサウノ如ク。苞有テ萼ナク。瓣ナク。雄蕊針状白色。蕊亦白色ニシテ淡黄白粉ヲ吐ク。子室麦粒状ニシテ頭微ク勾リ色淡緑。數十相聚テ楊梅ノ如シ。一種莖ニ紫色ヲ帯テ小葉ナルモノアリ。

所屬未詳



リウキンクハ

リウキンクハ。エンコサウハ。同一種ニノ。共ニ葉心蔵状ニノ。邊縁鋭齒アリ。一柄一葉。數葉簇生シ。根際花莖ヲ抽キ一ニ葉ヲ互生シニ三梗ヲ出シ。每頭一花。無萼ニシテ。瓣卵圓披針狀ニノ。黄色大低七瓣或ハ八九ツ交ユルアリ。ソノ多瓣ナルハ。稍狭細多雄蕊林ニ出。子室狭長角様。五七箇集束スルヲ。稜斗菜ノ子室ノ如シ。草ニ大。中。小。産。伊。越。等アリ。エンコサウハ。花莖不直ニ。地ニ就テ長ク根外ニ延テ。擡頭ノ花ヲツク大低。擡圓五瓣。リウキンクハノ如ク多瓣ナルニ至ラズ。

カルタ  
*Caltha palustris.*

雌

ムールアスシフ  
*monnina*

ゲールブルム  
*Gubbiom.*

蘭



卷之

三

五

卷之

三

四十八

五

小葉リウキンタハ

伊勢産ニノ高五六寸。花葉常種ト同フノタゞ小ナルノミ。前条下可保見



▲エシコサウ  
 形状リウキンクノ下ニ詳ニス西書中ニ  
 於テ別ニ此種ヲ載ラ未見



卷之十  
 三

草木

ムマノアシガタ 毛茛

山邊高地ノ溝畔路傍ニ多ク生ジ。キツ子ノボタンノ如ク。水郷湿地ニ多カラズ。一  
 柄一葉。大低。三五裂。每裂缺刻鋸齒アリ。深綠色ニノ紫斑或白斑アルアリ。春茎ヲ抽  
 ク。一ニ尺許。莖葉毛茸アリ。梢葉ハ狭細ニノ根葉ト異ナリ。梢上又分シ。有梗花ヲ放  
 ク。萼五葉花五瓣。形梅花ノ如ク大ニ。黄色ニノ光アリ。多雄莖莖短匕様。實礎扁ニシ  
 聚ツテ萼様ヲナシ。熟シテ揚梅ニ似テ小。一種白花ノモノアリ。花戸コレラギンホ  
 ウケ。黄花ナルヲキンホウケト名ク。一種千葉ノモノアリ。花梢小ニシテ恰モ小菊ノ  
 花ノ如シ。又白山ニハ一種矮生ノモノアリ。附 一實礎一片 二雄莖 共郭大

圖

第二十九種

ラヌクユルニス

ラマギノスニス

蘿

ウツルリダ

ラニニケル

*Samolus lanigolus*

*Abolige kamorbat*

蘭



キツ子ノボタシ

石龍芮一種

溝瀆水邊ニ多ク。往々水中ニホアリ。毛叢ヨリ柄粗ク。葉厚フノ毛ナクシテ。滑澤墨記。或ハ白斑アリ。莖亦粗フノ高カラズ。多ク枝ヲ分チ。花形毛叢ヨリ小ニメ瓣狭長。又石龍芮ヨリ大ニ。生殖部ニ於テハ。似類一般ニノ異ナシ。葉ヲ用テ腫泡シ治病ノ用アル。略荒菁膏ニ於ルガ如シ。

第二十八種

ラヌシクナルニス

アメリリス

羅

ヘルド

ハーチフット

苗

*Camotulus*

*atilis*

*Herod. Hermbut*

按林氏并鐸氏所説ノ葉狀。本条ト些異アル如クナレドモ。ソノ性力及葉上ニ點黒斑アル。等。全ク同シケレバ。断シテソノ名ヲ下ス。



キツ子ノボタシ

石龍芮一種

溝瀆水邊ニ多ク。往々水中ニホアリ。毛叢ヨリ柄粗ク。葉厚フメ毛ナクシテ。滑澤墨  
 記。或ハ白斑アリ。茎亦粗フメ高カラズ。多ク枝ヲ分チ。花形毛叢ヨリ小ニメ瓣狭長。  
 又石龍芮ヨリ大ニ。生殖部ニ於テハ。似類一般ニノ異ナシ。葉ヲ用テ護胎シ治病ノ  
 用アル。略荒菁膏ニ於ルガ如シ。

第二十八種

ラズンクニルニス

アメリリス

*Camostylus*

*actis.*

解

ニド

ハーチフット

指

按林氏并鐸氏所説ノ葉狀。本条ト此異アル如クナレドモ。ソノ性力及葉上ニ點  
 黒斑アル。等。全ク同シケレバ。断シテソノ名ヲ下ス。






上条一種

上条ノ一種ニノ葉狹尖花亦稍狭小ナルノミニニ他異ナシ。生处亦同シ。



水澤湿地ニ生レ。初生ハ扁圓ニシテ缺刻アル一葉ヲ長柄上ニツク。漸ク長ク葉ヲ起  
 ニ至レバ。狭長ニ裂缺刻アル三葉一蒂トナリ。末梢葉ニツテハ。無裂披針狀ノ狭  
 長三葉トナル。莖葉毛ナク。莖高五七寸。三五又分シ毎頭一花。五瓣黄色光澤アツテ  
 毛莖花ニ似テ稍小。頗美ナリ。生殖部ハ全同シフメタ。小。又東國ニハ重瓣ヲキツ  
 メナル品アリ

按上条ノ一種ニメ西書ニ於テ未見此種



タ、ラビ

石籠内

溝瀆水田中ニ生ス。葉毛莨菪<sup>ムシクマ</sup>ニ似テ毛ナク。光澤アリテ黄緑色ニノ厚ク。草状キツ子ノボタンノ如ク。花形ハ毛莨ノ如クメカ小。附全花部大圖

葉十五種

ラモンタユルニス

スビレラトニス

羅

ワートルーハー子アウナ

蘭

*Thymoides galuensis*

*Chamae-chamae*

エールステン

ウヰルデン

ハー子アウナ

鐸氏

*Mytilus*

*Mytilus*

*Mytilus*

按林氏形状ヲ説テ粗ナレバ鐸氏詳之宜併見





五十六  
草木全書



實亦小  
 山中ニ生ス。上条ノ一種ニモ。茎高二尺許。葉剪裁重錯様ヲナシ。花瓣上条ヨリ狭小。  
 實亦小  
 上条一種  
 鮮氏

ヲトコゼリ  
 上条一種

卷之十  
 十三  
 草木全書

伊吹白山等ニ産ス。葉五深刻アツテ殆五裂。每片不存ノ缺刻ヲナシ。各細尖鋸齒アリ。質厚クノ光澤アル。石龍芮ノ如ク。又缺刻鋸齒ノ状。變豆菜ニ似タリ。根葉有柄。葉心莖ヲ抽ク。二尺許。三四葉ヲ互生シ。葉本僅ニ莖ヲ包ム。夏梢葉腋枝ヲ出シ。每頂一花。無萼ニメ圓尖五瓣或七瓣。或重複スル。亦アリ。瓣綠或ハ黃様ニ裂ケ。内ニカ、ヘテ展開セズ。色深黃背淡ニメ綠單アリ。形略金絲梅花ノ如ク。ノ微大。大瓣内別ニ披針状ノ蜜槽瓣二十許アツテ雄蕊外ニ立チ。色淡黃純白。雄蕊無數。葯箕状。子室ヲ排ノ蜜槽瓣内ニ滿テ。殆花心ヲ塞ク。葯亦黃色淡黃白粉ヲ吐ク。實形石龍芮類ノ實ニ似テ稍異ニ。觸之ハ粘著ス。

ハリーチナート ノット ロンデ ホルウキセ ヴルティン 又ナール  
 Harnisch net senle Colby's Blumen. naber Ketsolde  
 ロンナル プルーション  
 Kott's Blumen.  
 鐸氏



草木圖説新編卷之十

草木圖說前篇卷十



慾齋飯沼先生著

草木圖說 全部凡四十冊

前帙草之部廿冊木之部十冊後帙草木之部

大日本平林莊藏板



製本所

尾州名古屋本町通七丁目

永樂屋東四郎



卷齋類部決主著

三部

江戸日本橋通一丁目

同 日本橋通二丁目

同 芝神明前

同 浅草茅町二丁目

同 横山町三丁目

大坂心齋橋通北久太郎町

同 心齋橋筋安土町

同 博労町

同 安堂寺町

同 南久太郎町

京都鉄屋町通姉小路上

同 三條通高倉東江入

問屋

書物

須原屋茂兵衛  
 山城屋佐兵衛  
 田田屋嘉七  
 須原屋伊八  
 和泉屋金右衛門  
 河内屋喜兵衛  
 河内屋和助  
 河内屋茂兵衛  
 秋田屋太右衛門  
 伊丹屋善兵衛  
 俵屋清兵衛  
 出雲寺文治郎

