

草木圖說前篇 草部

十五
十六
編

十二

植物

圖書

二〇一八

學校 縣中 滋賀

植

三

470.3

587

Vol 12

彦根
立中堂
校印章

草部
圖說前篇卷十二目錄

部

第十五綱 長短六雄黃

第一目 短角

ナツナ

イヌナツナ

第二目 長角

夕子ツケバナ

ジヤニンジン

スベシロサウ

夕チスベシロサウ

イヌガラシ

ダシバイウチハ

セルデレー

ミツタガラシ

ツルタガラシ

ユリワサビ

シロイヌナツナ

スカシタゴボウ

ヤマガラシ

ハタザホ

フサビロ

同一種

ヤウカクサウ

ダイコン

アブラナ

フランセコール

ヒノナ

ミヅナ

カラシ

エドナ

クヂラグサ

同一種

コシロンサウ

又一種

アラセイトウ

三月バ

トウナ

山東菜

スイダキナ

同一種

オホガラシ

チリメンナ



オランダナ

カブラ

第十六綱

雄莖上分下合為一體

第三目 十雄莖

ゲンノシヤウコ

白山フウロ

同一種

ヒノフウロ

第四目 自十二至十九雄莖

午時花

第五目 多雄莖

ギンセンクワ

ハボタン

菘藍

イブキフウロ

タチフウロ

グンナイフウロ

蘭種ワウロ

キンゴジクワ

フユアフヒ

ゼニアフヒ

夕チアフヒ

トロ、

同米利堅産

シラ子アフヒ

ワタ

イチビ

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

草木圖説前篇卷十二

大垣

愍齋

飯沼長順著



草部

第十五綱

四雄莖長
二雄莖短

Urtica pinnatifida

草木圖説前篇卷十二
大垣 愍齋 飯沼長順著
...

草状落葉詳之衆亦通知ス故ニ略之。萼四片花卵圓四瓣。子宮扁圓短柱。六雄蕊其四者長ク二者稍短シ。後扁莢ヲ結ブ三弦ノ撥ノ形ノ如シ。一種^{オホナツナ}薺ナルモノアリ。苗稍大ニメ莖葉共ニ微毛アリ。花實亦微大ナルノミ。故ニ別圖ヲ載セス。林氏録式共ニ生處ニヨツテ種々變態アルヲ云ヘバ。オホナツナノ如キモ其内ニ可收ト勿論トス。阿須氏云。此草味微洪瀉ニメ粘リアルヲ以テ。愈創劑ニ算シテ内外用トシ。又崩漏白帶下等ニ功アリ。而モ方今多不用。附金花郭大圖

第十種

タラズゴ

デニルナ

バエトリス

種

(オホナツナ)ニメ

フエドケルス

種

Chluspia burga pectoris.

herpystaschia dulcoris.

草木圖譜卷十二



グンバイウチハ

過藍菜

東國沙地ニ多ク自生ス。葉初ノ地ニ瑠シ。形雜兒腸葉ニ似テ長クノ味鋸齒アリ。春莖ヲ抽クコト尺餘。イヌナヅナノ如ク穂ヲナシ花ヲ開ク。花形莢狀薺ト趣ヲ同シフノ白色。後英ヲ結ブ。稍大ニノ扁圓中心凹ニノ單配ウチハノ形ノ如シ。阿須氏云。子ハ萌真ニメ芥子ノ味アリテ。凝血ヲ分解シ頭痛及他ノ聖京腐症ヲ治スルノ劑名アリ。然レモ多ク用ヒズ。

第二種

タラシビ

アムアムシ

アツケリダ

フエドケル

thlaspi

arhago

asthago

蘭

エールスチ

ウキル下


ナルスセ

lytle

alille

knige

舞



秋原野湯地ニ多ク子生シ。葉指圓ニメ味ニ鋸齒アリ。色淺綠ニメ纖毛茸アリ。春莖ヲ抽クト七八寸^{五寸}齊ヨリ瘠小。莖頂穂ヲナシ花ヲ開クト薺ト同シク。花形莢狀亦同。アノ辨黃色。子室卵圓ニメ扁。後莢ヲ結テ略米粒ノ形ノ如シ。吉田氏云。御嶽ノ岩戸ニイワナツナト云一種アリ。本条ノ類ニメ花小ニメ毛茸多シト。余未見

附 全花部大圖

中六種

Arabis muralis. 前
Arabis muralis. 前
Arabis muralis. 前
Arabis muralis. 前
Arabis muralis. 前
Arabis muralis. 前



此種ミト軸末ニノ音クセルゲレーノ名ヲ傳フ。按ニ此種ヲ拂郎察ニテ「セルゲ」
 三。英吉利ニテ「セルゲ」ト名クレバ。或ハソノ訛傳ナラン。八月下種。春ニ至テ高
 二尺許葉始轉様ヲナシ。胡荽ノ稍葉ノ如クメ互生シ。稍ニ至テハ狭長無歧。葉腹
 ク枝ヲ分チ。葉頭穂ヲナシ。白色十字形ノ細花ノ開ク。長短六味異ニメ。黃蘗子實局
 ニメ指圓。一柱結頭白色。實ハ過莖葉ノ實ノ如ク。味辛。莖葉ハ柔滑。味微辛。味及
 云。草ハ蔬菜トシ實ハ外用ニテ疥癬ヲ治シ。内服ニテ瘰癧頭ヲ排泄スルノ効アリ

附全花部大圖

第九種

Aspidium latifolium

種

Simulium pumilum

Simulium pumilum



碎芥薺

夕子ツケバナ

田畔湿地或ハ淺水ノ中ニ生ス。高五七寸。葉水芹又紫雲英等ノ葉ニ似テ末端一葉大ニノ或ハ缺刻或岬起。ソノ狀不一。稍葉ハ稍細ニノ或ハ尖ル。葉腋多ク枝ヲ含チ。稍頭有梗細碎花ヲ互生シ短穗ノ狀ニ綴ル。萼披針狀四片綠色微帶紫褐。花純頭披針狀四瓣。長ク未展開ノ白色。雄蕊短長六莖。白色ニノ葯淡黃。子室圓長淡綠ニノ頭白粉ヲ冠シ。後長角ヲナシ熟スレバ裂テ二片トナリ。一片ハ落チ。一片ハ存シテ草ト共ニ枯ル内ニ細子ヲ収ム楕圓ニノ扁。早春薺類諸品ニ先ツテ花アリ。又一種草尤小ニノ高四五寸。花葉同形ニノ小ナルモノアリ。イハタガラシイハナツナト云。其他種類頗ル多ク。葉狀ハ異ナレモ花形角狀一般其趣ヲ同シフス。主用藥鏡載

之附 一種子郭大圖 二兩莖 三倍圖

Sisymbrium irio 一種
Sisymbrium irio 二種
Sisymbrium irio 三種
Sisymbrium irio 四種
Sisymbrium irio 五種
Sisymbrium irio 六種
Sisymbrium irio 七種
Sisymbrium irio 八種
Sisymbrium irio 九種
Sisymbrium irio 十種
Sisymbrium irio 十一種
Sisymbrium irio 十二種
Sisymbrium irio 十三種
Sisymbrium irio 十四種
Sisymbrium irio 十五種



ミヅタガラシ

碎茶薺一種

摩田溝瀆淺水ノ中ニ生ス。夕子ツケバナヨリ晚ク。三月ニ至テ盛ニ花アリ。草狀夕
 子ツケバナノ如クナレド。稍大ニシテ多ク分叉セズ。莖直立高一尺許。正方ニシテ稜ア
 リ。葉亦夕子ツケバナノ如クニシテ稍ニ至テモツノ形ヲ変セズ。花同形ニシテ稍大ニシ
 可看。莖生殖部等惣テ異ナシ。味微辛ナルコト亦同シ。附除花辨見莖典兩莖郭大同

前条ノ一種西書中未見此種名



此種は其根が深く達するものなり
 花開くときはよく分枝するものなり
 花は白色なり

ジヤニンジン

溪間水邊ニ生シ。全体碎葉ニ相似テ枝ヲ分ツコト多ク。葉ノ刻缺細密。花形同シケ
レト稿小。莢細長。子黄赤色ニノ味辛

按 *Hydrocotyle* ノ族ニ外ナラザレトモ未詳種名阿須氏ノ *Hydrocotyle*

lophata ノ圓大ニ本条ノ如クナレトモ他書ヲ校考スレバ *lophata*

クチラケサノ的當ナルニシカザル如シ



此草は水邊に生ずる。葉は細かく刻みこまれて、花は小く、果は細長い。味は辛。此草は水邊に生ずる。葉は細かく刻みこまれて、花は小く、果は細長い。味は辛。

山中ニ生シ。茎細クノ柳一尺ニ餘リ。葉五生シ形ヨクナニ似テ薄ク粗鋸齒アリ。稍葉腋枝ヲ出シ珠穗ヲナシテ花アリ。開ニ至テ下ニ向ヒ白色四瓣。生殖部惣テタ子ツケバナノ如ク英亦同シ

按以下五種

Syllimbinum

或ハ *caeruleum*

ノ屬ニ可收品ノ如クナレ

此未得其決




Vertical text on the left side of the page, likely a title or reference text, partially obscured by the illustration frame.

スバシロサウ

山生夕子ツケバナ之一種

溪間ニ生スル小草ニノ高六七寸。細莖塌地根ヲ下シカブヲ分チテ擡頭シ。葉長ク
 許濶五六分指圓ニツ尖リ。邊緣三四ノ微鋸齒アリ。本少ク莖ヲ擁シ頂ニ五七花ヲ
 五生ス。四瓣白色形略コシロシサウノ如ク。萼兩葉ノ形夕子ツケバナノ類ト一般ニ種
 形略同シフシテ葉微大ニ花及テ微小ナルアリ



此草は山に生ずる。葉は長く、縁に鋸歯あり。花は頂生、五七輪あり。花は白色、四弁あり。葉は長く、縁に鋸歯あり。花は頂生、五七輪あり。花は白色、四弁あり。

ユリワサヒ

溪間樹陰進濕ノ処ニ生ス。小草垣地節々根ヲ下シ接頭四五寸。葉心臓狀ニノ散起
 アリテ互生大寸四五分。莖稍葉腋有梗花ヲ開ク。四年白色。長短六雄莖莖黃綠色。
 一柱長角。宿根ニノ葉根共ニ味辛シ


按タ子ツケバナ ス、シロサウノ族ナレ氏西書中未得種名



Vertical text on the left side of the page, including a page number '十五' and a title '草木部'.

夕チス、シロサウ

北勢四日市ノ東郭石海ノ田間ニ多ク生ス。形略イヌナツチノ如ク高一尺許。根葉ハ黄鶴菜ノ如ク綺様ノ缺刻ヲナシ。短毛茸アツテ微ク糙沙キ。葉尖リ紅葉ノ葉アリ。梢葉ハ狭小ニノ無缺無毛。質差厚ノ色帯白。略野灰菜ノ梢葉ノ如ク。梢上花アリ。萼四片花白色四年形。碎米薺花ノ如クノ稍大。ス、シロサウノ花ヨリ小。主根細部亦碎米薺ト一般異ナシ。



此ノ草ハ...

シロイヌナヅナ

田野ニ自主シ根葉場地シ形ヨメナノ如ク。二月莖ヲ抽ク。五六寸。二三葉ヲ互生シ枝ヲ分ツ。莖葉共ニ微毛アリ。每頂短穂花ヲツク。形小ニメ花萼共ニ萼花ト同ク。只子室長クメタ子ツケバナノ如ク。後葉ヲ結フホタ子ツケバナノ莖ト同ク。ナヅナイヌナヅナノ莖ト不同レバ。シロイヌナヅナノ名正當ナラズ。附金花並雨

莖部大圖



イヌガラシ

水芥菜

園圃荒地ニ普ク生シ。直根深ク地ニ入テ難除雜草ニシ。土ノ肥瘠ニヨツテ大小一ならず。肥大ナルハ
 高サ尺ニ餘リ。莖葉微糙淡アリ。葉互生シ。根葉卵圓披針狀ニシテ末粗大ニシテ鈍頭鋸齒ナク。梢葉尖銳不斉ノ鋸齒アリ。
 本ニヨツテ八深ク缺刻アリテ略蘿蔔又ハ芥ホノ葉ニ似タリ。故ニ種々ノ名アリ。梢上枝ヲ分チ花アリ。萼四片花
 四年黄色形碎。不齊ノ如ク。天子室莖狀亦同ク。爲黄色。後莢ヲ結テ。タ子ツケ。バナノ莢ヨリ太クメ微扁。根形
 味惣テ蘿蔔ニ似タリ。附全花部大圖

第三種

イヌガラシ

ナウミニスラフチ

ウァートルケルス

Sisymbrium amphibia var. *foliolobata* *abulensis*

ワートルケルスノ名水草種アリ此
屬ノ物名アリ草種各ナリ林氏等之

按西勃氏此名ヲ奉テスカシタホウト誤ス。林氏ノ書ノ圖ニ此条件下ニ三種ヲ奉ク。共ニ葉ノ缺刻鋸齒ノ状ヲ以テ分
 別スルノミナレバ。イヌガラシ。スカシタホウ。ノ二種ニナリ。種中ニ可取テ茹煎タリ。林氏奉ル処ノ三種中ノ第
 一ナル *moenan-rubra*。ハ。根葉缺刻深ク鋸齒ニ分レ。第二種ノ *abulensis*。ハ。根葉卵圓ヲ鋸齒
 ナシ。ハ。葉全裂セス只深ク缺刻ノ大尖高ツナス。第三種ノ *land-rubra*。ハ。根葉卵圓ヲ鋸齒
 ナリ。梢葉鋸齒ヲナシテ第一第二ノ二種ヲ混合シタルモノ。如クメ。第二種ヨリハ莖高フノ味尤辛熱ナリ。
 故ニ菜肆住々 *ppur kauli*。ノ代ニ用ニト云々。依之看之。本条ノ水芥菜ハ即チ第二種ノ *abulensis*。
 一ニ的當ス



スカシタゴボウ

風花菜

往々田間ニ生ス。草状イヌガラシノ如シテ葉ノ缺刻鋸齒深ク。本ヨリ末マテ鱗様
 ヲナス梢上花ヲ放ク萼花莖等ノ形色亦畧イヌガラシノ如クナレド。好テ正開セ
 ズ。後莢ヲ結フノ形亦同シ。附 一全花 二子室并雄蕊 三花瓣

説詳前条下蓋シ林氏ノ所謂第一種

ニイラス
 三イラス
 三イラス
 三イラス



説詳前条下蓋シ林氏ノ所謂第一種

ヤマガラシ ミヤマガラシ
 伊吹山上多ク生ス。根葉蒲公英トウキョウ又黃鶴菜オニツバキノ類ノ如ク。柄ニツタヒアツテ圓頭ニノ
 缺刻齒樣甚シカラズ。或ハツタヒナフシテ。殆ト沙參ノ根葉ノ如クナルアリ。春宿
 根ヨリ莖ヲ抽ク一ニ尺。莖ニ拐條アリテ葉ヲ互生ス。本僅ニ莖ヲ擁シテ。形油菜
 又艾葉ノ如シテ。小ニノ厚ク光澤アリ。不齊ノ鋸齒或ハ缺刻アリ。梢上多ク枝ヲ分
 チ穂ヲナシテ花ヲツク。萼四葉。花四瓣。惣テコンロンサウノ花ノ如ク。黄色。子室長
 角頭平直。雄黃短長六莖。莖莖黄色。後英ヲナス。前条ニ同シ。此種地ニヨツテ草ニ大
 小英ニ長短等ノ不同數種アリ。附全花部大圖

按前条ノ一種林氏所謂第三種

ラド ラデーヌ 手



クジラグサ

栞娘蒿

夏草ニノ高一二尺。葉細重鱗様ニノ淡綠色。三四月茎梢花ヲ簇生ス。萼四片披針狀。花四瓣本狹ク未大ニ匙様ニノ淡黄色。子室狹長角様結頭黄色。雄蕊長短六莖ニノ黄約。後長莖ヲ結ヒ黄赤褐色ノ多細子ヲ収ム。味辛熱微苦。阿須氏云。微臭アツテ味辛熱ニノ洪瀉。子ハ至細赤色ニノ性尤然リ。故ニ寒粘液ノ重積ニ起ル症ニ利アリ。赤痢虫症等ニ亦稱譽アレヒ。ソノ性ノ辛熱ニ危懼シテ。吾邦境ニ在ツテハ用ルル少シ。又外用シテ清潔愈創ノ功アリ。 附全花部大圖

第十八種

Silybum marianum L.

pink weed

譯氏并印葉圖可證



ハタザホ

南艾菜

葉中心臺ヲ抽キ直立二三尺。葉多ク莖ニツキノホツテ穂下マテニ至ル。モト又
 股ヲナシテ莖ヲ擁キ。邊縁三五ノ櫛夫起アレハ鋸齒ナク。梢上長ク穂ヲナシ花ヲ
 ヲク。長梗ニメ四年白色。瓣等生殖部ノ形碎米薺ノ如クノ英尤モ長シ。附全花部
 大圖

外一種

Carthamus glaberrimus

Carthamus tinctorius



草花図説
 卷之十二
 南艾菜

前条一種

草状前条種と同シクノ茎ニ葉ノワキ上ルル少ク。邊縁粗鋸齒アリテ茎ト共ニ毛茸アリテ花實ニ異ナシ

第一種

トニルナク

ハリスニク

ハリス

トニルナク

Hamatis, longata.

Hamatis, longata.

前



前条一種

草状前条種と同シクノ茎ニ葉ノワキ上ルル少ク。邊縁粗鋸齒アリテ茎ト共ニ毛茸アリテ花實ニ異ナシ

第一種

トニルナク

ハリスニク

ハリス

トニルナク

Hamatis, longata.

Hamatis, longata.

前

ワサビ

山菘菜

諸州深山溪澗ニ生ス。數葉簇生。形心裁狀ニノ尖リ大サ二三寸邊縁ニ不齊ノ微齒アリ。色黄緑ニメ故脈鮮明。春莖ヲ抽ク一尺許。梢頂長梗多花攢簇シテ粗穂ヲナス。葉四片花四弁楕圓ニメ白色。碎米薺花ニ似テ稍大。短長六雄蕊。一柱圓長ニメ少ク勾ル。後一寸許ノ莢ヲナシ内ニ細子ヲ収ム。根石菘蒲ノ如多節ニメ粗大。皮色淡青味辛辣。主用藥鏡詳之。附全花部大圖

第一種

コノレテリア ワツヒシナラヌ ダニール バーンホルム
Cochlearia officinalis Gravenhorst



コンロンサウ

樹下陰濕ノ地ニアリ。春宿根苗ヲ生シ高二尺許。葉波針狀ニノ鋸齒アルモ片或七片ヲ以テ一結葉ヲナシ。五七葉ヲ互生シ。梢上枝ヲ分チ。每頭有梗花ノ以テ短ナル珠穂ヲナス。花白色四瓣。形碎葉薄ト同ノ微大萼兩葉ノ形數亦一般。根ハ結節ヲナシ長クノゴ巻葉ノ根ノ如シ。林氏云。此草愈瘡ノ名アリ。又蒸餾水ヲ癩病ニ藥用ス。

第一種

Lactuca scopulina . 葉

キーケシララーナフ

scopolula . 葉

第二種

Lactuca bulbosa . 葉

キエタラーゲド

bulbosa . 葉

第三種

Lactuca pterophylla . 葉

キエースララーナフ

pterophylla . 葉

按林氏の上ノ三種ヲ悉クソノ第一ハ三葉一蒂。第二ハ由葉略楕圓葉一葉三。梢脚共ニ結核ヲナシ。葉脈ニ珠根ヲ生ルコト云本邦所産ニ大中小ノ三種アリ。大者ハ高さ二尺許。小者長クノ鋸齒尖銳。中者ハ莖短葉漸短ニノ鋸齒ヤ。鈍。葉脈ニ零余子ノ如キ珠ヲ生シ。小者莖葉葉小ニメ高ヤ尺ニ不及。三種共ニ花實根形ハ同ジケレバ。莖葉珠根ヲ生ルハ。只中ナル者ニアルヲ見ル。



上条一種 中者

說載上条下



說載上条下

又一種 小者

說載大葉者下



[Faint vertical text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

ヤウカクサウ

白花菜

海邊ニ自生ス。宿子地ニ在春ニ至テ生シ。圓莖ニメ微毛刺アツテ紫色ヲ帶フ。高サ一尺餘。肥タルハ二三尺ニ及ブ。葉五箇相聚リ。恰モ五加葉ノ如ク。而メ鋸齒ナク。梢ニ至テハ三箇ニメ山字ノ小葉トナル。七月小葉腋毎ニ一花梗ヲ出ス。五五六分。萼四片狭メ四開シ。花白色四瓣或ハ五瓣。八細フノ糸ノ如ク。末ヒ様ヲナシ。中心一鬚ヲ出ス。四五分。頭ニ兩莢ツツク。一心莢即扁長角様ニメ箇頭。雄莢細ノ長六七分。四五或ハ六七莖ニ及フ。葯黃褐色。

第三種

セシソメ (シカバネ)

Thlaspi pentaphyllum.

フキ (フキ)

Hesperis matronalis.

葉



卷之二

三十四

三十四

三十四

アラセイトウ

紫羅桐花

三年草ニノ茎頗ル木様ニ二尺ニ至ル。葉披針狀厚ノ柔軟緑白ノ織細毛茸アリ。多ク枝ヲ分チ每頭球穂ノ形ヲナシテ花アリ。萼狭長四片併接ノ筒様。花卽圓四瓣長爪ニメ開辰十字様ヲナシ。紫色ニメ頗ル美也。子室角様長短六雄蕊ニメ長為黄色。後長莢ヲナス。

第八種

セイヨウシロタネ

オシロイタ

花

セイロイタ

葉



此花種ハ新嘉坡ニ生シク多ク見ユ。葉狭長ノ花四弁ノ大者十ニ至ル。葉軟緑白ノ織細毛茸アリ。多ク枝ヲ分チ每頭球穂ノ形ヲナシテ花アリ。萼狭長四片併接ノ筒様。花卽圓四瓣長爪ニメ開辰十字様ヲナシ。紫色ニメ頗ル美也。子室角様長短六雄蕊ニメ長為黄色。後長莢ヲナス。

此花種ハ新嘉坡ニ生シク多ク見ユ。葉狭長ノ花四弁ノ大者十ニ至ル。葉軟緑白ノ織細毛茸アリ。多ク枝ヲ分チ每頭球穂ノ形ヲナシテ花アリ。萼狭長四片併接ノ筒様。花卽圓四瓣長爪ニメ開辰十字様ヲナシ。紫色ニメ頗ル美也。子室角様長短六雄蕊ニメ長為黄色。後長莢ヲナス。

四時ミナアリテ日用ノ常菜トナス。其種類ノ多キ不暇枚舉。啓蒙略載之可見。概ルニ葉蕪菁ニ似テ硬粗ニシテ細刺毛アリ。缺刻深ク中筋ニ及ビ殆ト蜻蝶ヲナス。似類ノ花ハミナ長梗アツテ萼披針狀四片。花指圓四弁十字様ヲナセ也。木柵ノ如キハ梗差短ク萼並ニテ放開セズ。弁爪細ノ長ク。色白質ニシテ淡紅暈アリ。間白色又紅暈深等アリ。兩莖ノ形亦大抵同ク。子室長角様ニシテ一丈柱ヲナレ。四ノ長雄莖角ヲ挟ミ。二ノ短者兩側ニ分レ。ワノ本ニ各一室腺アリ。林氏ハ油菜類ト同ク四腺アリト云今猶スルニ不然。英油菜類ト不同。圓長ニシテ尖リ。膨起ニ三ニシテ一様ナラス。子ハ油菜子ヨリ大ニシテ色黃赤又ツノ根ノ形色ニヨツテ些少ノ殊標ナキニアラス。假令ハ根色紫紅ナルハ莖ニ紅暈ヲ見。根色鮮紅ナルハ莖並ニ葉柄ノ上面ニ鮮紅暈アリ。根色暗黒ナルハ莖葉ノ毛茸少ク。梢ニ至テハ殆トナキガ如ク。又莖ニ往々暗黒斑点アルガ如シ。又尾州知多郡ノ海濱処々ニ一種自生ノ菜菔アリ。邦俗ハマ大根ト云。莖葉瘠小ニシテ家植



ノ如ク大ナラス。花紅暈更ニ深ク。根短ク味尤辛キト山生ノ子ズミ大根ノ如シ。林氏云。子ハ開達利尿ノ能アリ。然レモ單用スレバ時ニ吐ヲ起ストアリ。根ハソノ辛味ノ多寡ニヨツテ些異アレ也。消食機ヲ進メ胃ヲ健ニシ。瘰癧病及胸中粘液病ニ利アリ。就中搾汁ヲ最トス。又結石ノ治ニ名アリ。往々小兒ノキンキウーストニ利アリ。附 一花卉木然圖 二兩莖并腺一倍圖

第一種

ラハニス *ラチフニス* *タニメ* *ラデース*
raphanus latifolius 根 *tamanu radice* 根
 按林氏根色紅紫ト云。阿須氏紅色ニ圖スルモノハ。彼処ノ尋常種ノ然ルニヨルナラン。ソノ根色ニ種々アルトハ諸書載之





三月葉 三月コ美濃

秋下種シ。葉深缺刻懸
 結様ヲナシ。結、蘿蔔葉
 如クメ剛ク柄大筋共ニモア
 リ。春ニ至テ多葉叢生シ
 抹テ食料ト入根大根ノ
 如クメ小ニメ鬚毛多ク。未
 起莖ノ際ハ亦可食。未甘
 ニシ微苦。三月莖ヲ抽キテ
 枝ヲ出ス。此ニ抹テ塩漬ト
 シ食ス。味頗ル佳ナリ。花
 華莖狀管腹ノ軟葉。蘿蔔
 ニ同ク花白色又白管淡紅
 紫華ナルモアリ。莖蘿蔔
 葉ノ圓長ニメ尖リアリ
 同レクレハ。稍長クハ勝



起ノ數亦多シ。此種形狀蘿蔔ニ括佛タレハ。根ハニメ葉ヲ茂リ剛ノモアリ。莖脚ニ葉刺毛
 有リ以テ抹標トシ之稱號シテ花アルツ四月コト云。形同ノ葉稍剛クモ亦多シ。又最晚ノ一種ヲ三月コ
 ト云。此種ハ葉缺刻ナク長ノ柄ニ流シ。莖葉ニテ殆ト毛ナク。莖ヲ起スノ前ノ二種ヨリ少シシ。葉ヲ揉食シ
 日久クシキニ堪エト云。按 *Ap. heterophyllum* ノ類ナレハ西名未詳

根葉缺刻並ニ不齊ノ齒アリテ左大根ノ葉ノ如クナレ氏。葉滑ニシテ毛茸ナク。梢ニ至テハ缺刻ナク。タゞ不齊ノ齒様ヲナスノミ。葉披針狀ニシテ每葉四片展開。花倒置形ノ四年十字様ニ開キ。瓜頗ル長ノ黄色。子室長角様長短六雄蕊。長者ハ前後ニ二莖ツ。並ヒ。短者ハ兩側各一莖。又淡綠色ノ蜜腺短莖ト角トノ間ニ各一。又ニ長莖ノ間ニ各一ツ合ノ四箇アリ。 大根ノ六箇ナルト不同 凡ソ似類ノ花形、ナ如是ヲ以テ常套トス。莢大ニ如圖内ニ多細子ヲ收ム。根ハ蕪菁ノ長キ者ニ似テ小。冬春ノ際葉ヲ併セテ煮或醃藏シテ普ク食料トス。子ハ搾テ油ヲ製ス。本邦ノ燈油大抵此油ヲ用ユ。故ニアブラナノ種名アリ。一種莖不高シテ枝ヲ分ツト多キヲチヤボト云。地ニヨリテ此種ヲ裁テ子ヲ得ルト多ト云。又形本条ト同フシテ色淺キモノヲ。京ニテハタケナト稱シテ専ラ茹トス。其二別種ナリヤ。余未タ詳ニセズ。 附 一辨本然圖ニ兩莖一倍圖

第一種

Brassica orientalis 華 *Lebanische Kohl* 莖 春氏所定

按林氏所說形狀不密。且花色白ノ文アリ。ハ的當ナリ難ケレ氏。姑振春氏說。又林氏蕪菁ノ下所說ノ中ニ。根細長ニシテ莖人身ニ齊ク。實ツトツテ油トシテ用ニ供ス云々ノモノ或ハ此条ヲサスモノナラン可考

Brassica napobrassica, bracteata napoli 物類編

按圖說共ニ本条ニ的當ス



形状油菜ニ似テ稍大ニメ色淡ク。葉厚ノノ茹トナスニ尤柔滑ニメ味美ナリ。生殖
 諸部更ニ異ナクシテ子微大ナリ。此種西國ニハ任々之ヲ種レバ吾御遊ニ在テ遇漢種ヲ傳
 へ載ルモ。数羊ヲ経レバ油菜ト分別シ難ニ至ル。仰土地ノ性ニ因ルカ。尾州大高菜オホタカナ。吾州ノ
 イワタ菜。ホモ本条ニ類シ。其他ツノ類各地所在コレアリテ煮食腌蔵トスルニ油菜ニ勝
 ルハモノ多シ。共ニ他邦ニ移セハ其性ヲ轉ルル亦菘ニ於ルカ如シ

按別ニ此種ノ西名ヲ詳ニセズ前条下所載ノ西名
 共ニ此種ヲ混稱スベキモノナラン



此種海陽ヨリ傳ル思フニ船末種ナリ西書中ニ於テ余未ダ此種名ヲ詳ニセシ
 秋油菜ト同取ニテ種ニ華大棘刺ヲクテ頗ル霜様ナリ天根葉ニ似テ遠縁微尖起ルニ
 三鋸齒狀ヲナシス實葉キテ結莢ニ格ナリ葉更和リ色帯白根ハ大根ナリ小春葉ヲ起
 スキ高ク枝ヲ多ク油葉ヨリ味ニ稍葉莖ヲ乾シ花葉蜜腺ノ形數ホシ油蒸ニ
 同ク此種精肥大ニ黄色花深ク英小形殆ト圓クナリ納ルニナリ



嘉永年間船中。余未詳産處。山東菜ノ名亦未知其出處。秋下種油菜ト同時ニ花ノリ
 全形油菜ト同シレド。根葉圓頭潤短ニシテ。邊縁缺刻齒尖トク。梢ニ至テモ油菜ニ比
 ノレバ潤短ニシテ。惣テ淡黄緑色。花色莢形蜜腺ノ状等ニ於テハ。殆ト油菜ト同シ。但
 子室稍大ニシテ。雄莢ノ上ニ出。頭短クノ油菜ノ長ガ如ナラズ。又莢潤短ニシテ。厚ク五
 中ニ一道ヲナシテ。扁方ナルガ如ク。柱粗クノ不尖等ノ珠標アリ

西書中未考種名





アカナ 近江ナ 紫菜
 葉油菜ニ似テ稍長ク。大筋紅紫色ヲ帶ク。根圓シ五
 六寸長六七寸ニテ色紫赤ニ美ナリ。花莢綠葉油莖ト
 同シケンニ弁楕圓シ。江州日野ノ名産故日野菜ト稱
 シ。用テ齋トシテ名アリ

本草綱目 卷之十二 平林桂藏

本草綱目 卷之十二 平林桂藏

スイグキ菜

梵菜

城州加茂ノ邊多ク栽エ。専ラ齋トス。根葉油菜ノ水菜トノ間ナルモノ、如ク。稍葉ニ於テハ缺刻愈深シ。根並ニ花莖等、腺等ノ形色油菜ニ同レ。




ミヅナ 水菜
 葉油菜葉ニ似テ瘦小。缺刻深ノ尖鋭不齊。一根數百葉ヲ簇生シ。莖間數莖ヲ抽キ花
 ナ開ク。萼葉ノ形油菜ト同ク。花瓣稍狭小。花ニ似テ微大。莢細マシ小頗ル圓ノ油
 菜莢ノ扁ナルガ如クナラズ。柱頭尖ル。此種吾郷邊善ク栽ルモノニ。京俗コレ
 フセシス。チト稱ス。又葉缺刻少ク柄白クメ菜ニ。味厚キモノヲ生ノ名産トス。故
 ニ京ニテミヅナノ稱アリテ之ヲ貴フ。又上冬ノ如クメ菜尖圓キモノヲマシル葉ト
 云フ。

西書中ニ未考此種名



秋下種。水菜ノ如ク。缺刻深クレ。ハ。剪截彼ノ如ク。狭細ナラズ。且柄彼ノ長ニ不及。
 叢生ス。ト。亦彼カ如ク。不多。春莖ヲ起ス。ト。少ク。晚シ。故ニ水菜ニ次テ。食料トナス。
 味水菜ノ如ク。ニ。微苦。辛ナレ。ハ。大葉。莖ノ如キ。臭味ナレ。花油菜ヨリ。微ク。小ニ
 ノ。水菜花ノ。瓣。狭キガ。如ク。ナラズ。莢亦略同シケレ。ハ。微粗メ。短シ。京俗之ヲ。水菜ノ
 一種ニ。ノ。ワ。ノ。ヲ。ク。テ。ト。稱ス。此種各地種々ノ。名ヲ。下シテ。一定ナラズ。吾郷之ヲ。イ
 マナト云。ツ。初ノ。伊勢ヨリ。傳フ。ニ。因ル。蓋シ。モ。ツ。ナ。ノ。一。種。粗。大。ナル。モ。ノ。ニ。係ル



品種多シ。吾邦吾ク栽ルモノハ。莖高四五尺。葉油菜葉ニ似テ微厚硬。故刻鋸齒尖銳。本ニテソテハ略楕圓ニ分裂シ。蘿蔔葉ノ態アリテ毛ナク。柄稍長シ。花油菜花ヨリハ瘦小ニシ。萼鮮黄ノ形色。葉腺等ミナ油菜ニ同シテ。莖葉共ニ味辛シ。莢扁ナルハ油菜葉ノ如クシ。右扁ニシテ柱梗共ニ短シ。實ニ黑白ノ二種アリ。花葉ノ形ニ於テハ別ナクノ。黒キモノハ只莖柄ニ紫暈ヲ帯ヒ。且葉ノ辛味少シ。

シナヒス *Sinapis japonica* 春菜

林氏 *Sinapis* 種 *sinensis* 莫スナド

ノ於テハ芥ノ同屬タル分明ナシ。モト本邦所産ノ芥ト形状不同シテ。的當ノ種ヲ認得ズ。故ニ已下芥類ミナ西名ヲ缺。姑俟後賢之考。



葉大ニノ剛ク。周邊不齊ノ鋸齒アリ。多クハ鈍頭。莖高三四尺。春莖葉ヲトリ食フ。故
 ニカキナ又夕カナノ名アリ。味辛ク煮ンハ臭氣アリ常芥ニ決テ花アリ。形同フニ
 テ更ニ小。莢亦微小一種莖葉ノ形略同フノ。缺刻鋸齒大鋭ニノ暗紫葎ヲ帶フモノ
 アリ。辛味稍微ナリ





吾邦俗載エトナ大芥ヲ月山ガ如クス莖葉大
 芥ト略同シタレ凡根葉ハ稍潤大ニノ尖
 ラズ。邊緣缺刻不齊或ハ正葉或ハ鋸齒
 状ヲナシ。ソノ尖亦不鋭。質厚ノ嫩軟。花
 莢ノ状相同ク。辛味尤微ナリ。此種或
 ハ菘ノ如クナレ凡花形芥ト同ク。味
 亦微辛ナレバ亦大芥ノ一種トス。炭
 大芥莢ト同形ニ夕更ニ狭小。

チリメンナ

シユンフラン

花芥

芥ノ一種ニシテ莖高ク立チ棘ニ枝ヲ分ツト芥ト同シ。根葉ハ邊縁缺編細碎缺刻アリテ殆ト不可筆。莖ニツク稍葉ハ上ルニ徒テ漸ク缺刻少ク。梢ニ至テハ常種ト全ク同シ。味辛ク。花常種ニ比スレバ瓣微潤ク。莢ハ常種ノ芥莢ヨリ大ニ小。大葉芥莢ヨリハ狭クメ扁ナルト。破ノ如ク甚シカラズ。殆ト油菜ノ莢ノ狭小トルモノ、如シテ莢製物取テ青黄ハ五葉葉ハ葉面





オランダナ 三年菜 女錦菜

秋下種シ。春ニ至テ茎ヲ抽キ。葉ヲ散布ス。形松葉ヨリ短シ。色淡緑ニ帯白。質厚シ。硬シ。邊縁不齊。起頭ノ花缺刻ヲトキ。木ニ三寸ノ柄ヲチセ。又ニ小序葉ノ柄ニ流テツクアリ。冬ニ至テ幹殆ト木様ヲナシ。高ニ二尺ニ及ビ。梢頭多葉聚リ。唇々相抱キ。重リテ結ノ如ク。春ニ至テ葉生開基ヲ抽テ。梢頭枝上共ニ花ヲツク。ソノ枝梢ニツク葉ハ。缺刻皺縮シテ。脚葉ト大ニ不同。花油菜ヨリサテ。晩テ開ク。



形甚大ニシテ淡黄色。生熟諸部油菜ト一般。莢細長殆ト圓ヲ。粒狀ノ脚起尤著明。幹草結年久。塊ナク。天候空然ルニアラス。實熱スレバ。葉根枯レテ。常トス。故ニ三年菜ノ稱アリ。若シ花後早ク梢頭ヲ切去レバ。則チ新芽ヲ生ノ又榮テ。又ソノ新芽ヲ取テ。汁搾スレバ。ヨク生活。百病考ニ。コレヲ。葉菜ノ兩品トス。余ハ未ク。葉菜ナラフ。不見。

按鐸氏 *white kaul*, *cabbyls-kaul*, *of slige kaul* ニノ林氏
 第七種 *stajeda oltroca*. 羅 *marokaul*. 葡 即莖幹ヲナスノ下ニ細説ス
white kaul. ナルモノの當ヌ

ハボタシ 香芥藍 香牡丹

上各ノ一種ニメ。草状略同シケレバ葉脈赤ク。莖紅紫色輩アリ。冬ニ至レバ葉亦紫
 色ヲ帯テ重葉牡丹ノ如ク頗可觀。春莖梢枝ヲ分チ花ヲ開クノ形亦同シ。只梢葉ノ
 缺刻彼ノ如ク甚シカラザル如シ。莢ノ皮厚ク大根ノ莢ノ如ク。實油菜ヨリ大ニシ
 離隔一列ス。

ローラ スロイト ヌーレ 又 ローランドス
 按鐸氏ノ *rode Jacq's Kerle* of *weibens* . . . 林氏第七種 (説文)
rode ナルモノニ的當ス又物印滿ノ *Engelia capitata purpurea* at
alba ナルモノ亦同シ





カブツ 燕膏

根ニ圓アリ。長アリ。扁アリ。又大小アリ。色ニ紅白アリ。等般ヲツ通知シ
 啓蒙詳之故ニ子細ニ及。概々ニ昔油菜ニ似テ。做大根葉ニアリ。トモ
 大缺刻ナラ。不存ノ葉ナク。枝ヲ分ク。形々皆異アリテ。根色紅キ者。莖
 紅色。帶ル。ワレ花莖ノ形數ニテ。テハ油菜ト異。ワレ不見。今ハ圓根種
 二種ナリ。製ス。

カブツ 燕膏 惣名

カブツ 燕膏 惣名

カブツ 燕膏 惣名



此種

漢種ニメ和産ナシ。八月下種。脚葉卵圓披針狀。稍ニ至テハ葉本稍濶メサク股ヲナシテ莖ヲ擁ス。葉類ノ如クメ厚ク柔軟。メ帯白綠色。春莖ヲ抽ク。一ニ三尺。枝ヲ分チ黄花ヲ綴ル。花ノ如ニメ小。大サ三分許。萼楕圓四片。花鈍頭披針狀。四葉。爪細ク頗ル展開シ。花心ニ立テ以テ花托トソノ態ヲ異ニス。子室扁ニメ。莖類ノ長ガ如クナズ。雄莖長短六莖。梗細ノ長ク。花葉ニ從テ漸ク垂下シ。後偏長莖ヲ結ビ内一扁子ヲ収ム。西洋諸國ニ於テ此草ヲ以テ一種ノ莖液ヲ製シ。滌彩ノ用トナス。一諸書多ク載之。又黃疸閉塞病ニ稱用シ。又収斂清潔愈創ノ用ニ外用ス。附

室那大圖

第一種

イサナ

クニエ

gatta tinctoria 雜 *genurus vellei*

Tamaris vulgaris 雜



雄莖上分下
合為一體

monadelphica

第三目
十雄莖

ゲンノシヤウコ

牝牛兒屬

山野路旁ニ多ク。草地ニ塌シテ直立セズ。地々擡頭ス。普クフウロサウト称ルノ品。大低管然リ。此種ハ。フウロサウノ偏地普ク生シ。古人痲疾ニ用テ現功アルノ莖ニヨツテ。ゲンノシヤウコノ名ヲ下スト云。葉五或ハ三ノ大缺刻アツテ。殆ト五裂三裂ノ如ニ。粗鋸齒アツテ五生シ。莖葉共ニ微々纖毛アリ。葉腋枝ヲ出シ。梢上ニ梗相對シ。花アリ。萼披針狀五葉。花卵圓五瓣。色水紅ニ。五ノ淡紫條アリ。子室五箇相併接シ。抹ノ外側ニ五箇ノ蜜腺アリ。柱亦五ナレ併接一ノ角様ヲナシ。稜條ニ白毛アリ。頭五裂ニ。淡紫色。雄莖十莖。脚下ニ在ツテハ併合一體ヲナシ。且ソノ五者内ニ位ノ長ク。五者ハ外ニアツテ短ク。約丁字様紫色ニ。淡黃白粉ヲ出。角熟ノ五裂シ。各裂一子アリ。此草種類頗ル多シ。今僅ニ萃十許種

ガラニム

geraniaceae

屬

geranium

薔

林氏此種ヲ萃ル一甚夕多ク。本類二十九。草類ニ四十七。合テ六十六種。又ソノ草

類ヲ大別シテ五トス。曰甲。莖對生有藥雄莖六莖者。曰乙。莖花樣ニ有藥雄莖五莖ニ。莖五片。實下ニ曲ル者。此類多ハ。曰丙。葉毛莖樣ニ。有藥雄莖十莖。花梗相對者。此類有根。曰丁。莖ニ有藥雄莖十莖。花梗相對者。曰戊。花梗草一。有藥雄莖十莖者。等ナリ。本条ノ如キハ。ソノ丙類タルニ勿論ナレ。未夕的當ノ種名ヲ考ヘズ



伊吹山ニ多ク生ス。葉缺刻深クシテ殆ト五裂。每裂細尖鋸齒ナリ。梢上ニ花ナレド。
 一花大ニ晩レテ開キ。花瓣頭三起アツラ山字ノ形ノ如ク。色粉紅ニシテ紅脈ナリ。生
 殖諸部上条ト一般

第四十七種

ゲフニユム
Gernium *Arvum*, 華
 ケニトリーパー
Glycerhiza *cyrenkambata*, 華
 ヲエーニアーレスベツク

ゲフニユム
 ケニトリーパー
 ヲエーニアーレスベツク



白山紅花フウロ

此種イブキフウロト大抵同形。但葉ノ鋸刻少ク深ク。花瓣圓頭ニノ尖起ナク。色淡紅白質ニノ紅底鮮明。異アリ。生殖諸部ハ一般。

第五十種

ゲキニム


ツラチンセ

コエシキフ

エーナフーヒエノソク

Quercus petraea 羅

Quercus agrifolia 蘭 印葉圖可併



夕チフウロノ名アレヒ。全草直立スルニアラス。他種ニ比スレバ茎長大ニメソノ
擡起一二尺ニ及ブ。根葉ハ五尖起ヲ交ヘ。梢葉ハ多クハ三起。花莖ノ形ダシノシヤ
ウコニ同フノ。色淡紅紫ヲ常トス

按第四十八種ノ

セラニユム

Geranium phaeotrichum

シルフアナクユム

畢


bojokijobofuif

ホシフ

Geranium atropurpureum

蘭ノ珠標ノ形状尤本条ニ的當ス。只花弁外及ノ一事ノ賢ヲ

アレヒ。本条ノ極白花ノ品ニアツテハ。花點頭弁外及ナレバ。異トスルニ足ラザ
ルカ



前条一種

前条ノ一種ニノ花點頭シ開キ。弁微ヤ外及シテ白色



グンナイフウロ

葉生葉ゲンノシヤウコニ似テ大ニメ鋸齒アリ。莖葉共ニ纖毛アツテ茸々。莖ヲ
抽ク一ニ尺葉ヲ互生シ。五月梢頭ニ四五細莖ヲ出シ。每梗二三或ハ四五花ヲ開
ク。萼五片。花圍尖五弁淡藤花色。子宮參粒状ニノ線稜アリ。頸一柱ヲナシ頭五裂ニ
ノ暗紫色。雄蕊十室約暗紫ニノ黄粉ヲ吐ク。伊吹山多産ス。東國所産ノ品ハ。形同
ノ花色更ニ深シ

ガラニユム

按ニ林氏 *Geranium* ノD符ノ下ニ可奉ノ品中。近似ノ數種アレ氏尙
品アラザル如シ。宜ク後考スベシ



ヒノフウロ

シホヤキサウ

槌牛兜

伊吹山上硫磺ノ処ニ生ス。夏草ニノ高尺許。葉略重複鱗様ノ如クナル。セントウ
 サウ或ハ細葉黃連ノ如クノ小。淺黄綠色ニノ紅色ヲ帯ビ。莖ニアツテハ殆ト紅。莖
 葉柄ミナ纖刺毛アリ。葉腋細莖ヲ出シ。頂又ヲナシテ花アリ。萼披針狀五葉。花七様
 五瓣色淡紅。或ハ白色子室軸圓五縱道アリ。一柱頭五裂。雄蕊十茎。葯紫褐ニノ黄粉
 ヲ吐ク阿須氏云。此種ノ莖布敷劑ハ。内外創傷ノ良薬トナリ。又小便ヲ利シ腫瘍ヲ
 消散ス。又水ニ煎シ火酒ニ浸シテ唇及乳頭ノ破裂ヲ治シ。又出血ヲ止ム。或云亦ヨ
 ク瘰癧病瘡瘡ホヲ治ス。附 一雄莖 二子室并柱郭大圖

第三十五種

アラニユム

ロベリチアテム

galeum tomentosum. 羅

Robustellus. 蘭

ロブレソフ

ロロイトム

ゲトデソールト

エエーアールス

robustus - fragilis, Umbelliferum japonicum. 羅



洋船載来未久ト云。夏草ニノ葉缺刻菊葉ノ如クノ小ナル十許ヲ以テ繖様ヲナシ。
 莖生間春莖ヲ抽ク。尺許。亦数葉ヲ對生ス。莖葉共ニ不可筆織細毛アリ。葉腋花莖
 フ出ス。五六寸。頂ニ寸許ノ五枚ヲ撒状ニ分ツ。撒下葉末共ニ膜様ノ苞アリ。每梗
 一花。萼披針状五片。花卵圓披針状ノ五年。大サ四五分。淡紅紫色。每花中一側ニ汚症
 ノ二年ハ。爪上ニ白點アリ。他ノ三年ハ白點ナレ。子室柯子状ニノ五枚ノツテ頭一
 柱ヲナシ。頭五裂ニメ反シ。雄蕊五莖。丁字様ニノ暗紫色。黄褐粉ヲ吐ク。ツテ莖間
 毎ニ恰モ雄蕊ノ如クシテ稍短ク尖銳無葯ノモノアツテ。共ニ一連体ヲナシテ子
 室ノ腋ヲ纏フ。附 一兩莖子室并無葯莖 二花并有白點者共即大圓

第三十二種

ケラニナム

ニシニナリナム

ヘンシイヤン

マエーマアールメスツト

Guanium *C. liltanum*

Pyralis apobambak

蘭



五十五
 平木大士表

午時花 通名

傳云漢種ト。春實生シ。莖高二三尺。葉互生シテ剛ク形柳葉ノ如ク柄アリ粗鋸齒アリ。脚葉ハ本ニ小尖起アツテ總ニ山字ノ状ヲナス。疎ニ枝ヲ分チ梢葉腋毎ニ花ヲツク。一梗ニ頭或ハ一頭。萼披針狀五出。花五瓣ハ狭ク頭濶ク扁圓ニシテ瓣縁相重リ略子チムノノ趣ヲナス。色黄赤。子宮推子狀一柱淡黄色。雄蕊生本併接シテ子宮ヲ被ヒ。未分レテ十二三ニノ長蒴アツテ黄粉ヲ吐ク。雄蕊間ニ狹長箕狀ノ小瓣六アリ亦色赤シ。後條道アル圓長實ヲ結フ細刺毛アリ。内五匹ニノ扁ナル多子ヲ収ム

附 兩葉并察槽辨一倍圖

第一種

pentapetes pharicae

第二種

pentapetes pharicae

前



ギンセンクワ

野西瓜苗

春實生シ高一二尺。柄長二三寸。葉三裂或五裂。每片鈍角高様ノ刻缺アリテ五生ス。
葉腋枝ヲ分チ。梢頭梗ヲ出ス。一寸余。每梗一花。萼針狀十一葉幅込シ。鐘狀ノ苞アリ。
苞膜様透明脉條如網。花亦蓋狀五裂。圓瓣捨シ接ノ如ク糾々重リテ開展シ。色淡
黄紫心。一柱五裂ニノ反卷シ。紅紫纖毛ノ頭アリ。暗紫色ノ鞘膜柱ヲ包ミ。膜上雄莖
十二ヲ出シ深黄圓莖アツテ黄細珠ヲ吐ク。莖并萼苞共ニ白色細毛アリ。附 兩莖

芽二十六種

ヒンスクユス ナリヲヌム


Fibris thionum.

羅

ブラーニハ ヒンスクユス

bleatigu fibris cas.

蘭



フユアフヒ

冬葵

莖高四五尺ニノ帶紫色ト不然トアリ。葉五生シ。形圓尖五起細鋸齒アリテ錦葵ノ葉ノ如クノ。柄本細鱗狀ノニ托葉アリ。葉腋花ヲ簇生シ。春ヨリ開テ冬ニ至ル。萼ニ重。外者ハ披針狀ノ三片。内者ハ鐘樣ニノ五尖。花五瓣指圓ニノ尖微。四ミ。亦錦葵花ノ如ク小。色白質淡黄紫葷アリ。中心一柱頭十餘ニ分裂シ。頗ル長ク如糸。頭下ニ短莖ノ雄蕊葯ヲ列次シ。白色珠粉ヲ吐ク。其狀錦葵ト少ク異ナリ。一種葉縁皺縮波紋ヲナスアリ。コレヲヲカノリト云。葉形花萼全ク同フシテ。只葉縁ニ皺縮アルノミ。故ニ不別圖。葉ヲ焙末メ乾苔ノ代ニ用ユルニ此種尤佳ナルヲ以テ。特リ此種ニソノ名ヲ帶フ葵類ノ功用ミナソノ粘滑質ニトルヲ以テ諸種大抵通用スルノ葉鏡諸書詳ニ載之。附 兩莖郭大圖

并十七種
ミルアア
malva coccinea . 草
ガクシユルテ
gibbula *malvula* . 菊
ミルユロエ
 按西書所說ミナヲカノリノ方ニノ常種ナルヲ未見



ゼニアフリ

錦葵

莖葉冬葵ニ似。花亦相似テ稍大ニシテ色淡紅紫文。又白色又深紅色アリ。外萼三葉内
 萼五尖。子室萼中ニ蔵レ。一柱頭十裂。雄蕊ノ本筒様ニシテ柱ヲ圍ミ。先ニ至テ分裂散
 十鬚ツナシ。白粉白粉ヲ吐ク。花開未經日ニアツテハ。只一柱白粉ヲ滿布スルヲ見
 己ニメ心黄漸ク延雄蕊下ニ曲テ兩莢ニ蓋ラナス 附 兩莢部大圖

第十二種

ニルニアフリ

malva rotundifolia

カレイヤ

Alma mille malvata

コシブツラーヂム

condaliga malvata


ヌ

of Kasjia-kuid

ニルニアフリ

蘭

阿須氏



ゼニアフリ

錦葵

阿須氏

莖葉共ニ大ニシテ澁澁アリ。花木槿花ノ如メ更ニ大。色紅白紫。又紅紫ニ淡淡。又帶黒
 又解縁底心トツノ色ヲ異スル等アリ。又瓣ニ單復。或ハ圓者。鋸口者。剪絨者等ノ種
 ヲアル。枚拳ニ暇アラマ。外萼小ニシテ七八葉。内萼五裂ニシテ大。一柱五角頭細分糸
 ノ如ク。雄蕊柱身ニ滿布シ。其形略錦葵ニ同メ少ク異ナリ。又種葉生高二尺余ニシテ花ヲ開キ

第一種

Alcea rosea - 華

Gesneria tuberosa - 華

Tamara ulmifolia - 花





トロ、黄蜀葵

初生ノ葉ニ尖、漸ク長ノ五尖
 梢ニ至テ缺刻深ノ大麻葉ノ如ニ
 至レ、柄本ニ針状ノ托葉アリ、秋梢葉腋
 毎ニ一花ヲ放ク、萼重復蜀葵ノ如ク、花五年淡黄ニテ
 瓜深紫色草、綿花ニ似テ大柱筒様子室ノ上ヲ被ヒ
 頭暗紅ノ五珠ヲ有ス、雄蕊ソノ体ニ綿布在テ似類ト
 一般、莖葉柄共ニ毛アリ、後角ヲ有ス、桐實ノ
 如ク、長寸許ヲ純五稜亦モアリ、内五色ニ
 合シ多クヲ収ム形筒、麻子ノ如ク、褐
 色頗ル様頭ノ態アリ、故ニヤルゴノ名アリ、諸州多ク栽テ根ヲトリ製
 紙ノ粘リニ用ル、故ニトロ、又トロ、アノコノ名アリ、此草大小二種アリ、小者
 ハ高三三尺、大者ハ六七八、形状相似シ、而シテ大者ノ葉ハ缺刻尤深ノ殆ト五
 指ヲ分ツカ如ク、即チ柔潤スル処ノ如シ、根ノ粘リハ小者尤多シテ製紙
 紙ノ用專ラシ、種トシテ大者ハ普ク栽テ花ヲ賞ス、又近時英利

第 十 二 種
Hibiscus *maurandia* 種
Hibiscus *mutabilis* 種
Hibiscus *syriacus* 種
Hibiscus *parviflorus* 種
Hibiscus *lanceolatus* 種
Hibiscus *trionchii* 種
Hibiscus *moscheutos* 種
Hibiscus *brasilianus* 種
Hibiscus *parviflorus* 種
Hibiscus *lanceolatus* 種
Hibiscus *trionchii* 種
Hibiscus *moscheutos* 種
Hibiscus *brasilianus* 種



聖産ノ種ヲ傳
 考姑期後日

花小シ英更ニ大シ種者亦

莖高二尺許。葉モミギガラマツ又ハ金剛纂ノ如ク。七八ノ大缺刻并ニ邊縁鋸齒アリ。一柄一葉。ソノ二葉ヲ岐出スルモノハ多クハ稍葉ノ下ニ又一並ヲナシ。小葉アツテ未ニ一花ヲ開ク。二三月ノ頃萌芽ト共ニ花ヲモツテ出。盛開ニ至テモ微ク點頭。無等ニノ四弁尖銳藤花色。子室短角杵狀。頭帽様ニノ黄色縦道アリ。多雄莖柱ニツキ葯心状蛤様淡黄色ニノ白粉ヲ吐ク。ソノ状路葵類ノ如シ。白根アフヒノ名ハ蓋シコレニ由ル。野州日光山ニ多ク。近世加州ヨリモ亦出ツ。加州産ハ移栽シテ育ク。易ト云 附 一柱 二雄莖共郭大圖

其族未考



ワタ キワタ 草綿

吾邦邊所栽培々アレハ大列ニトス。共ニ葉五尖或ハ三尖。花形亦異ナク。只フノ色
淡黄ハ深紫紅。茎柄ニ微ク紫色ヲ帶ルモノヲ白ワタト云。又鮮ニ紫紅暈アツテ。茎柄深紫色ヲ
帶ルヲアカワタ云。ミナ等ニ重。外者大ニ本一片ナレハ未三裂シ。三方ヨリ聚ツテ三稜ニ
三角形ヲナス。每裂又二三ノ尖出刻鋭アリ。内者小ニ皿形。色淡白ニ至細ノ緑點アリ。花五
瓣。々端不齊ノ刻鋭アリ。子室柯子状。頸延テ一柱ヲナシ。頸豈長白色。多雄蕊柱体ニワキテ黄
アリ。實熟ノ綿ヲ吐ク。綿中有子色暗褐。アカワタノ綿ハ。纖維白ワタヨリ長ノ強ニト
云。ソノ他地方ニツテ些異アツテ邦名亦不同モノアレ。概スルニ紅白ニ種ニ外ナク。近來舶來ニ種ヲ
傳フ。草稍大ニ葉形花状ニ異ナク。綿子分離シ易ク。子色暗黒。綿ノ纖維右細ノ長シ。以テ
織細密布ヲ製スベシ。故ニ普クキヌワタノ稱アリト云。

第一種

ニムシヤニム

Gossypium hirsutum L.

ラウゲ

カウーシホム

Gossypium tomentosum Lam.

前



イナゴ
夏草ニメ高六七尺。皮ニ茸アツテ取テ繩虫トナス。全体萎様ニメ粘滑液アリ。葉五
生。形圓尖ニメ鋸齒アリ。桐葉ニ似テ薄軟ニメ毛アリ。花五瓣黄色。瓣端扁ニメ微々
齒様ヲナシ。萼十六。瓣五目ノ常套ヲ具シ。黄莖黄蕊ニメ白粉ヲ吐ク。萼五片卵圓ニ
メ尖リ。葉柄頗ル長シ。花梗亦長ケンレソノ半ニ不及。枝實ヲ結フ。扁莢多ク聚リ並
ヲ石仁ノ半分ナル如キ形ヲナス。ソノ外圓ニ稜條アリ。頂ハ凹ニメ。齒紋ヲナシ。内
ニ黄蜀葵子ノ如キ黑色ノ子アリ。

第十七種

Jilva obtilora 蘭

Indigofera koenigkii 蘭

蘭



草本草



草木圖說前篇卷十二



卷之十二

草木圖說

卷之十二

