

草木圖說前篇 草部

十七綱上

十三

新 冠

號冊 卷冊 說書

二 一 八

學 齋 錄
校 中 有

植

三

4793

539

vol 13

彦報
立中
校印
章

圖說前篇卷十三目錄

第十七綱上 雄莖分為二體

第一目 六雄莖

ムラサキゲマン

ミヤマキゲマン

同朝鮮種

ヒメハギ

カキノハグサ

第三目上 十雄莖

豌豆

ソラマメ

キゲマン

延胡索 漢種

同和産

同一種

ハマエンドウ

センゴクマメ

サ、ゲ

ヤツコサ、ゲ

ミヅク、バリ

ハマナタマメ

クズ

アヅキ

グシドウ

タンキリマメ 同黄化品

ノサ、ゲ

ノアヅキ

コロタラリア

スバナリヤ

ハタサ、ゲ

マメ

ナタマメ

フヂマメ

五月サ、ゲ

ツルアヅキ

アフレマメ

ヤブマメ

ツルマメ

ホド

キマメ

センダイハギ

養立時

キリトリア

タヌキマメ

同一种

カラスノエンドウ

クサフチ

ニハフチ

落花生

スバメノエンドウ

又一种

ツルフチバカマ

オホ葉クサフチ

エビラフチ

本草綱目卷之十三
目錄
一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

十一、
十二、
十三、
十四、
十五、
十六、
十七、
十八、
十九、
二十、

草木圖說前篇卷十三



大垣

悠齋

飯沼長順著



草部

第十七綱

上

雜英分為二體

Penstemon

ムラサキゲマン

紫莖

秋子生シ苗ヲヲコス葉水芹葉ニ似テ柔滑。略黄ゲマンニ似レテ缺刻甚ヤ淺シ。春莖
 ヲ起ス莖方ニノ稜條アリ高二尺許。二三葉ヲ五生シ梢ニ有稜花ヲ下垂シテ穂ヲ
 ナス。花形黄ゲマン又ハ延胡索花等ノ如ク。体筒様ニノ上下唇ニ分レ。尾宿槽ヲナ
 シ色紅紫。唇ノ中心ハ白色扁頭ニノ左右ニ裂ケテ生殖部ヲ色ム。子室ハ扁長ニノ
 頭一柱ヲナシテ頭扁。子室ノ本ヨリ更ニ尾様ニ筒尾ノ方ヘ引クモノアルコト亦延
 胡索ト同シ。雄莖ハ本膜様ニノ子室ヲ色ミ。更ニ二莖ニ分レ上下ヨリ映ミテ頭下
 ニ至リ。各々三莖ニ分ル。實熟ノ扁長莢ヲナシ折裂ノ細子ヲ飛ヌ

按従前本草ヲ

japonalis

officinalis

草

japonica

Lindleyana

草

ナリト云説アレレ。今諸書ヲ閱ルニ草形花状ハ相似レテ。子室圓ノ胡椒ノ大
 如ノ内ニ一子ヲ貯フノ文ニ背ケバ。的當トシガタシ。又西勃氏已ニ *Corydalis*
 japonica ノ名ヲ本草ニ下スコトアレバ。ソノドイモケルヲ元ニ非ルコト愈證スルシ



路傍垣ノ間ニ生シ宿根ノ四時枯レズ。時ナラズシテ花アリ。草形ムラサキノマ
レニ似タレド小鱗細分シ色帯白ニノ臭氣アリ。莖ヲ断ハ黄汁ヲ出ス。花莖亦ムラ
サキゲマント一般ナレド色黄ナリ 附兩莖邦大圖

第六種

フエマリーア

ルニナアア

デーレ

ドイフスヤケレフエレ

Samolus luteus, 草

galea lutea Karstl., 草



新山ノ大木全形
三ノ下ノ大木全形

深山ニ生ス。全形キゲマンニ似テ花葉共ニ小。葉ノ缺刻頗。繊細。此種ハ夏草ニノ宿
根セズ。熟實折裂スルヲ尤モ急ナリ。生殖部キゲマント同シ又此種ニハ白花ナ
アリ



漢種ニ大小二品アリ。或云大者漢産小者ハ韓産ナリト。大者高一尺許。莖軟柔ニ直立シカタク。葉一柄三極ツノ中心ナルハ大ニ。側ナルハ小ニ。ニ裂シ。共ニ缺刻深クノ手掌ノ如ク。恰モ牡丹葉ノ態アリ。故ニ牡丹葉ノ稱アリ。小者ハ草産小ニ。葉每莖又三四トナリ。更ニ細ニ分レテ葉數頗ル多シ。根ハ共ニ圓塊黃色ニ。大ナルハ拇指頭ノ如ニ至ル。春莖頭有梗花ヲ以テ穗様ヲ大シ。形ムラサキゲマシノ花ニ似テ微大。体筒様。瓣上下ニ唇ニ分レ。色暗紅紫。小者ハ紅差淡。喉内ニ小瓣ヲ以テ兩莖ヲ色ム。処ノ一小体ヲ見ル。梗ハ筒ノ中体ニツキ。筒ヲ開ケハ中ニ綠色ニノ歌瓜状ノ一小体。筒尾ノ中間ニアリテ長ク膜ヲ以テ引テ子室ノ本ニ連ルモノアリ。余未詳。子室八角様ヲ結頭アリ。雄莖ハ腹様ニ分レ。上下ヨリ子室ヲ稍様ニ包ミ上下共ニ頭漸細ク三岐シ。各莖莖アツテ柱頭ノ下ニ位。ブ状ヲサキゲンノ莖ト一般。或云漢種ニ種最小ナルモノアリ。余未見。主用載藥鏡附一莖全形。ニ上下雄莖共。部大圖。三子室并歌瓜体三倍圖。

第一種

ツユイリア *Zyligata*
Panacea bilbya 耶 *bolabotlyg. Rieckelii*
 按鐸氏大小二種ヲ記シ。又阿須氏所圖ハ韓種ノ形ニ。更ニ大葉ノ品ナレハ。西洋ニ於テソノ種ミアルヲ可見





此草名曰...
 其性...
 其味...
 其用...



此草名曰...
 其性...
 其味...
 其用...

和産延胡索

本邦所産ノ延胡索亦大小種々アリ。大ナルハ頗ル漢種ニ近ク。小ナルハ僅ニ二三寸。葉形或ハ牡丹葉ノ如クニノ小。或本条圖スル処ノ如ク。又三葉一柄ノモノ。其色淡緑。或ハ帶白或ハ葉心暗紫黒斑アル等。花亦大小一ナラス。或ハ藍色或ハ帶紅或ハ白色等アレ也。概スルニ草漢種ヨリハ柔軟。根塊圓或ハ指圓。皮色ニハ微黄ヲ帶ルモノアレ也。肉皆白色。曾テ黄色ナルノ品ヲ不見。ソノ多種故。筆ニ暇アラズ。只中者ノ一種ヲ圖ス。花形莢狀ノ子細ニアツテハ。漢種ト一般故ニ略之。

クレイチ ホール ウツルラレ
Claytonia lutea hort. 譯文

按釋氏此名下ニ圖スル処本条ノ形ニ同シ故ニ揭其名于此



五種ハ本条ニ從テオホニ圖スルコト
 五種ノ對テハ一ノ葉ノ形ニ同シ故ニ揭其名于此
 本条ノ小葉ハ牡丹葉ノ如クニノ小
 花ハ牡丹花ノ如クニノ小
 根塊圓或ハ指圓
 皮色ニハ微黄ヲ帶ルモノアレ也
 肉皆白色
 曾テ黄色ナルノ品ヲ不見
 ソノ多種故
 筆ニ暇アラズ
 只中者ノ一種ヲ圖ス
 花形莢狀ノ子細ニアツテハ
 漢種ト一般故ニ略之



八雄黃 遠志
 原野普ク生スル処ノ小草ニメ。大葉小葉ノ數種アリ。大ナルハ莖高一尺許。小ナルハ數寸ニ過ギス。葉ハ卵圓披針狀。脚下一アルハ差圓頭。柄上ニ至テハ尖銳。葉腋ニ梗一花。或ハ枝ヲ出シテ數花ヲツク。萼披針狀三片。花卵狀ニ瓣翼狀ニ披キ。圓長ノ二瓣上ニ帽シ。龍骨狀ノ一瓣下ニ着ケ。尖剪截花又クナシテ片々。蒂^{ハエレタケ}綿絨ノ狀ノ如ク。コレ^ハ *Polygonum*。色惣テ暗紫。或ハ淡紫。花又ニアツテハ稍淡。兩葉并實狀如鉄ノ標的トス。

草七種ノ一

ホリガラ ヤホニカ

ヤウバンセ

ゴイヌブルム

Polygonum japonica 羅

Polygonum kusiblanum 蘭

按ヒノハギノ大小數種ミナホリガラノ誤ニ外ララズ。就中林氏此名ヲ下シ稍圖ヲ載ル者ハ。本条所圖ノ品ニ的當。其第五第六種等ニ可奉ノ品ハ。ミナ小葉ニメ本邦ノ小葉品ニ同シケレト。花柄上ニ穗様ヲナスノ異アリテ的當ナラザレト。ソノ種下ニ所載ノ葉ヲ煎服ノ肋膜痛ヲ利シ。根末ヲ煉蜜ノ酒煎病ニ用ル等ノ主能ハ。本条ニ於テモ亦通用スベシ



小葉トクハギ

説詳上条下



本草綱目卷之十三
 小葉トクハギ
 説詳上条下



本草綱目卷之十三
 小葉トクハギ
 説詳上条下

カキノハクサ
 圓莖高一尺許。葉卵圓披針狀。濶一寸許。長五六寸。短柄ニシテ五生。葉裏ニ一種細葉ナ
 有。許長三寸許。初夏梢上ニ三寸ノ穂ヲナシ花ヲ開ク。花略球形ニシテ萼三片。小者
 二下邊ヲ兩側ヨリ包ミ。大者一ニシテ上ヲ被フテ尖大翼兩弁ノ爪間ニ入ル。花五弁
 域形花ハ四弁ヲ常トス。此花ハニノ黄色大翼二弁兩側ヨリ挾ミ小翼二弁ソノ下
 縁弁分レテニ大翼ノ状ヲナス。ニノ黄色大翼ニ弁兩側ヨリ挾ミ小翼二弁ソノ下
 ニ居シ。龍骨一弁下ヨリ兩葉ヲ抱テ仰ク。ソノ前ノ下隅ニ深黄ノ花又アツテ丸右
 ニ並ビ。畧ヒノハキノ花又ノ如クナレド。被ノ如ク剪截細ナラヌ。子室橢圓ニシテ一
 柱扁長ニシテ黄色。龍骨弁中ニアツテ上ニ勾リ。頂ニ一ロツ開キ。口下上下ニ各一尖
 起アリ。雄蕊ハ柱ノ上面ノ兩側ニ各一茎。側ニ各三茎。此三茎ハ本ニ
 色ニシテ淡黄粉ヲ吐ク。根ハ木様ノ結節ヨリ長ク數線根ヲ出ス。多肉肥厚ニシテ硬心
 アリ。味初微甘ニシテ後辛刺ヲ餘ス。附 一子室并龍骨辨 二兩葉共郭大圖

ボリガヲ セキガ
Polygonum longica 蘭

ナールケレギアチア セキガ
Lyngbya Kweinblan 蘭

往日榕菴氏舶来 *Lyngbya* 乾根ニ依テ遠志ノ考ヲ得。功用詳ニ藥鏡ニ載ス。余今林氏所説
 ヲ因ルニ。草状花形カキノハクサニ的當些異ナク。但林氏白花ト云。本邦産ニ於テ黄色ノ不同アルトモ。而余
 未ク船載ノ乾根ヲ見ザレバ。根状氣味ノ推ヲ得サルノ憾ナキコト不能



本草綱目

豌豆 通名

秋下種。蔓長ク葉指圓三對ヲ以テ一絡ヲナシ。頭ニ卷鬚ヲ出ス。二托葉莖ヲ擁ス。本圓ノ齒刻アリ。花梗多ハ又ハ各頭一花莖鐘樣五尖。上ニ片ハ闊ク下三片ハ尖銳。花四瓣ニノ蝶形。旗瓣圓ニノ大頭ニ微凹アリ。兩翼圓ク龍骨。下ニ莖ク。形扁豆花ニ似テ大。色白紫ノ二種アリ。雄莖本併合膜様。赤丸莖ニ分レ。下ヨリ子室ヲ抱擁。列ニ莖アツテ兩邊相合フノ上ニ位シテ。十莖以テ子室ヲ全ク蓋ヒ。各頭黃蕊アリ。即十七細ノ常套トス。子室扁莢ニノ一柱。ソノ柱狀他ノ柱狀ト同シカラス。殆ト三角ニノ頭ノ上蓋ノ一側ニ纖毛アツテ列次ス。紫花ナルハ豆黃豆ノ大ニノ純四稜ニノ莢。白色。白花ナルハ豆圓小ニノ色白。又色白ノ莢大ナルアリ。又一種荷蘭豆アリ。未熟ノ莢ニ莢ヲ併テ煮食フニ可ナリ。林氏云。豆ヲ煮食フニ味甘美ニノ無恙ノ体ニアツテハヨク消化シ。庶人ニアツテハ性々風氣閉塞ヲ起ス。附 一莢全形 二子室柱形共都大圖

Pisum sativum 附 一莢全形 二子室柱形共都大圖
Pisum sativum 附 一莢全形 二子室柱形共都大圖



ハマエンドウ 野豌豆

諸州海邊沙地ニ多キ宿根草ニシテ。莖一ニ尺地ニ搦シ。全形豌豆ノ如ク。葉朝圓
 一ノ尖リタル四五對ヲ以テ一輪ヲナシ。中筋ノ末ニ細鬚ヲ出ス。托葉大扶。莖葉共
 ニ帯白。頂一ニ寸ノ穂ヲナシテ花ヲ綴ル。形藤花ニ似。初淡紫已ニ濃ク終ニ
 碧色ニ変ス。生殖諸部豌豆ニ同ク。莢子共ニ稍小。又淡紫殆ト白花ナルアリ

并ニ種
 マリキムム

Pisum maritimum 羅

ゼーカンチー
 エルウト
 蘭



秋下種夏ニ至テ莖高三四尺。枝條アツテ方ニノ空洞。葉五生形楕圓ノ五七小葉ヲ
 以テ結縁ヲナセテ。正對ノ必トセズ。質厚ノ柔滑柄本尖頭托葉アリ。葉脈數花ヲ結
 生。葉白色暗黒糸紋。翼白質深黒斑アリ。花弁ニ墨色アルハ特リ此種ノ珠標ニカ
 カル。後長莢ヲ生シ直上天ニ向テ。故ニワラマノノ名ヲ得。豆楕圓ニノ扁。カ豆ヨリ
 小。色淡黄緑。又一種差小ニノ暗紅黑色。又差淡キ者アリ。共ニ未熟ノ時莢ヲ搗テ煮
 食。熱後ハ豆ヲ取リ煮又炒リ食ノ。又一種大莢ニノ莢子亦大ナルアリ。玉境豆ト
 云阿須氏云豆ハ餅養ノ一品。ツノ未熟ナルヲ水ニ煮シハ味尤美ニシ。ソノ煮汁ハ
 以テ去垢美容ノ料ニ充ツベシ。豆末ヲ炒リ或ハ煮テ膿腫溶解ノ為ニ外用ス。又種
 苗ハ生乾共ニ食フベク。本草ハ以テ馬ニ飼フベシ

第十、八種
 豆科
Vicia faba. 蠶豆
 豆科
Vicia sativa. 野豌豆
 豆科
Vicia villosa. 野豌豆



セシゴクマノ


インゲンマノ

鳩豆

藤蔓長ク延キ葉ハ三箇一帯形莖葉ニ似テ小ニメ毛ナク。葉腋ニ一長梗ヲ出シ數
 花一層ヲナシ長ク穂様ニ綻一。等種様四裂トノ一裂大ニノ大又微ク裂ク。下ノ三
 裂ハ小ヲ失ル。ニノ細鱗葉アツテ護之。花城様鱗片扁大頭ニ一缺脚ニニ距アリ。兩
 翼ノ爪ヲノ距間ニ位ソ前ニナシ出。龍背狀ノ長ノ兩葉ヲ色ニ白リ仰テ翼間ニ向フ。子
 室角様ニノ一柱。雄莖十莖十七細ノ常套ヲ具。花色ニ紫白ノ二種アリ。後扁莢ヲ結フ。
 長ニ寸余細五六分。形鎌搦ニノ尖下ニ曲テ鈎狀ヲナシ。上下ノ縁縫ニ小痣痕アリ内
 ニ圓扁ノ四五子ヲ収ム。紫花ナルハ。熟シ黒褐或ハ茶褐ニシテ白眉アリ。白花ナルハ白ノ
 小黒點アリ。未熟ノ時ハ莢ヲ併セテ煮食フ。又一種莢潤ク内ニ硬殼アリテ未熟ノ時モ
 煮食ニ佳ナラサルアリ。中藥ニ此種ニモ花ニ紫白ノ二種アリ。白花ノ者ハ豆白色ヲ微莢ヲ
 帶テ黒點ニシテ。即白扁。扁豆。亦ハ莢多シ。或ハ和俗ニ豆多ク名テス。附錄并龍骨種子室本然圖而共一佈圖
 本三種

Psilobos japonicus 種 *Sabulactigu Lingurbaon* 種

本草 史記



サ、ゲ 紅豆

藤蔓長ク。葉ハ三箇一蒂形倒蛋形ニメ。殺鈍。葉腋梗ヲ出シ。梗頭數花簇生シテ。扁豆
 花ノ穂様ヲナスト同ジカラス。萼四尖ニメ上尖ノ頸ニ一裂アリ。花形ノ大概。旗翼
 二年等ハ扁豆ノ如クナレド。龍骨ノ扁潤子室ノ微狭長ナル等ノ異アリ。色ハ淡青
 紫ニ紅暈ヲ帯ビ。旗ノ外面黃暈アルヲ常トス。ソノ紅暈ノ淺深黃暈ノ微甚ホ。種々
 ニメ同一ナラズ。大抵莢赤キモノハ紅暈多ク。緑ナルモノハ黃暈深シ。莢ノ長サ大
 抵一尺餘。ソノ色種々アリテ邦俗アカ。ヘリトリ。白。青。ウルミ。ホノ稱アリ。又各々淺
 深アリ又莢長ク二尺ニ及フモノアリ。之ヲ十六サ、ゲト名ク。豆ノ色。生熟ハ些異
 アレド。熟乾ニ至レバ多クハ赤褐トナリテ他ノ豆類ノ色ニ多種アルガ如クナラ

ズ


第四種

ドリックス
ポリゴイメニニトス
Psilochos angustilobus, 雜

グナーゲルテ
スリゲルホーン
Psisylla lingunbana, 菊

春氏
所定

按林氏所載形状的當ナラザレド姑從春氏說



ハタサ、ダ アヅキサ、ダ ブンドウアツキ 濃 赤豆

特生二三尺。已ニノ梢頭少ク蔓様ニノブレ^カ。豆^マノ蔓延スルト大ニ同ジカラズ。
 葉紅豆葉ノ如ク。葉脈長梗ヲ出シ頂ニ淡紫色ノ嫩花ヲ開ク。又白質黃暈ノモノアリ。共ニ彩色紅豆花ニ同ク。莢紅豆ヨリ短ク赤小豆ヨリ長ク。實熟ノ暗赤或ハ暗黒或ハ褐質ニ細黒點アルモノ。又白質黒斑アルモノ。ヤツコサ、ゲト云フ。又形色略同ノ豆微大ニノ斑小ナルモノ。ソト云フ。等ノ數種アリ。未熟ノ時ハ莢ヲ併テ食フベキモ。紅豆ノ軟ナル方如クナラズ。而モソ、莢ヲ結ブ早キヲ以テ。之ヲ賞シテ料理サナゲノ名アリ。又蔓生ノ紅豆ハ籬ノ如ク。田畝ニ栽ヘ。此種ハ田面ニ滿栽スルヲ以テ。ハタサ、ダノ名アリ。又熟豆ヲ取テ赤小豆ノ用ニ代ヘ。味差劣レ^ル收穫頗ル多ヲ以テ往々裁之。故ニアヅキサ、ダブンドウアツキ等ノ名アリ

按花形ニコレハ *Asilifolius* ノ屬ニ外ナラズ。就中ソノ第一二十三種 *Asilifolius* ノ類一收ムヘキモノ、如シ



豆ノ類ニコレハ *Asilifolius* ノ屬ニ外ナラズ。就中ソノ第一二十三種 *Asilifolius* ノ類一收ムヘキモノ、如シ

ヤツコサ、ガ
 草状前条種ト別ナキカ如クナレバ花白色莢帯ノ外面黄暈アリ莢亦同フノ子差
 小ニシテ白質黒斑アルヲ以テヤツコサ、ガ、名アリ又一種豆差大ニシテ黒斑少キ
 モノアリ之ヲクチカクト云共ニ前条ノ一種ニカ、ル




大豆
 草状前条種ト別ナキカ如クナレバ花白色莢帯ノ外面黄暈アリ莢亦同フノ子差
 小ニシテ白質黒斑アルヲ以テヤツコサ、ガ、名アリ又一種豆差大ニシテ黒斑少キ
 モノアリ之ヲクチカクト云共ニ前条ノ一種ニカ、ル

マノ

大豆

熱地ニ早中晩豆形ニ大小扁圓色ニ黃白青黑赤褐又有斑等ノ多種アリ。各種ニヨ
 ヲテ草形亦些異アルカ如キモノアレハ繁雜詳明ヲ不得。概スルニ早種ハ草葉小
 晩種ハ長大共ニ倒蛋形ノ三葉一蒂ニノ莖葉共ニ毛茸アリ。毛ニ多アリ。カアリ。ツ
 ケ。淡褐ナルヲ。葉腋花ヲ莢生ス。莢紅豆莢ノ如ク。花形亦略同様ニノ小。紅白ニ種ア
 シロケト云。龍骨ハ白質ニメ火濃紅色。白者ハ純白雜色ナシ英
 色略同ケン氏。熱後黑色ヲ帶フルアリ。依テシロサヤクロサヤノ名アリ。今僅ニ吾
 郷邊アル処ノ品種ヲ列奉スルニ數十種ニ及ヘバ。汎ク他郷ニ探ラバ。ソノ異種ノ
 多カラシト推テ知ルベシ



五月マノ

次条ノワセマノト形色略同フノ稍小。色微濃ク目色
 淺シ。此種豆中ニテ最早ク熟ス。遠州以多ク栽培テ諸州
 ヲ輸シ。専ラ豆腐ヲ製ルニ用ユ。按ニ此種豆ニ次条
 種ハ共ニ梅豆ニシテ五月黄六月黄ノ名アルモノソノ
 早晚ノ些異アルニヨルル。イテ五月黄ノ名アルモノ

上条ニ次キ次条ヨリ早ク熟ス。ソノワセ中ニ在テ早
 キモノヲ邦俗夫ハ夕マイト云。共ニ形色五月マノヨリ
 微ク扇大ニメ。色淺ク目ノ色濃シ

此類者多ク。就中黄白色ナク常種ニアツテハ。ナカテ
 オクテマノ形色大抵同フメ。ワセヨリハ微大ナルノミソノ
 種中亦早種一ナラザレハ。形色ニ大異ナクハ。同列
 ニセズ。諸州多栽培。味稍有テ製ルニ専ラ此種ヲ用ユ。故ニ
 豆ソマノノ稱コトニ出。按ニ邑上ノ種ハ。ミテ黄大豆
 ニノ。此条ノ種ハ。報秋豆ニメ。ソノ九月黄冬黄等ノ名
 アルハ。ホソノ中ノ早晚ニヨルモノナリ



ワセマノ
 ナカテマノ
 オクテマノ



五月マノ



一ルモノ

オクテノ中ニテ形殆ト正圓ニノ大ナラバ色差白ク目ノ色亦淺ク形色尤モ美ニノ煮食ノ味モ勝ル。按ニ此種并次条種ハ。色白ケレバ即白大豆ニ属ス。



テツホウマノ

オクテノ中ニテ形尤大ニノ差圓ク。色帯白ニ目ノ色深シ。此種中ニ形差扁ニノ更ニ大ナルアリ併ハ圓ノ



クロマノ

形微扁ニノ黒色。黒大豆。常ニ大ナルアリ併ハ圓ノ



テツホウマノ

上条種ヨリ微大ニノ殆ト圓シ。又此種中ニ微扁ナルモノアリ。



コイシモノ

形色上条種ノ如ク殆ト正圓ニノ尤小也。煮食スル味他種ニ勝ルト云フ。按ニ嶺南冠宗爽緊小者為雄豆トアルモノ此豆ノ如キヲ云カ。嶺南冠宗爽緊小者為雄豆トアルモノ此豆ノ如キヲ云カ。嶺南冠宗爽緊小者為雄豆トアルモノ此豆ノ如キヲ云カ。



コイシモノ

形尤大ニノ扁ク。棋石ノ負アルヲ以テソノ名ヲ得。東國ニ多ク栽ト云。零鳥豆。



アヲマメ

形黄大豆ノ如クメ綠色ニノ微暗ヲ帯フ。青皮豆又ニ種肉裏ニテ青キモノアリ。ヨシリンサイト云。肉裏青。



カケマメ

上条ト同形ニノ色茂美銀杏色ノ如シ。肉裏亦同色。



アカマメ

形殆ト圓ク。色赤小豆ノ如クメ暗褐ヲ帯フ。此一種ニ粒尤小ニメ圓ク。色不深メ殆ト赤小豆ニ彷彿タルモノアリ。已下八種ハ十揚大豆ノ中ニ收ムベキ品ニノソノ赤色ヲ帯ルヲ邦俗アカマメト云。黄褐或ハ青褐ナルヲ茶マメト云。



同一種

形色上条ト同クメ微大。



又一種

形微扁ニノ大。色アカマメノ如クノ暗黒ヲ帯フハ一
更ニ深シ



又一種

色同ク形圓ニ差小



又一種

色略同ノ微深ク形差大ニノ扁



茶ニノ

形大ニメ色帶黃茶褐



同一種

形上条ヨリ微小ニメ色淡暗綠色ヲ帯フ



又一種

形差圓ノ小色上条ニ似テ微淡



クロクワカケマ

形扁圓ノ大ニ。背青黃褐色ニメ黒斑アリ。母ニ以
下六種共ニ此大豆ノ中ニ屬ス



アカクラカケマ

形上条ヨリ微小ニメ。彼ノ如ク扁ナラス。質淡黃褐色
ニメ老茶褐斑アリ



フイリマメ

形色常種ノオクテマメノ如クメ。淡黒褐色ノカスリ
ノ斑キアリ





同一種

形色アツメノ如クメ差小ニメ。緑色ノカスリノ斑点アリ。
又色稍淡ク斑黒色ナルモノ。又斑茶褐色アルモノ等種
種アリ




同一種

形色黒テツボリマメト同ノ。白色ノカスリノ斑点ア
リ。邦俗黒ムシクヒト云



ミヅクバリ

茎ナカナ豆ノ如ク。葉大ナラズ差狭長ニシテ褐毛アルヲ常種ノ如ク。花形同様色淡
 紅。莢枯レテ皮黒色ニ変ス。子ハ小ニシテ色褐黄。惣テ豆苗ハ水ニヨハキヲ性トス。獨
 リ此種僅ニ水ニ堪ユ。故ニ水郷ノ町畦ニ栽ルニ利アリ。因テミヅクバリト名ク又
 黑豆ニモ水ニ堪ヘ安キ一種アリ



葉は長く大に折れ易く...
 根は...
 花は...

ナタマメ

刀豆


葉紅豆ヨリ大ニ。形卵圓披針狀。花亦大ニ。淡紅紫色。萼狭クノ龍骨ヲ狭ク。共ニ勾
 リテ旗弁ニ對ス。萼筒体ニノ五裂。上ノ二裂ハ圓頭ニメ大。下ノ三裂ハ小ニメ尖ル。
 雄蕊十莖似類一般。雌柱頭扁平ニ黄色ノ蜜腺アツテ色之。莢長一尺ニ餘リ濶ニ寸
 許ニ及フ。ソノ未熟ノ者ハ。莢ヲ連テ食フ熟スレハ豆長寸許。淡紅色ニメ尖アリ。
 一種白花ナルアリ。實亦白シ白ナタマメト云。附雌柱一倍圓

トリコス

インテユルフユ

Lotus inclivis

春氏



ハマナタマノ

暖國海邊ニ自生シ。宿根不枯。全形刀豆ノ如クメ小。葉指圓ニメ尖リテ厚ク。面深緑
 背黄緑色。葉ニ頭下者ハ短クメニ尖アリ。瓣莢ナクナマメニ同メ亦稍小。莢長ニ寸
 餘子ハ扁豆ノ如ク黒茶褐色。

トモコノ
 コチアトユク
Asilichon linearis 春氏





マナシノハナノ 藤豆

蔓長大葉類山草葉ニ似

葉腋房ヲナシテ花アリ形他

蝶形花ト異フ類ハ翼長ク毛

披閉レテ不明年産ノ形ノ如ク

研葉龍骨長ク全ク蒸リ色ハ其外ニ

出。色淡黄灰白。雄莖干莖。ソノ六者細ク長葉。四

者ハ粗ク。雄莖葉ニ淡黄白粉ヲシテ。子室田長淡黄緑色。ノ毛アリテ一性葉長大短毛アリ

テ殆ト蒸葉ノ如ク被ニシ。名アリ。又一種葉ニ毛ナキモノアリ。雄莖五ナリ大。ノ豆ヨリ小テ灰

白。又白色ヲ示班。又灰色ニシテ黒斑亦ノ数種アリ

其属未詳





クズ 葛

山野ニ自生多シ。葉圓尖三筋一蒂ヲ常トス
レ氏。稍葉ニアツテハ每葉三尖。或ハ中者三尖側
者ニ尖等ノ種々ヲナス。蔓ト共ニ褐毛茸々。秋葉
腋ニ五六寸穂ヲナシ花ヲ開ク。形豆花ニ似テ紫
毛多シ根ヲ取り薬用トシ又葛粉ヲ製ルニ一樽蒙解之

第一五

トリーコユ
Quercus pedunculata
ナリノブユ
Quercus pedunculata
ナリノブユ
Quercus pedunculata

按林氏唯本邦産ノ稍葉ノミヲ見ル。故ニチリータラアミケノ名ヲ下レ且クノ形ヲ圖ス



五月廿二日 トウサマゲ 菜豆

此品菜里利堅種
 二枚テモ蔓葉ノ
 大小実ノ形色大小
 等多種アリテ每季
 二暇アラズ故ニ只ソノ
 実ノ形色を著キテ
 四種ヲ載メソノ下者
 ノ二種ハ特生蔓ヲナ
 サルモノニカハル



苗葉竊豆ニ似テ萼鐘様ニノ僅ニ五起アリ。花ハ兩翼前ニ伏シ龍骨長ノ花心ニ卷
 回シ雄莢十莖子室莢様ニノ一柱長キ等。豆類ノ常態ニ外ナラザレバ兩莢共ニ尤
 長フメ卷回スルノ一殊態アリ。各以郭大圖示之。此種四五月ニ莢ヲ結フ形ノ豆莢
 ノ如ク小長三四寸ニノ軟ナリ。多ク皮ヲ連テ煮食フ。早晚ニ種アリ。早者ハ花紅晚
 者ハ白。ソノ早者ハ莢ヲ再三豆ヲ収ムベシ。故ニ二度ナリ三度ナリノ名アリ。豆莢
 豆ヨリ小ニノ光澤アリ。形ニ大小色ニ紅白黒褐等ノ數種アリ。熟後豆ヲトリ煮食
 味佳ナリ。一種特生シテ蔓ヲナサザルアリ 附 一兩莢 二龍骨包莢卷回状共
 郭大圖 三子室一倍圖

第一種

ハセラハス
Phaseolus vulgaris、 豆

ゲノ子

Phaseolus limbo、 豆



アツキ 赤小豆

特生ニ大許。其肥大ナルハ梢頭微ク蔓様ニ延ク。葉ハ扁尖或ハ圓尖。或ハ二三尖起アリテ其狀一ナラズシテ變流。莖柄ニ褐色ノ柔刺モアリ。每葉腋一寸許ノ花莖ヲ出シ莖花莖生ス。每花ニ數片苞アリ。萼鐘樣ニノ微ニ四尖起ヲナシ。花黄色。旗翼ノ二瓣ハ蛾形。花常。莖ナレハ。龍骨大ニノ曲リ中間ニ鈎狀ノ一距アリ。製一倍ノ兩莖ノ長キ形ハ菜豆ノ莖ノ如クナレハ。但莖ノ白色ナルト。柱頭頸下ニ織毛ノルトノ異アリ。此花ノ龍骨ノ曲リタルヲ以テ。旗翼ノ二瓣モホソノ位ヲ正フセズ。コレ此種類ノ殊標ニカハル。此種モ早晚二種アリテ。ナツアツキアキアツキノ稱ヲナス。又子形ニ大小色ニ鮮紅暗紅白等ノ種々アリ。今吾郷邊見ル處ノ七種ヲ考テ

ハセラヒニス
ナキアトニ
ケスカロールテ
カリホーン
春氏
可定

Physalis verticillata. 藤
Physalis Alimbaria. 蒴

第一種



ナツアツキ

粒小ニノ色赤ノ暗ナラス

秋熟

アキアツキ

形上条種ヨリ大ニノ色赤向シ又同形ニノ色微淡ナルモノアリ

秋赤豆

オホアツキ

英晚種ノ莢ヨリハ差濶ク結テ褐白色トナリ豆色常種ト同ク形微大ニノ短ク上下半扁ナルモノ多レ皮薄ノ銘トナヌニ佳。慈蒙ヲ謂日根アツキコレ也

ウヅラアツキ

大ナ晚種ノ如クノ色暗赤ニノ細黒斑点アリテ頗ル黒シ故ニ俗クアツキ又ウルミアツキト云

ヲハリカツキ

ホコリカツキ 形早種子ヨリ差小ニノ色深ク微暗ヲ帯ブ尾羽常滑邊多ク載之 諸軒赤



卷之十三 赤小豆 春氏 可定

シロアヅキ 形丸種子ヨリ微小ニノ圓ク色白クノ微褐ヲ帯ブ


白豆

茶アヅキ 形上条種ヨリ微大ニノ褐色ヲ帯ブ



茶アヅキ 形上条種ヨリ微大ニノ褐色ヲ帯ブ
シロアヅキ 形丸種子ヨリ微小ニノ圓ク色白クノ微褐ヲ帯ブ
大豆 形大種子ヨリ微大ニノ圓ク色白クノ微褐ヲ帯ブ
黒豆 形大種子ヨリ微大ニノ圓ク色黒クノ微褐ヲ帯ブ
胡豆 形大種子ヨリ微大ニノ圓ク色白クノ微褐ヲ帯ブ
蠶豆 形大種子ヨリ微大ニノ圓ク色白クノ微褐ヲ帯ブ
綠豆 形大種子ヨリ微大ニノ圓ク色白クノ微褐ヲ帯ブ





ツルアヅキ

エノアヅキ
ニヤウシマノエ

蟹眼

藤蔓長ク延キ。葉倒蛋形ニメ尖リテ赤小豆葉ト大ニ同カラズ。ツノ糙澁ニメ葉
ニ織剛毛アリ。ハ赤小豆ト同シ。葉腋四五寸ノ二三茎ヲ抽キ。每頭穂様ニ多花ヲ
開ク。花ノ形色赤小豆花ト同フメ。只穢大ニノ黄色花モ深シ。莢細ノ長ク子ノ形赤
小豆ヨリ細ク長シ

按上各ノ一種ニ收ムベキモノ、如シ

暗赤色ニメ目白色

淡黄褐白色又色尤淡ク褐色ヲ帯ザルモノ奇アリ

00 90

ブンドウ

ヤエナリ


绿豆

苗赤小豆ノ苗ニ似テ小。莢豆モ共ニ相似テ亦小其色ニ三種アリ。甲者ハ淡緑ニシテ微褐ヲ帶。油紙。乙者質暗緑ニシテ細點アリ。官緑。丙者質黒褐ニシテ細點アリ。

按亦 *Phaseolus* ノ族ニ可收シテ種名未詳



丙 乙 甲
〇〇 〇〇 〇〇



蔓延長葉ハ紅豆葉ニ似テ
 闊短又赤小豆葉ニ似テ鋭銳。

微糙滑ナレモ赤小豆葉ノ毛茸アルガ如
 ナラズ。葉腋短莖ヲ出短穂ヲナレテ花ノ
 リ。大寸三四分。旗弁淡黄緑色ニシテ仰キ。
 兩翼白色伏ノ前ニ並ヒ。龍骨花心ニ出テ
 卷回蝶狀ヲナシ。淡緑始ト白色。兩莢葉豆
 花莢ノ如ク長クメ卷回ス。豆頗ヒ大ニ扁長ニ
 ノウズク白質黒斑アリ

按花形ニヨリ *Phaseolus* ノ旗ニカナル



タニキリマノ

キンチャクマノ

灰藿

山野ニ多ク自生シ。宿根シテ藤蔓長ク葉一共ニ褐毛アリ。葉ハ扁豆葉ニ似テ厚シ。夏月葉腋穂ヲナシテ花ヲツク。形豆花ニ似テ淡紫色。後英ヲ結ブ長五十分潤三分許ハ二子ヲ藏シ。熟ノ赤黒色自ラ開テ子ヲ露ス。子小ナル赤小豆許ニノ扁圓黒色ニノ光アリ。一種葉形略同ノ未幾鋭質差薄ク毛茸亦少ク。花英形色本条ト同シキモノアリ。或コレニトキリマノ名ヲ下ス。

キンチャクマノ
Glycine shilloga

春武可名西勒氏定之

按林氏其屬ノ概標ニ草多ハ地ニ匍伏シテ藤蔓ナラズ。萼ニ唇。龍骨辨尖鋭辨ノ歴ニ及ヘテ云々トアリテ。本条ノ屬スベキモノナラザル如シ。姑存疑俟後賢考。以下四種共ニ同族ニ可收モノ、如シ



上条一種黄花者

亦宿根ノ草状略上条ト同フノ花淡黄色。英ノ形色異アルコナシ、此一種ニ兼微大ニノ厚ク。黄花ニノ英ニ赤色ヲ不帶モノアリ。



上条一種黄花者



ヤブマノ

藪澤蘆場ニ多ク。春實生シ藤蔓細ク長ク。葉形タンキリマノノ葉ノ如ク薄ク毛茸
 微ナリ。秋花アリ。形山黑豆ノ如ク色淡紫。後莢ヲ結テ長一寸許。扁長ニシテ毛ナク
 扁豆ノ形ニシテ小。實圓扁褐色ニシテ斑アリ。邦俗ゴマメト稱シ小兒嗜シテ食之


第二種

Glycine max (モロイカ)

Glycine max (モロイカ)

春氏所定

按春氏ノ説允當ナリヤ余未得決



草木

ノサ、ケ

キツ子サ、ケ

山黒豆

宿根草ニノ蔓葉共ニ大ニ。葉形豆葉ニ似テ小ニノ厚カラズ。色深緑。花淡黄。葉背ニ天シ翼前ニ出。龍骨亦大ナラス。萼大ニノ形皆ノ如ク。下邊僅ニ一尖起ラナス。色淡緑。莢一寸餘。熟ノ淡紫色。實圓ノ黒色上ニアサギ色ノ粉ヲ布ク。



ツルマノ 余未タ此種ノ邦名アルヲ聞ス故ニツヒメノ名ヲ下シテ他種ト分フ

蔓長大ナラス。葉タシキリマノノ葉ノ如ク厚ケレバ。倒蛋形ニシテ小。花亦略相似レ氏。差小
ニノ淡紅紫色。莢ハタンキリマノノ莢ヨリハ長ク大低三子ヲ収ム



ノアヅキ キツ子マノ

宿根草ニシテ藤蔓大ナラズ。葉赤小豆葉^{アヅキ}如シ。微厚ク。支略鹿藿^{シキリフ}葉ニ似テ小ニシテ毛茸ナク。花ハ大ニシテ色黄。形子^{アヅキ}シテ正カラズ。葉尤大ニシテ頂ニ一缺アリ。莢細ク長ク。龍骨弁長メ尖子^{アヅキ}シテ曲ル。莢^{アヅキ}四尖。下者長ク上者次之。兩側又次之。生殖部似類一般。後長莢ノ結^{アヅキ}ノ長一寸餘。子赤小豆ニ似テ小。暗褐色ニシテ斑アリ。

按莢状同シカラザレトモ亦同属ニ收ムヘシ



紅毛豆



本草綱目卷之十三 豆部 紅毛豆

ホド

ホドイモ

土園児

細蔓長ク引キ。葉ニ筒一轄ノ品ト。五筒一轄ノ品トアリ。其ニ小轄心裁状ニノ尖リ。
 夏葉腋花莖ヲ出シ長二三寸。短梗淡黄緑色花ヲ以テ總ヲナス。花僅ニ二三分ニノ
 蛾形。萼鐘状。旗弁尤大異甚タ小ニメ。端末紅紫。龍骨柱ヲ旗ニ挿シ。柱龍骨柱内ニ在
 テ下ニ曲リ。雄莖十ニメ亦從テ曲ル。ワノ状蛾形花ノ常態ト少ク異ナリ。故ニ以部
 大圖示之。後角ヲ結ブ長ニ寸許。根亦蔓ヲナシ。処々ニ彈丸大ノ塊ヲ連ヌ。附一全
 花ニ兩莖共部大圖

所屬未詳



コロタラリア

嘉永年間舶来。圓莖木様高三四尺。葉如圓ニメ頂微凹本差銳銳十ル三箇一蒂ナル
ヲ互生シ。葉腋枝ヲ分チ。夏秋ノ際梢末穂ヲナシ花ヲ綴ル。丁五七寸。形木豆ノ花ヨ
リ小ニメ黄色。背ニ暗紅線アリ。雄蕊五長五短ニメ。短者ハ葯長ク長者ハ葯短ク。子
室圓長ニメ一柱長ク頭葯上ニ出。花後莢ヲ結フ長一寸余。形略莢芒決明等ノ莢ニ
似テ小。中心一道アツテ端末上ニ向テ一鉤尖アリ内ニ褐色光澤アル多年ヲ収ム。
故ニ熟莢ヲ飛播スレバサラクト云音アリ。即林氏ノ以テ此屬ノ概摺トスル也。附兩莢耶大圖

第十三種

コロタラリア


ラナホリア

Cratogeomys latipolia 蘭

ゴードブラーザ

Knobblige ramulosa 蘭

ラムメラール



三木大士蔵

キマノ 木豆

春下種ニ秋晩花アリ。土窟ニ養之ハ高三四尺灌木様トナリ。時ヲ定ノズ花アレモ多クハ三四年ニノ枯レテ久ニ地ヘズ。幹木ハギニ似テ深綠色線稜アリ。葉五生形大豆葉ノ如ク一物ニ葉面深綠色ニノ滑。背淡緑ニノ微毛アリ。又胡枝子葉ニ似テ幅狭ノ厚。花蝶様旗弁深黄ニノ紅條アリ。翼黄色龍骨淡黄。兩莢十七細三日ノ富套ニノ莢ヲ結フ多モアリ熟ノ黒色子ハ緑豆ニ似テ大ニ。色黄褐味大豆ニ似タリ

第十五種

コロタラリア *Laburnum*

laburnifolia 薔

コロタラリア


チリネリア

Crotalaria trifoliata 物印満氏

ガラトプラーヂ

ラマンラール

Platyligis ramoulana 薔



ス、ナリヤー 花尸 コロクラリア ア レ子シニス

根際数條ニ分レテ叢生シ。每條又枝ヲ分チ。高一尺餘。葉殆ト無柄ニノ厚ノ軟。形卵
 圓。莖ニ似テ五生シ。每葉針狀ノ二托葉アリ。莖葉共ニ細織ノ軟毛茸アリ。葉ニ
 對ノ花莖ヲ出シ長一寸許。稍上一花或ハ又極ワ分ツテ二花ヲ放ク。萼狀長披針狀
 大小五片。上者二。下者三ニノ尤狭シ。花城形略蠶豆花ノ如クノ。稍小ニノ萼瓣不反。
 翼ト共ニ黄色。龍骨瓣潮短色緋白。萼城形花ノ常套ニノ長短十雄莖。長者約短。若
 約長。以鄣大圖示諸事。後莢ノ結ク。形前条ノ莢ニ似テ潮短ニノ豊大。恰モ杏仁形ニ似
 熟ノ時黒内ニ腎藏形ノ褐色細子ヲ収ム

亦五種

Crotalaria chinensis . 蝶

Chinensis nanoulaan . 菊



大ニハ天...
 花ノ...
 葉ノ...
 莖ノ...
 根ノ...


宿根春苗ヲ生シ高ニ三尺一柄三葉ナルヲ互生ス。形卵圓ニノ尖リ。又畧同形ノ二
 托葉アリ。三月莖梢ニ短梗域形深黄色花ヲ互生シ。略穗状ヲナス。萼四裂上ナル者
 大ニノ尖微ヲ裂。子室角様雄蕊十二ノ黄葯。後扁莢ヲ結ブ長二三寸内ニ老褐色ノ
 扁子アリ。形略決明子ニ似タリ

按ニ此種コロタラリアノ族ニノ。就中第二十四種ノ *Vanilla* ルニナリス *holymantia* ハルノモーニキス

ラムンナール

Wamulian 前ノ如クナレバ林氏所説不精レバ。須ク他ノ較考ヲ俟テ決

スベシ




五木全史

其永年間始末。春實生シ莖細ク葉ニノ長ク蔓延シ。葉ハ卵圓ノ五小葉ヲ以テ一鱗
 フナニテ互生シ。每小葉ノ莖ノ中筋上ニニノ細軟刺アリ。夏末每葉腋ニ一梗
 ヲ出ス長ニ三分。梗頂扁圓ニ序ノ苞アリ。内ニ一花ヲ放テ。等鐘狀五裂ニノ尖リ。花
 蛾形ノ變態ニノ。葉下ニ在テ仰テ舟形ノ如ク。内ニ翼ト龍骨ヲ抱キ。龍骨伏テ子
 室兩葉ヲ包ム。故ニ子室ノ頭亦伏シテ下ニ向フ。瓣ミナ白色。雄心黄緑葦アリツノ
 花狀頗ル奇ナリ故ニ *Kittabbloum* . . . 陰処 ノ名アリ。子室兩葉ハ十七細三目ノ常
 實ニ外ナラズ。後而英ヲ結フ長サ三寸許。未熟ナルヲ英ト共ニ煮食テ而五ツ食フ
 ガ如シ

第一種

Victorica binaria . . . 薔


molikkika Kittabbloum . . . 薔





落花生

漢種ヲ傳播シ。春下種シ夏秋ノ際ニ至ツテ花アリ。莖一二尺
 地ニ塌シ。莖葉共ニ微毛茸アリ。葉蛋形兩對四箇ヲ以テ一結
 ラナレ。中葉ナク。柄本尖長ノ托葉アツテ莖ヲ擁ス。葉腋一寸許ノ梗ヲ出
 シ花ヲ開ク。蛾形ニシテ大ニ翼小龍骨尤小。共ニ黄色。旗ニ赤暈アリ。
 莢ニ七網三日ノ常套ヲ具ス。子莢梗ノ本ニアリ。圓尖一柱長ク梗心ヲ通
 リテ花内ニ出。頭針状。花老梗萎シツト本漸ク伸テ更ニ線根ノ状トナリ。
 遂ニ地中ニ入テ線頭ニ實ヲ結ブ。莢菽豆莢ノ如ク褐白色内ニ圓
 長ノ二三子ヲ収ム。根長ク線梯ニ処々ニ丸圓粒状ノ細珠ヲ生ス。林氏云。
 子内ハ白色ニ油アリ味美ナラズ搾油アリ食用又藥用トスルモ扁桃油ノ
 如キニ及バズ附開梗見諸事 甲搜乙註 丙子室 圖



アラリス エボゲア
arachis hypogaea 蠶
 トレガモ アルド エイケル
sibirica arachis sibirica 蠶

夕又キマノ

原野ニ多生シ。茎一二尺。大ナルハ梢葉腋ニ三枝ヲ出ス。葉互生。形柳葉ニ似テ細小。面深緑色ニシテ無毛。背淡ニシテ茎ト共ニ纖細毛アリ。夏秋ノ際莖頭多花ヲ互生シ。花ノ略穂様ヲナス。苞二葉各二裂或三裂ノ等ナク。色淡黄緑ニシテ端赤毛多ク。苞ノ本ニ針状ノ三葉アツテ。殆ト等ノ如シ。花蛾形。淡藤花色ニシテ濃紫ノ細條アリ。葉大ニ翼小龍骨翼下ニ居シ。葉尖リ上ニ抱接シ内ニ兩葉ヲ有ス。雄莖五短三長ニシテ葉黄色

亦爲未詳



此ノ草ハ...

原野ニ多ク秋深ク子生ス。方茎地ニ布テ一二尺鱗葉ヲ互生ス。吾郷遠大中小ノ三種アリ。本条ハツノ小ナルモノニシテ。小葉七八對ヲ以テ一鱗ヲナシ。中筋頭一鱗アリテ二三岐ヲナシ。柄本ニ三尖ノ托葉アリ。小鱗ハ形披針狀ニシテ頭僅ニ平凹ニシテ中心一尖刺様ヲナス。葉腋寸餘ノ細莖ヲ出レ。上ニ四五花ヲ一側ニ房樣穗狀ニツク。莖長ノ五尖花蛾形。未開ノ時ハ白質微紫葇ノレ。花開ニ至テ殆ト白色。只龍骨ニ似ニ微紅ヲ餘ス。莖柱蛾形花ノ常莖ニノ後扁莢ヲ結フ。播圖ニノ長ニ三分内ニ二細子ヲ収ム。根ハ細鬚ノ間ニ小米粒ノ如キ珠塊ヲ多クツク。此類三種ニナリ。林氏云子ヲ煎服シテ痘瘡ヲ排泄レ。又咽喉病ニ祇用シ。又子粉ヲ貼シテ腫瘍ヲ膿熟スル丁豆粉ノ如シ。附全花部大葉背一倍圖

var. longistylum 長莖種

var. longistylum 長莖種

var. longistylum 長莖種



前条一種

カスマグサ

此種ハ前後二種ノ中間ニ立チ。五對小葉ヲ以テ一結ヲナシ。小葉尖銳ニシテ頭未平
 直尖割ノ形ナク。中筋頭ノ鬚岐ヲナサズ。托葉一尖ニシテ分レズ。花梗寸餘ニシテ花
 或ハ一花。前条花ヨリ微大ニシテ色稍濃ク。莢亦微大ニシテ四子ヲ収ム。又一種白花ナ
 ルアリ。附全花郡大圖 米里堅種ハ花莖全ク同形ニシテ莢潤短ノ異アリ故ニ只莢子ヲ同ス

第二種

五北フユム

チルラスメルムユム

五北フユム

チルラスメルムユム

五北フユム

チルラスメルムユム



又一種

スノノノエンドウ中ノ大葉ナルモノニノ。披針狀葉ノ四對或ハ五對ヲ以一結ヲ
 ナシテ五生シ。小結葉頭平凹ニノ中心一尖起アリ。中筋頭ノ鬚三岐ニ分レ。柄本托
 葉三四尖起ヲナス。葉腋毎ニ短梗一花ヲツク大サ三四分。色淺紅紫。後扁莢ヲ結フ
 長寸餘内ニ十許子ヲ收ム。

エールステシ

又

エールステシ

コロツク

system of protein knock.

鐸氏

第十種

サトフア

クマン

エール

鐸氏所載ノ圖說共ニ的當些異ナシ。按ニ林氏 *Shira patoku* 葉 *tenmu kiyao* 葉
 鐸氏ノ「エールステシ」ヲ研スレドモノ説ク起ノ形狀ニアツテハ。鐸氏ニ所載ト
 不同ルコアリテ。鐸氏ノ的當ナルガ如クナラズ。故ニ今主トメ鐸氏ノ名ヲ掲ク。



カラスノエンドウ

伊吹山麓に多く生ス。草スバノエンドウヨリ大ニク。サフヂヨリ小ニノ。葉楕圓
 ニノ頂ニ微缺アル五對ヲ以テ一轄リナシテ五生シ。卷鬚二三岐。托葉二三尖。每葉
 腋ニ短梗ニ花アツテ。スバノノエンドウノ如クナレド。葉ノ如ク長カラズ。花差
 大ニメ。淡紅帶紫色。後扁莢ヲ結フ。長一寸餘。内ニ五六子ヲ収ム。カラスノエンドウ
 ノ名。古来サス處紛雜分明ナラズ。故ニ余ハ主トシテ此種ニ下ス

按前条ノ同族ニノ種名未詳




藤蔓長ク延キ線條アリツテ圓カラズ葉指圓披針狀ノ小葉五六對ニシテ一結ヲナシ
テ互生シ。赤ニ二三岐ノ卷鬚本ニ尖頭狀三片ノ托葉アリ。秋稍葉腋ニ紫碧色ノ繖
形花ヲ以テ總ヲナス。瓣莖ノ形似類一般萼五尖アルヲ亦同シクシテ。スバメノモ
シドウノ萼ニ此スレバ頗ル短シ。後莢ヲ結ブ。

エシヤ
ヒツセン

按巴下三種共ニ林氏ノ *Yucca* 種ヨリ第六七種マテノ間ニ相近似スルモノナレド。何種ヲ允當トセン余未タ
決スルヲ不能。又物印滿 *Yucca* ノ下ニ載ルル処ノ圖尤的當ナル品アル如シ。姑
ク後日ノ校考ヲ期ス。



甲吹山崩ニ多ク生。全形ワルフチバカマノ如クノ稍小。藤蔓ニ三尺線條アリテ圓
 カラズ。葉指圓披針狀様ノ小葉大抵十對ヲ以テ一結ヲナシ。卷鬚ニ三岐ニ分レ柄
 本披針狀或ハ二三尖裂アル托葉アリ。初夏葉腋穂ヲナシ花ヲ開ク。莢蓋ニ花莢ノ
 形色ワルフチバカマニ同ノ差小。後莢ヲ結フ。次奈ト同シ。粕川山人エドウサ
 ウノ名ヲ稱ス



オホ葉クサフチ

上条ノクサフチニ混ス
故ニオホ葉ノ言ヲ冒ス

藤蔓方ニノ細ク。指圓尖銳ノ小葉四對或ハ三或ハニヲ排出シ。中筋頭卷鬚或ハ草
一或ハ四岐ヲ出シテ物ニ纏フ。柄本數起アル托葉アリ。秋葉腋三四寸ノ細茎ヲ出
シ片側花穂ヲナス。形色ツルヲチバカマノ花ヨリホクサフチノ花ヨリ大。兩葉ハ
似類一般



ニハフダ イハフダ 胡豆

山崖原野ニ生ス。叢生高一二尺ニシテ。卵圓披針狀ノ小葉。大抵三四五對ニシテ中心葉アル。葉ト互生ス。ツノ狀略藤葉ノ如ク。小葉間ニ花莖ヲ出ス。長五七寸。藤樣ノ小紅花ヲ疎ニ片側穗樣ニ綴ル。兩莢似類ノ常套。莢黃綠ニシテ白粉ヲ撒ス。莢開發五尖。略コマツナギノ莢ノ如ク。花後莢ヲ結ブ。亦コマツナギノ如ク。稍大内ニ細子ヲ収ム。一種花莖同形ニシテ。莖長三四尺ニ及ビ地ニ塌スルモノアリ

第五種

インヂコハラ エノカビシラ
Indigofera mucophylla . 藤
チーケダクノナク イニナク
Indigofera umbellata . 藤
インヂコ



エビラフチ

山中溪間ニ多ク高一二尺。茎葉共ニ剛ク茎ニ線條アツテ殆ト三稜。葉四五對ノ結
 様略胡豆葉ノ如クナレド。頭末葉ナク只細軟ノ一刺アリ。葉本兩尖ナル托葉アリ。
 夏柄葉脈ニ一二寸ノ片穂ヲナシテ花ヲ密簇ニ開ク。瓣黃ノ形ニハフヂト同フシ
 テ紅更ニ深シ。

其族未考



草木部 野苧草 十三



草木圖說前篇卷十三



