

草木圖說前篇 草部

十八七
細細下

十四

植物

歐州 華北 臺灣

二 一八
〇

學校 匯中 滋賀

470.3
537
Vol 14

彦根公立校
印章
草部

草木圖說前篇卷十四目錄

第十七編 下

第三目 下

クサ子ム

木黄芪

エゴイテシタータツリ

黄花レンリサウ

ヨツバハキ

ゲンゲ

ムマゴヤシ

レノンダ

黄芪

立山黄芪

紫花レンリサウ

タニワタシ

コガ子バナ

同一种

コメツブマゴヤシ

正ヒラハキ

車軸サウ

胡蘆己

ハギ

イヌハギ

メドハギ

子コハギ

マキエハギ

ヌスビトハギ

ヌスビトノアシ

ミソナラシ

クラ

破胡紙

第十八綱

雄莖上分下合
為三四体已上

第三目 多雄莖

ヲトギリサウ

ツキヌケヲトギリ

ヒメヲトギリ

ビエウヲトギリ

トモエサウ

高麗草十四日



草木圖説前篇卷十四

大垣

徳齋

飯沼長順著



草部

第十七綱 下

クサ子ム 合崩

田野ニ自生シ高二三尺。莖圓ノ中空。葉合歡草カハラケツメイニ似テ大ニメ淡綠色。夏秋ノ際葉腋ニ有梗黃花ヲ放ク。形略カハラケツメイニ似タレ氏。此花ハ蛾形ノ態ナレハ。弁萼共ニ不同。兩莢亦異ニノ蛾形花ノ常套ヲ具ス。後莢ヲ結フ。カハラケツメイヨリ大ニヌ。粒形膨起シテ畫界ヲ露ス。依テ每粒莢折折シヤスシ。

第七種

按 *Glycyrrhiza pumila* . 羅 *Kanflin, jahanaklin* . 葡 二略當

氏概標ニ等ニ唇ト云他ノ形狀不容バ難決

草木圖説新編卷十四



黄芪 通名

啓蒙云。此種廣鳴ヨリ傳テ花戸誤テ唐種ト云々。舊根苗ヲ叢生シ莖直上三尺ニ越
 へ。葉ハ木黄芪ヨリ狭ク七八對ヲ以テ一轄ヲナシ。莖葉共ニ微毛茸アリ柄本披針
 狀ニノ外及スル小托葉ニ花梗ノ下ニ針楯ノ一葉等アリ。夏葉腋纏マナシテ花ヲ
 開ク。形色木黄芪ノ花ト同ク。生殖部亦同シ。但等ハ筒様ニノ玉尖起アルト立山産
 ト同ク。蔓本ノ五裂尖ヲナスト異ナリ。又葉ノ味苦ヲシテ甘カラズ。後莖ヲ結ノ長
 ニ寸許狭細ニノ尖リ内ニ扁細子ヲ収ム

第四種 アスタガリス *Astragalus pilosus*. 羅 *haining* *Koethlinii*. 苗

按林氏所載ノ第一ヨリ第十一至ノ種ミナ特生品ナレ氏就中第四種尤的當ナ
 ルカ如シ故掲之



モノシツル

木黄芪

近山住々コレアリ京師北山カ多ク生ス。茎柔弱地ニ塌シ長ク引キ時徑頭ハ葉擺
 葉ノ如ク。大抵五六對ヲ以テ一鱗ヲナシ。柄木ニ至小殆ト雖見一托葉アリ。此種葉
 味甘ノ殆ト甘草ノ如シ。夏葉腋ニ一二寸ノ小茎ヲ出シ垂頭短穗様ニ花ヲ簇生ス。
 形豆花ノ如キノ淡黄殆ト白色。萼筒様五裂尖。子室長角雄莖十莖葯黄色。十七細莖
 二目ノ常套ヲ具ス後莢ヲ結ブ

附 金花部大圖

半十四位

cytherealis glycyphyllos.

羅

Koehleria Koehleriana

商

印葉圖叙
氏圖說共

證可



立山黄芪

茎一二尺柔軟多枝ニノ直立ナラザレ氏。近道所産種ノ如ク地ニ塌セズ。葉苦參ノ
 葉ノ如クノ稍小。大抵八九對ヲ以テ一籍様ヲナス。柄本褐色針状ノ小棘アリ。夏梢
 上穂ヲナレテ花ノリ色淡黄殆ト白色。花形黃葯似類ノ種ト同ジケレ氏。翼弁尤狭
 夫。後扁莢ヲ結フ。長一寸許ニノニ或ハ三ノク、リアリテ每胞黄色ノ一小扁子ヲ
 収ム。根線様長ク引テ柔軟。葉ト共ニ味苦淡ニノ帶甘。此種白山ニ亦多ク産ス。崔葉
 庵ハ駒ヶ嶽ニ於テ此種ノ紫花ナルヲ得ト云

按林氏 ^{アスタラガルニス} *Astragalus* ノ第十一種ヨリ二十八種ニテノ間所載ミナ類似ノ品ナ

レ氏。ソノ内富ノ種ニ於テハ、余未タ決セズ。姑他日ヲ期ス



エゴイランタータツリ

傳云嘉永年間舶來スト。エゴイテンタータツリノ名ハ出所未詳。蓋シ批傳ナラン。
 春下種特生高二尺ニ過ズ。葉鈍披針狀ノ八九對ヲ以テ一鱗ヲナシ未端亦葉アリ。
 小鱗ノ末微凹ニメーノ細尖起。又柄本ニ針狀ノ二托葉アリ。莖葉皆共ニ毛茸アリ。
 秋葉成或ハ葉柄ト對シテ花莖ヲ出ス。一尺許。球穗ヲナシテ花アリ。同。莖葉ニ一ト
 ツク。一處ニ三花ツ、聚リツキ。形鶴^{ヒナ}花ノ如クメ稍小。白質ニノ旗心ニ紅紫色
 アリ。梗本亦針托葉アリ。兩葉子室常歪ニシ。後葉ヲ結フ長ニ寸餘。老褐毛
 ツテ茸々。子ハ楕圓ニノ扁。形蘿蔔子ノ如クメ褐色斑アリ

第八種

アムタラカユス

アムアリス

エニルツラーギフ

ニートコロド

Atragalin nobuyukii 新 *imelblazig kottbunzi* 前

按林氏殊標ノ文的當ナレバ猶他ノ精圖ノ参考ヲ俟ツ



紫花ノレリサウ

山藜豆

春宿根ヨリ苗ヲ生ス。莖高二尺許。兩側葉標ノ薄片箭羽状ニツキテ莖心ヲ扶ム。故ニ薄片莖ヲナス。葉柄亦同形。柄本長短又ヲナス。小托葉アリ。葉披針状ニメニ對。或ハ三對ヲ以テ一鱗ヲナシ。小鱗ミナ上ニ立テ相向ヒ。端未一巻鬚アリ。葉腋花莖ヲ出ス。総ト三稜ニノ三五寸。上ニ蛾形ノ深紫色花ヲ穗状ニ綴ル。子室莢様雄蕊十裂。等似類ト一般

第二十種

ラチルニス

パルエストリス

ニールアンレ

ラナルニス

Cestryalis palliparis.

mesopyge cestryalis.



草木全載
平木全載

黄花ノレンリサウ

伊吹山上ニ多ク。春宿根苗ヲ生シ。形前条ニ略相似テ小。高一尺餘。葉一柄四片ノ如クナレト。ソノ木ノニ葉ハ幹ヲ挟ムノ托葉ニノ。葉間茎ヲ出シ頂ニ二葉ヲ對シ。末ニ卷鬚ヲ出ス。葉卵圓披針狀。色淡綠帶白。托葉ハソノ木兩鈎狀ニ分レ。又茎ハ線條アツテ殆方ナル等ノヲニアツテハ。前条ト大ニ不同レト。花莖ノ形同フノ。只色鮮黄ナルノミ

第十六種

ラキレニ

ラキレニ


ラキレニ

ラキレニ

Lathyrus pratensis

Lathyrus pratensis

■



タニワタシ ナンテンハギ 歪頭菜

山麓原野ニ生ス。方茎高二尺餘叢生シ。夫卵圓ノニ葉短柄ニ對生。中心一小鬚アル
モノヲ互生シ。柄本ニ托葉アリ。ソノ間ヨリ數梗ヲ出シ。每梗十數花ヲ連鎖ス。形イ
ワフヂノ花ニ似テ紅紫色。成實部似類一般。後扁莢ヲ結ブ。一種葉稍小ニノ花及テ
微大。又一種每柄四葉ヲ對生シ。鬚稍長キモノアリ。コレヲヨツバハギト云フ。又丹
後ニハ六葉ナルモノアリ也

所屬未詳



平林堂藏

タニハギ

説出前条下




ヨツバハギ
 説出前条下
 三本并流

コガ子バナ

原野ニ極ノテ多。長尺許ノ数茎地ニ就テ叢生シ。葉一柄五片。本ノ二片ハ茎ヲ挟テ
 托葉ノ用ヲナス。莖頭ニ金黄域形ノ七八花ヲ攢簇シ。後細莢ヲ結テ長サ寸許。熟テ
 褐色林氏云。花ハ香味アリカラズシテ。單零陵香ニ代用スベク。葉ハ以テ青色ノ彩具
 ヲ製スベシ

第十六種

ワトニス
 ミルニクハラトニス
Cotoneaster corniculatus - 草
 ヤクニハナシ
Schomberia volkensii - 草



秋昔ク田野ニ下種シ。形状衆ノ通知スル所。葉卵圓缺頭ノ小葉大抵十對。末端一葉アル鱗様ニノ互生シ。花一撒大抵七花ヲ列次ス。萼ハ紅紫色。萼稍淡ク。龍骨ノ鼻ハ紅紫亦濃クメ。底ハ白色。間。全体白色ノモノアリ。莖五丈。兩葉ノ形似類一般。後三棱ノ細長莢ヲ結ブ。熟ノ黒色。分析ニトナリ内ニ腎藏狀ノ褐色子ヲ收ム。

第九種

Coronilla

shiliv.

Southbloomg


Krombrowl



前条一種

オランダゲンゲ新訂

傳云、此種モト蘭船齋来スル如ノ草實ノ中ニ生ズ。不知真ヤ不ヤ。宿根草ニノ冬、
 猶不全凋蓋地ニ蔓延シ。一帯三葉形苜蓿葉ト一般ニメ。柄亦長ク二三寸アツテ
 互生シ。夏柄ニ對ノ花梗ヲ出ス。四五寸。花紫雲英花ト同ノ。稍小ニメ數多ク環列
 三重ニメ色雪白。萼五尖形亦同シ。附花葉一倍圖



按此種葉ハ苜蓿ノ屬ノ如クナレバ。花形實状ニアツテハ紫雲英ノ屬タルヲ斷
 然タリ。故ニ余之ヲ苜蓿葉ノ紫雲英又オランダゲンゲノ名ヲ下シテコ、ニ列
 ス



乃在原野ニ多ク、秋子生シ。一根叢生茎地ニ布テ一ニ又葉五生形隨軍茶ノ葉ニ似テ小ク。大サ五六分邊ニ細鋸齒アツテ深綠色。春葉腋細梗ヲ出シ細小三五花ヲ結生ス。萼五出花黄色四瓣。亦隨軍茶花ノ如クノ小。子室扁角一柱頭開哆ス。花後扁莢螺轉シ。ソノ外側ニ出ル邊縁ニ柔刺アツテ上下ニサシ出テ状尤奇ナリ。内ニ腎臟狀褐色ノ扁細ニ子ヲ収ム。附 一全花 二子莢共郭大圖

第九種ノ下

ノチカゴ

イニテルテキスタ

ドールウエーシ

スランゲンコロヤ

Milicago integrifolia

Leonurus japonicus

菌

アシゲト

カラー(ヘン)

ノソト

クニコロヤ

クニウエ

Aster klatschanensis

Japonichella kamakuraensis

蝶



Vertical columns of Japanese text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

コメツブゴヤシ 天藍

草状背藩ニ同ノ稍小ニノ莖葉背共ニ微々織モアリ。葉腋花梗ヲ出ス。一寸餘、頂
 ニ十餘花ヲ密着ス。形色亦ゴヤシニ同ノ稍小。花後房ヲナシテ實ヲ結ブ。形橢圓
 ニノ米粒ヲ半截スルガ如ク略半月様ヲナス。故ニコメツブゴヤシノ名アリ。或
 云越中ノ産ナリト顕微鏡ヲ以テコレヲ檢スレバ。一回螺轉ノ略蝸牛殼ノ形ヲナ
 ス。附 花並實部大圖

第六種

melitago paltata 華 *peorum repiklaet* 華
hill klakum of klym stem klakum 華



レノンガル 草零陵香

蘭種ニノ漫ニレハシゲルノ名ヲ称ス。何等ノ訛轉ナルヤ未詳。苗高二尺餘。葉一柄
 三箇形。首葉ノ大ニノ互生シ。小葉アリ。淡綠色。葉腋枝ヲ出シ。柄葉腋毎
 ニ花アリ。一梗長ニ寸許。頭ニ數十花。鱗次簇聚シテ球ヲナス。萼瓣共ニ城形。花ノ常
 態ニメ淡藤色。于室角様十雄蕊。此草生鮮ノ時ハ香微ク。乾後佳香ヲ出シ。林氏云。
 烈香アリテ味辛苦。實尤然リ。花ノ露水ヲ以テ他ノ香料ヲ扶クベク。又花ヲ以テ軟
 和ノ質劑。布水。銚劑トナス。ソノ性酷烈ナルヲ以テ。醱膿ヨリ開發。驅散ノ力多レ
 又カミル。レト共ニ煎服ノ。血痢痛腎痛結石ホニ功アリ。 附全花那大圖

チリホリニム
tryfolium ノ第一種

ノリロトニス
mulotis caribea 華

アラウケ
blauke mulote 菊

ローニズデー
lungetylan

ニロイドト
swill 鮮氏



エヒラハギ

草零陵香一種

武州ニ自生シ。葉レノシダレノ如クノ托葉亦アリ。實生ニ年々ニ茎高五六尺ニ至
 リ多ク枝ヲ分チ及枝梢ニ穂ヲナシ黄色蛾形花ヲ放ク。後實ヲ結フ楮圖ニメ鈍稜
 アリ。梗ニツキア下ニ向フ。草微香アレモレノシダレニ不及。附全花及熟子亦大
 圖

第四種

ノリロトエス

multilobus officinalis

羅

カサネケニス

multilobus platanus

蘭

録氏圖說可證

カサネケニス

multilobus platanus 録氏



車軸サウ

木曾山原ニ生ス。宿根茎高一尺許。葉鈍披針狀ニメ至細ノ鋸齒アリ。肋脈分明離脈
 草ノ葉ノ如ク。五葉一蒂柄鞘様ニメ莖ヲ包ミテ互生ス。ソノ五小葉相並ノ形半輪
 ノ如キヲ見テ。車軸サウノ名ヲ下ス。秋梢葉腋花莖ヲ出ス。二寸許。頂ニ五七花ヲ
 並列ス。萼筒様五出細メ針ノ如シ。半開城形花。色淡紅紫又白色ノモノアリ。生殖部
 似類一般

第八種

チリホリニム ルニヒンツステル
Trifolium lupinaster . ルニヒナタチ
 草 *lupinastigae Kludke* . カウー
 前



胡蘆巴

苗高二三尺葉一蒂三葉ニノ首^{マゴヤシ}葉ニ似テ微^ヤ葉ノ互生。柄本尖鱗状ノ小托葉アリ。
夏葉腋毎ニ二花併出ス。萼鐘様針状五出。花瓣形。萼大ニノ龍骨尤小。白色ニメ微黄
ヲ帶ブ主用藥鏡ニ載ス

十種

ナリコトヒテ

ノイニム

カレクニムカサリマ

キーニムカサリマ

Trigonella pavonum . 葉

galiumjugoslavanicum . 葉



此は胡蘆巴の葉と花の図である。

ハキ 胡枝子

山野ニ多ク自生シ高五六尺。葉生多ク枝垂ヲ分ツ。ソノ幹ハ冬全ク枯レズ。故ニ年々経ルモノハ。頗ル粗大ニシテ灌木様ヲナス。林氏ハ灌木ノ内ニ収ムレドモソノ属種ハ葉一柄三箇葉尖ニ軟毛刺毛。柄本ニ細尖托葉アリ。秋葉腋梢頭共ニ多花房ヲナシテ放久。葉腫様四尖。上者大ニシテ尖微クニ裂。花形クサフチノ花ノ如ク。色紅紫。兩葉似類一般。後扁莢ヲ結ビ内ニ一子ヲ収ム。此種莖ニ剛立。山中ハ多クハ剛立。高丈ニ餘リ。舊年ヲ経ルノ久キ者ハ。尤葉撓。人家敷ルモヤギト稱ルモ。粗大トナルニ至レドモ。葉ハ却テ細カナリ。如ク中ニヤギト稱スルモ。ハ。枝ニヨルモ。枝梢花候ニ早晩。秋花ヲ放フ常性トス。ソノミヤギト稱スルモ。長ク全シテ地ニ引ク。花候ニ早晩。中夏ニ花アリ。此種は々秋ニ至テ再ヒ花アルモ。リノ花色ニ濃淡間白。又純白色等ノ種々アリ。又御嶽等ノ高山上ニハ。高僅ニ二尺許ニシテ花カタマリツクモノアリ。人家普ク栽テ花ヲ賞シ。ソノ名ヲ別ツテアルモ。葉状花形ニ大異アルヲナシ。故ニコ、ニ一々セズ。附 一子室并柱 二葉共卵

大圖

第二十一種

テロカカシ

マルゲルニユナナフ

ハナサレニ

Lespedeza bicolor Karst. 春正所定

按西勃氏ハ惣テハギノ類ヲ *Lespedeza* ノ属トス。今ソノ名ノ所出ヲ知ラス。故ニ按之ルニ由ナシ



イヌハギ

往々原野ニ自生アリ。全形胡枝子ニ似テ強ク高四五尺。葉亦黃背ニ褐色毛茸アル
 一畝豆ノ如ク。七八月枝梢ニ穂ヲナシテ花ヲ放ク。形ハギノ花ノ如クノ小又豆花
 ノ如クメ微大。白色ニノ其心ニ紅線條アリ。

ハナサレニム
 トメノトメニム
Halimolobos japonica、春氏



草木部
 三
 五木部

メトハキ

鐵掃帚

原野ニ自生多ク。高二三尺。葉^{ハハギノ}葉^{ハハギノ}維^{ハハギノ}服^{ハハギノ}草^{ハハギノ}葉^{ハハギノ}ニ似テ一柄三葉ニメ互生。梢ニ多ク枝ヲ分
 チ。每葉腋一花ヲツク。形ハギノ花ニ似テ小。白質ニメ紫條アリ。又一種葉頭ニ紫斑
 アルアリ。莢亦胡枝子ノ莢ニ似テ小。附全花部大圖。一種ハハギ又ホクルハギ
 ト云アリ。葉モ小ニノ密簇シ多クハ一葉間三葉ナルヲ交ニ。花實ニ異アルヲナ

ハハギノ葉
fulgens javanicum
 春氏



二二二
 木全成

子コハギ

原野ニ生シ。細茎地ニ布テ二三尺。葉互生形胡枝子葉ニ似テ小。莖葉共ニ毛茸アリ。
 秋毎葉腋ニ花ツ、著ク。形胡枝子花ニ似テ小。白質ニシテ蕊心ニ紫點アリ。

ハナナニニム
 ヒロクニム
Lathyrus pilosum

春氏




マキエハギ

原野ニ生シ。莖細メ剛ク高一ニ尺。葉胡枝子^{ハギ}葉ニ似テ小ニノ剛ク。背ニ微毛尖ニ軟刺ノ一毛アリ。秋稍葉腋ニ纖細糸ノ如キ一莖ヲ出シ。末ニ二三花ヲツク。形胡枝花ノ如メ小。白質淡黄暈。旗心ニ紅條アリ。萼鐘様ニメ五裂。尖銳尤長シ。後扁圓ニメ尖リタル一莢ヲ結ビ。内ニ一子ヲ收ム。附全花一倍圖

ハキサルニム

按ニ *Halimolobos* ノ属ニ外ナラザレト種名未考



スズビトハギ ヤブハギ 山菜豆一種

原野藪陰ニ多ク。茎木様ニメ線條アリ。葉互生。卵圓ニメ尖リタル三箇一蒂。長柄上ニアツテ略胡枝子葉ノ如ク大ニ。微糙滑アレモ毛茸ナシ。秋梢上枝ヲ分チ穂ヲナシテ花ヲ綴ル。花形萼状等ヲデカンサウノ花萼ノ如ク小。蒸餾粉紅翼紅紫。後實ヲ結。亦フデカンサウノ實ノ如ク小。一種葉頗潤脚葉ニ在テハ殆ト大豆葉ノ如ク微毛茸アルモノアリ。邦俗コレヲヤブマメト云。又一種白花ノモノアリ。花葉ノ形ハ一般ニノ微大ナルノミ

Halimolobos halimifolium 春氏

按林氏 *Halimolobos paniculatum* 今下ニ所説日本ヨリ得ル乾草ナル

モノ即本条ノコラサスモノノ如シ又モエンチング氏可載ノ *Halimolobos*
paniculatum *amurensium* or *halimifolium* *nit amurensis* Nutt
Halimolobos purpurachitiga Blum. 一ノ説亦的當メ



平水全載

又スビトノアシ

フザカンザウ

山菜豆

山野ニ宿根ヨリ生シ。高四五尺。葉卵圓披針狀ノ五或ハ七小葉ヲ以テ鱗様ヲナシ
 ラ互生ス。莖葉共ニ繸沙。梢ニアツテハ粘リアリ。夏秋ノ際。莖葉腋共ニ枝ヲ出シ
 繸狀ニ花ヲ綴ル。各處ニニ花ツ、並ヒ一針狀葉アツテ護之。花形胡枝花ニ似淡紅
 色ニノ。莢花心ニ立ツ。莢四狀ニノ五尖後扁莢ヲ結フ。形三角様ニノ連續スル。又
 スビトハギノ莢ノ如ノ大ナリ。繸沙粘稠物ニ著テ脱シガタシ

ハナナルニム

ラセモスニム

Hybanum vulgatum

春氏所名西勃氏定之

按林氏

Hybanum

vulgatum

三十九種ヨリ下所舉ノ品ハミナ鱗葉ナレバ。本余モソ

ノ屬タルベケレト。未ク正當ノ種ヲ詳セズ



ミソナヲシ

ミソクサ


灌木様草ニノ高二三尺。葉一柄三葉形恰モ木豆ノ葉ノ如ク。表深綠色ニノ滑沢。背淡綠色。柄差扁ニノ末ニ至ルニ徒テ微廣シ。夏晩梢頭葉腋ヨリ花莖ヲ抽ク。一四五寸。有梗蛾形ノ細花ヲ以テ穂ヲナス。莢赤淡黄異龍骨ホハ白色淡黄暈アリ。莢似類一般。後長莢ヲ結ビ實ヲナス。

ハナサユム

カニダトユム

Hygissimum caudatum

春氏所名西勃氏定之



山野ニ多キ宿根草ニノ。直立三四尺。葉ハ槐葉ニ似テ小。夏月莖梢穂ヲナシテ花ヲ
綴ル。形赤小豆花ノ如クノ淡黄綠色。後角ヲ結フ長サ二寸許。又淡紅紫花。白花亦ア
リ

第六種

ソボラ
Lophosia leptophylla

セーフェンラナーナ
Strobilanthus leptophyllus 蘭 春氏定之

接 ^{ソボラ} *Johanna* ハ灌木ニソツノ条下林氏ノ可説ヲ聞ルニ。幹ノ太サ腕又ハ脚ノ

如ク枝ニ毛茸アルノヲ載レハ。本条ニ的當ナラサル如シ西勃氏已ニ駁之テ
木条ヲ ^{アモル} *amorphia* トス。今又ソノ条ノ概標ヲミルニ。花域形ノ異態ニノ只籜母

ノミニノ翼龍骨ノニ并ツ具セズトアレバ。亦允当ナラザレト印葉圖所載


ノ ^{アモル} *amorphia* ^{アモル} *fruticosa* ノ形恰モ相似レバ疑フベカラザルカ



破胡紙 通名

苗高三四尺。葉心減狀ニノ尖リ皺紋鋸齒アリ。柄本ニ小片托葉アリ夏秋ノ際。葉腋ニ一寸餘ノ花莖ヲ出シ。蛾形ノ小花ヲ房様短總狀ニ簇生ス。大サ一分餘。旗大ニ翼龍骨共ニ小。色淡紫龍骨頭暗紅紫萼五裂ニノ下裂尤長ク。子室推子狀。兩莢蛾形花ノ常套ニ不外 附 一 全花 二 萼并莢部大圖

按此種蘭船載ルアリテランダビユノ和名アリト傳フレレ余未詳蘭名



草部

第十八綱

雄莖上分下合
為三四体以上

ポリアデルセラ
Polypodium

第三目
多雄莖

ヲトギリサウ 小連翹
莖直上ニ三尺。葉鈍披針狀ニノ對生。兩葉近相接メ莖其中心ヲ抽キ。殆ト葉心ヲ穿カ如ク然リ。莖頭稍柔膜共ニ枝ヲ又分シ花ヲ簇生ス。萼五片花五弁披針狀黃色。子室椎子狀ニノ三柱。頭帶紅色。雄莖幾多ニノ本併合四五片ヲナシ。約黃色ニノ暗黒ノ一細点アリ。又弁萼共ニ暗黒ノ細長点。葉背ニ圓細点ヲ分布ス。一種好ラ溝側ニ生シ。草小ニメ花ハ小ナラザルモノアリ。又蒸野山中ニハ。莖一尺許ニメ直上セズ地上ニヒロカリ。多ク枝ヲ分ナ。葉披針狀ニノ本ヒロカラス。花小ニメ生殖部柔莖葉等ノ周縁ニ黒点アルヲ。亦同シキモノアリ 附兩莖四倍圖

ニメリクニム
Hyptis suaveolens

春氏

按ニ *Hyptis* 屬 多種ナル。ヲトギリサウモツノ屬

タルヲハ勿論ナレ氏。林氏所奉ノ種中ニ的當ナルモノナシ。故ニ春氏別ニツノ種名ヲ下セリ。然レ比オトギリサウノ花葉ニ紫黒ノ細点アルヲ。弟二十一種ナル *purpuratum* 種 *gymn.* 屬ナル專ラ藥用トスル品ノ形狀ニ同ケレハ其

功用亦遠カラザルベシ。宜ク代用スベシ。主能藥鏡詳之



ツキスケオトギリ

前条ノ一種ニメ。兩葉本併合シ茎ノ中心ヲ貫穿シ。花差小ニメ。瓣濶短。瓣上ノ紅
点ナクタ、藥上ノ一点アルノミ。子室兩葉ノ形全ク同シ



此種は葉の形が前条と異なるが、花の形は同様に中心を貫穿する。子室の形も同様である。



ヒノオトギリサウ 小連翹一種

春夏庭際陸地ニ生シ。高五七寸肥者ハ尺許ニ至リ。莖細メ方。葉細メ短全形オトギリサウト同メ小。夏花アリ花萼亦同形ニメ小。色深黄。子室長椎子狀頭三裂ニノ微ク反シ。雄莖大低十三五茎又此一種ニ形尤小ニメ高僅二三寸ニ不過モノアリ之ヲコケラトギフサウト云

Hypochaeris japonica 春氏

Chrysanthemum japonicum 又 *Chrysanthemum japonicum* 鐘氏

按林氏物印滿氏共ニ小葉ノ品數種ヲ載ントモ本条ニ的當ナラズ只鐘氏所奉ノ圖尤允當ス故ニソノ名ヲ掲ク



白山産小葉大花ノオトギリサウ

茎高五七寸叢生シテ枝ヲ分タス。卵圓ノ小葉對生シ。頂ニ一花ヲ開ク。形オトギリ
サウノ花ノ如メ稍大ニ。子室推子狀ニノ三柱。雄蕊綫多ニノ長ク花瓣ニ有ク。惣テ
黃色。此品オトギリサウノ一種ナレトモ。花頗ル大ニ雄蕊長ク。殆ト金絲桃ノ葉生
ナル如シ故ニ名府ニゴエウヲトギリノ名アリ

ヒメスス スニロヤム
Hypnicomon minus japonicum.

アレーキ ニロイハ
Klein kumpaku 蘇 物印
滿武

按林氏第十五種 *Klein kumpaku* ナルモノ亦同物ナラン然林氏ノサス処ハ蘇野
産小葉品ナルヲ亦知ルベカラザレバ一定シガタシ



蘇野
産小葉品

林氏第十五種

蘇野産小葉品

方莖高三尺ニ過。葉オトギリサウニ似テ大ニ。二葉相併接シテ殆ト一葉ニノ。莖ノ心ヲ貫クモノ、如シ。莖梢枝ヲ分チ頭ニ花ヲ開ク。大サニ寸許。五瓣裝績アツテ各九ニ子デレ。俗間所稱ノ子ヂムメノ形ヲナス。色淡黄。子室椎子状ニメ。純五稜頭。延テ一柱頭五裂シテ外反シ。雄莖幾多。

按草形オトギリサウノ大葉ナルガ如メ殆ト穿心ノ花ノ大ナルト。雌莖ノ一柱五裂ナルニ在ツテハ。金絲桃ニ同シ。西書中の當ノ種名ヲ未考。



草木圖說前篇卷十四



卷之十四

○十一

草木圖說

