

草木圖說前篇 草部

十九綱上

十五

植物

植物學

二〇 一八

學校 中 館

植

三

470.3

537

Vol. 15





草木圖說前篇卷十五目錄

草部

第十九綱上

雄英為  
輪様

第一目上

均等多  
雄英

千シヤ

キクチシヤ

キクニガナ

同一種

ノケシ

カウヅリナ

ハチジヤウナ

黄金サウ

タシボ、

ヤナギタンポ、

秋ノ、ゲシ

同一種

スイラシ

ニガナ

チシバリ

イハニガナ





ハマニカナ

ムラサキニガナ

フクオ、サウ

ウスベニ、カナ

ワダン

アセトウナ

オニタビラコ

ヤブタビラコ

牛房

ノアザミ

オホアザミ

ヤハスアザミ

タカサゴサウ

同一種

オホニガナ

ヤクシサウ

タイレンサイ

ハマナレン

コオニタビラコ

ジヤカタラズイセン

ヤマゴボウ

ヤマアザミ

ハマアザミ

ヒメアザミ

サハアザミ

テウセンアザミ

キツ子アザミ

キクアザミ

漢種白本

ヲケラ

ベニバナ

ヒヨドリバナ

タウコギ

センダグサ

ヤブタバコ

シウブンサウ

マアザミ

ヒメヒゴタイ

ミヤコアザミ

ホクチアザミ

漢種蒼木

同本曾産

フチバカマ


サハヒヨドリバナ

同一種

同一種

ガントビサウ





草木圖說前篇卷十五

大垣 愨齋 飯沼長順著

草部


第十九綱 上

雄莖為 輪株

シンゲ子シヤ *Myrsine*



按此綱ノ花ハ木ト小筒子ニホ一辨ヲナス  
 ノ簇聚ノ一花輪ヲナスモノナリ故ニ聚成花ノ名アリ  
 三様アリ全者ハ小筒子中ニ雄莖輪株ニ併母ノ筒子中ニ中心ヲ  
 貫キ莖上ニ出ラツノ雄者ハ只輪株ノ雄莖ニ中心ノ雄莖ナク雄者ハ輪株ノ  
 雄莖ナク特リ雌株ノ小筒子中ニ立ツモノコレナリ而シテ又茲ニ六日アリ一輪花  
 中ニ聚ル所ノ小花皆全花ナルアリ一又中央ニ全花ニノ周邊ニ雄花アルモノ  
 一又中央ノ全花ニノ周邊ニ無雄花アル者一又中央ノ雄花周邊ハ雌花ナル  
 者一又ソノ小花毎ニ各一子室ヲ具スル者一又已上ノ五目ノ聚成  
 花ナル例トハ全ク別ニメ只五雄莖花頭ニツキソノ雄頭輪株ニ併合シ一雌  
 柱コレヲ貫ク者一六等ナリ宜ソノ各目下ニ就テ特規弁別スベシ





均等多  
雄莖

チシヤ 千サ 萬世

普ク食料トナシ多。蔬圃ニ栽テ衆ノ通知スル品ナリ。秋下種シ根葉因夫。莖葉ハ心  
 蕨状ニノ莖ヲ排レテ尖銳。春末梢頭枝ヲ分チ花ヲ著ク。萼鱗様重複。小全花ノ聚成  
 菊花様ヲナシテ黄色。子室參粒状熟ノ扁長灰白色。冠毛アツテ茹トナル其類數種  
 アリ。吾邦邊所載ノ普通種ノ葉色緑ナルハ。林氏ノ所謂 *gambon jalala* ナル  
 者。又新葉ノ莖帶紫色ニムラサキチサト云ハ。林氏ノ所謂 *gambon jalala* ナル  
 未和米ノ葉短潤ニノ邊縁波紋ヲナシ色淺緑帶黄ナルハ。林氏ノ所謂 *gambon jalala* ニ  
 ミナ林氏 *gambon jalala* ノ種中ニ収ル所ノモ、ナリ無毒ノ食料ニノヨ  
 ク消化シ大便ヲ通ス。性差清涼ナルヲ以テ。胆汁性多血質ノ為ニ不利アリ。草汁并  
 根汁皆苦澁ニシテ阿芙蓉ノ臭アリ。製シテ麻醉ノ劑トナス。茶性諸書ニ見ユ。子ハ  
 清涼子内ニ算メ胸病淋痛ホノ諸症ヲ緩和スルニ用ユ。附 一全花 二子室并  
 柱共鄒大圖

第二種  
 ラットニカ サトニヤ  
*Lactuca jactata* 葉  
 ガラアノチ サラアノチ  
*gambon jalala* of *Scop jalala* 葉

草木圖譜





キクヂシヤ

ハナヂシヤ

カラシヤ

葛草一種

秋種ヲ下シ春ニ至テ繁茂ス。葉質葛草ノ如シテ。邊縁尖鋭不齊ノ缺刻細齒アツテ  
 皺積波紋ヲナス。其末ダ伸長ナラザルノ際ニアツテハ。簇々聚縮シテ大ニ葛草ト  
 不同。已ニノ莖ヲ起ス。莖ニツク葉ハ皺積漸ク少ク。頗ル長シテ尖鋭ナラズ三四月  
 疎ニ枝ヲ出ス。梢葉ハ小ニモ幹ヲ抱キ殆ト三角形ヲナシ。葉腋毎ニ二三ノ無  
 梗花ヲツク。毎花必ス一小葉アツテ護之。花間又一梗ヲ出ス。長一二寸或四五寸。頂  
 ニ一花ヲ開ク。ツノ梗上花ニアツテハ護葉ヲ缺ク。莖重復外ナル者五片卵圓ニシテ  
 尖内者十葉披針狀。花ハ菊様ニシテ大サ一寸許。第十九網一日ノ常套ヲ具。即聚成  
 中心邊縁共ニ兩瓣二十許。端齒様ヲナス。蒲公英ノ瓣ト一般。色淡紫ニシテ頗ル美  
 也。實礎上冠毛ナク。タハ鱗狀ノ細片數多ヲ以テ代之。以一瓣郭大齒諸支ヲ示ス。此  
 種並次糸種共ニ性前糸種ト同。石鹼竹若多キヲ以テ。解凝利尿緩下清潔ノ能アリテ。胆  
 病黃疸ホニ稱用シ。又壞血病腸胃諸病及飲食消化ノ為ニ利アリト云。



キクヂシヤ

ハナヂシヤ

カラシヤ

葛草一種



キクニガナ 京

前条ノ一種ニノ形状大同小異。彼ニ比スレバ。葉稍長ノ尖リ大缺刻ヲル<sub>ル</sub>。蒲公英<sub>ノ</sub>又蘿蔔等ノ葉ノ如ク。根葉ニアツテハ缺刻ヲ必トセサレ<sub>ル</sub>。前条葉ノ潤短級積アルト不同。摘葉ニ至ツテハ。前条ノ如クナレ<sub>ル</sub>。稀長クノ花間梗ヲ出<sub>ル</sub>。茎并葉縁ノ軟毛差<sub>多ク</sub>。花莖實状ニアツテハ一般ニナシ。西書中此種ニアツテハ。宿根スト云余未<sub>檢</sub>

唐二種

シヨレユム

インナブユス

ウサレテ

ツイケレ

*Lichotum*

*sittibae*

羅

*rhille*

*juikany*


蘭





前条一種

此種キクニガナノ種中ニ出ルモノ、如シ。葉形前条ト同ケレド。脚景梢葉共ニ皺積アツテ。一見シテソノ缺刻アルヤ否ヲ辨シガタキニ至ル。軟毛前条ヨリハ少ケレド。キクヂシヤヨリ多ク。花實ノ形同ケレド。花色稍紅ニ過キ。瓣ニ些少ノ暗紅點アリ。蓋シツノ変種ニ出テ。キクニガナ。キクヂヤノ中間ナルモノ、如シ。已上三種ミナ蘭種ニカ、ル



前条一種

此種キクニガナノ種中ニ出ルモノ、如シ。葉形前条ト同ケレド。脚景梢葉共ニ皺積アツテ。一見シテソノ缺刻アルヤ否ヲ辨シガタキニ至ル。軟毛前条ヨリハ少ケレド。キクヂシヤヨリ多ク。花實ノ形同ケレド。花色稍紅ニ過キ。瓣ニ些少ノ暗紅點アリ。蓋シツノ変種ニ出テ。キクニガナ。キクヂヤノ中間ナルモノ、如シ。已上三種ミナ蘭種ニカ、ル



五木在哉



ノゲシ 春ノハゲシ 苦菜

秋實生ス。葉薊葉ニ似テ柔軟。白色ヲ帯テ碧葉ノ如ク。茎ニ青色ト帯紫色ノ二種アリ。共ニ稜條アツテ中空。莖葉ヲ切レバ白液ヲ出ス。春ニ至テ高三四尺。葉ヲ互生シ枝ヲ分チ花ヲ開ク。萼鱗様重複。花黄色形蒲公英ニ似テ小。後白絮ヲナス。亦蒲公英ノ如シ。枝梢萼共ニ短刺毛アリ。一種花白色ニシテ中心微黄ナルアリ。一小花ノ邪大圖ヲ以テ諸事ヲ示ス。阿須氏云。單蔬菜ノ用ニ供シ。搾汁ハ内臓及腺ノ壅塞ヲ治ス

第四種

ワレリユス ヲレラセユス

ハーニコロイダハ *Juncus olivaceus* 耶 *maackii*

メルクダス

西勃氏所定阿須氏圖亦可證

按阿須氏所圖實確有無ノ二花アリ可疑





高二三尺。葉五生形<sup>トゲ</sup>旋覆花<sup>トゲ</sup>葉ニ似テ大ニノ尖銳。邊縁疎ニ尖鋸齒及纖毛アリ。莖並ニ葉ノ中筋上等ニ刺毛アルヲ苦菜ノ如クノ剛ク。莖葉ヲ切レバ白汁ヲ出シ味頗ル苦シ。葉腋枝ヲ分チ三月花アリ。萼ニ重外ナルモノハ内ナルヨリ短ク。背ニ褐色ノ短刺毛アリ。花黄色形苦菜花ニ似テ垂ノ重リ差少ク。冠毛ノ形亦同シケレバ子ニ横ニ縮紋アリ。以鄒大圖示之。又御嶽駒ヶ嶽等ニハ形至テ小ニノ宿根スル一種アリ

ビトリリス ヤホニカ

*pisces japonica* 春氏

ソシタス

按鐸氏ノ *janchin* ノ身ニ種

ステーヤシデ *stentata*

ソシタス *janchin* ノ圖說本条ニ的當ナル如

シ春氏ノ説イカ





ハチジヤウナ

余未タ産地ヲ詳ニセズ。根葉厚クノ<sup>トウ</sup>蔘<sup>ノ</sup>如クノ小。又ワタンニ似テ大ニ細鋸  
 齒アリ。春莖ヲ抽ク<sup>ト</sup>三四尺葉ヲ互生ス。形蔘葉ノ如ク少<sup>シ</sup>茎ヲ擁シ。西深緑背白緑  
 色。断之バ白汁ヲ滴ス。夏葉腋枝ヲ出シ梢頭分叉シ每頂花ヲ開ク。萼尖鱗様ニノ重  
 復。花缺筒子ノ重複ニノ黄色。恰モ苦菜<sup>ノ</sup>花ノ如ク。子室上冠毛亦アリ

ソシクニス


按 *Sorochu*,

ノ属ニ可収モノ、如シ種名未考又云鐸氏ノ

*Lele*

*Sorochu*

*San japonica* - *Sing H.* ノ圖說亦的當ナルガ知シ併考フベシ





黄金サウ

亦産地ヲ詳ニセズ。葉油菜葉ニ似。厚ノ剛ク不齊ノ粗居莖アリ。葉心臺ヲ抽ク一  
 尺余。数葉ヲ互生ス。葉邊緣背ノ中筋。莖並ニ萼背中道等ニ暗紫ノ細刺毛アリ。夏  
 莖頭一花形蒲公英花ノ如ク多瓣深黄赤色。瓣莖子室冠毛ノ状蒲公英ト同ク。尺冠  
 毛親ク子室上ニツキテ。蒲公英ノ冠毛子室ト相間ツト同ジカラズ。又莖葉ヲ切レ  
 バ白汁ヲ出ス。亦同ク。萼ハ純披針状ノ数重鱗次ニナル

按林氏第一種ニ載ル

*Janchis mansibianus*

*Kuhants mullerianus* 菊

ナルモノニ的當ナル如シ。猶他書ノ参考ヲ要ス



本草綱目卷之十五 十九 黄金サウ  
 亦産地ヲ詳ニセズ。葉油菜葉ニ似。厚ノ剛ク不齊ノ粗居莖アリ。葉心臺ヲ抽ク一  
 尺余。数葉ヲ互生ス。葉邊緣背ノ中筋。莖並ニ萼背中道等ニ暗紫ノ細刺毛アリ。夏  
 莖頭一花形蒲公英花ノ如ク多瓣深黄赤色。瓣莖子室冠毛ノ状蒲公英ト同ク。尺冠  
 毛親ク子室上ニツキテ。蒲公英ノ冠毛子室ト相間ツト同ジカラズ。又莖葉ヲ切レ  
 バ白汁ヲ出ス。亦同ク。萼ハ純披針状ノ数重鱗次ニナル



原野路傍ニ多ク。冬ヨリ多葉叢生シ春ニ至テ莖ヲ抽テ連々花ヲ開ク。一莖一花。萼狭長多片ニ重ニ並列ス外者短。内者長共ニ尖微ク勾リ。ツノ短者ハ、勾背尖起シ戸頗ル三角形ヲナス。花瓣ハ頭ニ尖細五齒アル缺筒ニノ。大小重疊鱗次シ菊花ノ形ノ如ク。子室麥粒状ニメ冠毛白色。一柱長クノ頭為又。花後萼片盡ク及下シ裸抹上ニ織毛絮冠アル熟子ヲ滿布シ圓柱様ヲナシ。尋テ飛散ス。花色ニ黃白ニ種アリ黃者ハ莖葉短小ニノ瓣黃共ニ深黃。白者ハ葉柔ニノ長大瓣白色共黃色。冠毛黃者ヨリ微長シ。其他筒瓣或ハ緑花等ノ多種アリテ。葉形亦不同ナレハ毎年ニ暇アラマ。諸種ニテ莖葉根共ニ白汁ヲ出シ。味苦ケレハ煮食ニ堪ユ功用茶鏡諸書ニ詳説アリ

附 一 瓣莖實破 二 熟子共ニ倍圖

第一種  
 レノドレン      タラキアタニム      ゲラアチ      パールダブルム  
*Leontodon tataricum.*      華 *Gaebone pambollicum.*      蘭





ヤナキタンホ

木タンホ

アザミタンホ

茎高二三丈。葉柳葉ノ如ク大。味々夫細録蒿アリテ互生ス。茎葉共ニ強ク糙沙アル  
 一シラヤマギクノ如ク。而モ新之ハ嫩ニ白乳ヲ出ス。六七月梢頭葉腋亞ヲ分チ。每  
 頭一花ヲツク形蒲公英花又苦菜花ノ類ノ如ク。黄色缺筒子花ノ重復邊。線大ニ中  
 心小。生殖部一般ニノ冠毛亦アリ

按ニ此種花形蒲公英ノ如クナレニ草状大ニ不同メソノ属ニ収ムベキモノ  
 如クナラス今林氏 *Psacaleblaua* ノ下ヲ闡ルニ似類ノ種ヲ俵スモノ  
 如シ故ニ姑ク之ニ附ス





秋ノゲシ

草状春ノ、ケシニ似レドモ。葉本茎ヲ抱クヲ浅ク本狭ク末廣ク缺刻深ク分裂甚  
 甚ノ略鱗葉状ヲナス。此種葉形変態不一又梢ニ至ツテハ狭長ニシテ全ク分裂ナキ  
 モノ多シ。茎葉共ニ毛ナク切テ白液ヲ出ス秋ニ至ツテ梢葉腋花茎ヲ出シ、多ク分  
 亞シ花ヲ綴ル。亞本ハ勿論ノ他処々ニ細鱗葉アツテ護之。萼長短鱗次、花缺筒子  
 様ノ單瓣。大低ソノ色淡黄。後萼開及ノ扁黒子上冠毛アツテ茹トナルヲ春ノ  
 ノゲシト同シ 附一ハ花部大圖

華五種

アテナニテス

ランシニテタ

ゲスニラニド

キニツギブロー

*Pteranthus lantiniata*

*garrispua*

*ruikblom*

按林氏花五辨トスルモノハ。本邦ノ乾腊葉ヲ見テ説クモノナレバ。或ハコレ  
 ヲ誤認セシニヨルカ。又此種ノ五弁花ノ品アリテソノ種ニヨルカ不詳レト。草  
 状惣テ的當ナレバ不容疑





草形前種ト同シケレド。莖高ク大低丈許ニ及ビ。葉根脚稍共ニミナ披針狀ニメ分  
裂ナク大ナルハ長尺許幅寸餘。邊緣微細齒アリ。秋花ノ開ク下亦前種ニ異ナラズ。  
只莖尤高葉無缺狭長ナルノ殊標アルノミ

第一種

フレンチス

テノイホリア

スゴララチ

ミヨウフルム

按林氏 *Prunanthus trispaliu.* 及 *amblylois Kuntblum.* 者

ノ下所説ノ形状本条葉ニ次条ニ彷彿タレド簡ニメ不審且花五弁ト云ニ嫌アリテ他ノ参考ヲ不得バ決シガクシ故ニ記シテ俟後日之断





スイラン

山足原野好テ湿地ニ生ス。葉狭長幅四五方長尺餘秋葉開蓋ヲ抽ク細ク長クニ  
 二尺肥大ナルハ三尺ニ及ブ。數葉ヲ五生シ。葉腋枝ヲ長ク出シ。各頂一花ヲ開ク。等  
 弁共ニ上条ノ如ク鮮美可看。莖實礎冠毛等亦同シ。

説書前条下





ニガナ 黄瓜菜

路旁ニ生シ葉長柄アツテ濶サ五六分長二三寸。色淡緑帶白ニシテ葉多ク邊縁  
 岐ヲナシ。或ハ刺様ノ形ニ分レ。或指圓ニシテ尖リ。或ハ葉心紫黒又細點ヲ布キ。或ハ  
 莖葉殆ト紫黒ナル等種々アリ。皆一根叢生春莖ヲ起シ高一尺餘。葉五生シ枝ヲ  
 分チ花ヲ開ク。萼筒様五裂。本ニ鱗様細片アリ。花五瓣黄色異黃質黒褐。實硬指圓缺  
 筒子花ノ常套ニシテ大サ四五分。莖葉共ニ白汁アリ。往々萼六裂花六七瓣ナルノ種  
 アリ。又五瓣白色ノ種アリ。又高山上ニハ花葉共ニ同フメ小ナル一種アリ。附辨  
 實硬兩葉四倍圖

*Purranthus dentata* グレナチナス 春氏

按鐸氏所載ノ *hirsuta* コロイト ハミナ黄花菜ノ類ニシテ就中其第四種ノ


*hispida* カレコ 房五種、*alluvialis* アルルイカレインステ ナル者ハ本条種ニ的當セリ宜併考





田野庭際ニ多ク。細根土中ニ蔓延シ。処々ニ一葉或ハ数葉ヲ生ス。形黄<sup>ニ</sup>花<sup>ニ</sup>葉<sup>ニ</sup>似  
テ長シ。二三月兼開莖ヲ抽ク。四五寸。二三枝分シ各頭花ヲ放ク。萼筒様ニシテ八裂  
花形差大ニシテ黄色蒲<sup>ノ</sup>公英<sup>ノ</sup>花ノ草ナル如クニシテ二十許亦並列ス。實硬莢状黄<sup>ニ</sup>瓜<sup>ニ</sup>菜<sup>ト</sup>  
同ク。亦切テ白汁ヲ出ス。白山ニハ白花ニ紫點アルアリ

プレトニテス *Pumantus* デビリス *Debilis* 春氏





山中礫确沙石ノ間ニ生ス。形状上条種ト同フシテ惣テ瘦小ナリ。蓋シ同種ノ葉小ナルモノニカ、ル



山ノ中ノ礫石ノ間ニ生ス

花ノ形ハ上条種ニ似テ

葉小ナルモノニカ、ル



十餘年ノ昔ニ見テ、其ノ時ニ於テ、

此ノ花ノ名ハ、山ノ中ノ礫石ノ間ニ生ス

花ノ形ハ上条種ニ似テ、葉小ナルモノニカ、ル

其ノ時ニ於テ、此ノ花ノ名ハ、山ノ中ノ礫石ノ間ニ生ス

イハニカナ



ハマニガナ

ハマイテウ

剪刀股一種

海邊沙上ニ生シ。根長ク沙中ニ蔓延シ。一柄一葉本狹ク未潤シ。故ニハマイテウノ名アリ。大抵三起或ハ二起。或ハ缺刻深ク殆ト一蒂三葉ナルガ如ク。或ハ卵圓ニシテ鋸齒アリ。ソノ缺刻鋸齒ノ状種々一様ナラズ。花莖三四寸數岐ヲナシ缺筒子状ノ十餘葉ノ黃花ヲ開ク。略剪刀股花ト同シ。

第十三種

パレナシラヌ

シロシラ

ヨロイシラ

オニキギブルム

按 *Paranthesis*

*repens*

種 *Kuiperi*

*Knikblom*

蘭ノ形状ニ

的當ナルガ如シ但林氏湿地ト云テ海邊沙上ニ生スルト云ハザルニ憶アリ






タカサゴサリ

山麓陽地ニ生シ。草形等ニ花ノツキ方等ハ黄花兼ニ似。花形亦数ハ前カ股ノ如ク  
ニノ色白ノノ尖ニ淡紫色葇アリ

按ニ亦上条ノ類ニ収ムベクノ種名未詳



Vertical text on the left margin, including the number '17' and other characters.








前条一種


山足陰地ニ生ス。全形前条又秋ノ、ゲシニ似テ稍小。高二三尺。莖葉共ニ切テ白汁ヲ出ス。葉ハ略フクヲ、草ノ葉ノ如ク。不齊尖銳ノ齒起アレ也。彼ノ如ク缺刻深カラズ。稍ニ至テ漸ク狭長。秋梢上枝ヲ分チ花ヲ放ク。ホノゲシト同フノ差小ニシテ大抵十瓣黄色ニシ。ムラサキニカナノ點頭紫色ナルト同ジカラズ。萼莢實礎毛茸ノ状ハ似類相同シ





葉長柄叢生形ヤマモミヂノ如ク。大缺刻五七起不斉尖鋭ノ鋸齒アリ。本長ク柄ニ  
 流ル。葉間莖ヲ抽ク。一ニ尺許細葉ヲ互生ニ。梢葉腋枝ヲ出シ三五又分シ。秋ニ至テ  
 點頭シテ花ヲ開ク。花萼共ニニガナ類ノ如ク。一萼大低缺筒十花ヲ収ム。形タカサ  
 コサウノ如クノ差小ニ。紫葶微深ク。雌莖尤長シ。莖葉ヲ切テ白汁ヲ出ス。フホニ  
 ガナ類ト同シ

按ホ *Parnassia* ノ属ニ収ムベシ






オホニカナ

此種従前未聞其名  
オホニカナ余所下

根葉長柄形フクヲ、サウノ葉ノ如ク。本溜フシテ微ニ柄ニ流レ。未幾鋭不有ノ缺  
 刺尖起アリ。梢葉ハ漸ク狭細。葉葉間莖ヲ抽ク一ニ三尺。莖梢葉柄葉背脉上等ニ織  
 細微毛アリ。秋梢上枝ヲ互生シ短梗數花ヲツク。瓣等ノ形色惣テスイランノ花ノ  
 如ク。缺筒二十許糸ヲ以テ一花ヲナス。葉山苦蕒ニ似。花スイランノ如クナレ氏。莖  
 ヲ切テ白汁ヲ不出味苦シテ。ニガナノ類中別ニ一種ナルモノ、如シ

按 *Pseudanthus* ノ属ナルベケレ氏未考種名  
 プシチナス






ウスベニニガナ

草形黄花菜ニ似テ稍大ニ。花萼亦畧同ジケレド。星弁ナク只完筒子花ノ聚簇ニシ。  
 色淡紅頗ル美ナリ。後身毛實トナリテ飛ブ。ニガナニ同シ。肥前日見峠ニ産ス。  
 附一花部大圖

按花形異ナレド亦前条ノ属ニ収ベキカ





ヤクシサウ

黄花菜一種

山嶽原野ニ多ク。葉楮圓ニノ末濶ク。微鋸齒アツテ柔軟。木僅ニ股ヲナシ茎ヲ擁シ  
 互生ス。又缺刻分裂殆ト菊葉ノ如クナル變種アリ。共ニ黄腋枝ヲ出シ有梗花ヲ纂  
 簇シ。單狀花形黄花菜ノ如ク。新之ハ白汁ヲ滴ス。一花十餘弁。色淡黄缺筒子ニノ兩  
 翼ヲ具シ。後茹トナル。茎高一二尺。肥大陽地ノモノハ。茎粗ク葉ニ暗紫ノ暈斑アリ。  
 故ニヨゴレサウノ副名アリ。熱洲茲野山三州本宮山等ニハ。葉深ク缺刻アルモノ  
 アリ 附一花部大圖

第十一種

フシナレテス  
*Prenanthis denticulata*

雁  
*tanabata big fruit bloom*

蘭





茎高一二尺葉ヲ互生ス。形楕圓ニノ厚クノ軟。色淡黃綠白ニノ。莖葉共ニ斷テハ苦味ノ白汁ヲ出ス。葉腋枝ヲ出シ每頭有梗多花ヲ攢簇ス。萼筒様五裂。花缺筒五弁。尖ニ裂。以下四種皆暖地ノ産ニメ。草質同ク花萼ノ形亦相似タリ。就中此種ハ草大ニ葉亦圓大ナレト。花却テ小ニシテ五弁。大僅ニ三四分ニ過ギス。又一種細葉ニシテ小ナルモノアリ

按ニ以下四種共ニ *Peruvanthus* ノ屬ニ可収モノ、如ク西書中此品種ノ副名アルベキモ余未考





タイレンサイ

大葉キナナギク

アゼトウナノ類ノ大葉ナルモノニモ茎高一二尺。葉アゼトウナニ似テ大ニ本  
差潤クノ擁莖。葉腋枝ヲ合テ花ヲ放ク。アゼトウナニ同ノ形色亦一般ナリ





ワダン。タイレンサイ。ハマナレン等ノ類中此種尤モ小ニシ。舊莖数寸幹様ヲナシ  
 枝ヲ分チ地ニツケバ鬚根ヲ生シ更ニ一窠ヲナス。根葉簇生形鷓鴣草ノ如ク。木狭  
 ク未廣フシテ邊緣缺刻細尖齒ヲナシ。質柔滑ニノ断之ハ白乳ヲ滴ス。葉心莖ヲ袖  
 ク一五七寸葉ヲ五生シ。秋ニ至テ梢上有梗十数花ヲ擢簇ス。弁萼生殖諸部ノ形也。  
 タイレンサイ。ヤクシサウノ類ト一般異ナシ



花大径六分  
 葉長六分  
 葉幅二分  
 葉縁鋸歯状  
 葉心莖ヲ袖ク  
 秋ニ至テ梢上有梗十数花ヲ擢簇ス



ハマナレン

ツテツナ

舊茎粗大幹様ヲナスハハクン。甘藍ワラシクナ又老鯨菜ノ類ノ如クノ粗短。高尺許ニノ頂上多葉  
 簇生ス。葉アゼトウナノ葉ニ似テ大ニ。圓頭深缺刻ノツテ殆ト鱗様ヲナス。ツノ状  
 差ヤ蘘舘ノ態アリ。故ニツテツナノ稱ヲ得。葉間長ク細茎ヲ出シ。細長葉或ハ無缺  
 或ハ本廣ノ茎ヲ擁キテ互生シ。秋梢上花ヲ放クノ形色。全クアゼトウナト一般。細  
 茎直上セズモ垂ル。ソノ地ニツクモノハ。根ヲ生シ窠ヲナスツテツナアゼトウナト同シ





オニタビラコ

黄鶴菜

田野廢圃竹蔭ニ多ク自生シ。葉略蘿蔔葉ノ如クノ小。數葉地ニ塌シ春莖ヲ抽ク。一尺許。肥大ナルハ二尺ニ過ク。數葉五生シ。莖葉共ニ毛茸アリ。稍上枝ヲ分テ短梗多花簇々相重リ開ク。花小オニタビラコヨリ稍小ニメ。重弁率子二十餘。黄色ニメ弁端紅褐ノ微暈ヲ帶ブ。弁共小オニタビラコニ似レ。花冠毛無枝白色ニメ。茹トナツテ飛フニ至ツテハ。其形全ク別ナリ 附 花弁黃次郎大圖

第十種


フレンチテス

ヤボニカ

ヤハニス

キニツキブルーム

*Poa anthus japonica*, var. *japanica* Knuthblom. 薊



オニタビラコ

黄鶴菜

第十種

フレンチテス

ヤボニカ



コオニタビラコ

田畝路傍ニ多く。葉不舟ノ大缺刻アツテ殆ト鱗葉ノ如クナルヲ三四。頭未尖銳或ハ鈍ニノ其状一ナラス。地ニヨツテ大小亦一ナラス。大抵長サ三四寸地ニ塌ノ莖生シ。頗ル光澤アツテ毛ナク。早春ヨリ多く莖ヲ抽ク。莖亦初ノ地ニ塌シ。漸ク莖頭長キ者七八寸ニ及ビ。每頭花アリ。弁其様ノ缺筒子ニノ黄色。大サ三分許。實磯指圓ニノ冠毛ナク。萼筒様五片。外萼亦五片。花萼シテ漸開テ斜傾シ。子熟ルニ至致開ノ反ス。子細長一分餘。吾郷賤民饑歲ニハ採テ食ヒ。早ニタビラコト稱ス。ソノ大葉才ニタビラコノ類ハイヌタビラコト稱シテ食ハス。附萼葉花弁部大圖

第四種

ラフサナ

ラガザラユス

レフニツ

テンケルニス

*Lappana rhagabialis*. 唯 *Lophanthus alternans*. 蘭 印葉園尤可證

按以下二種共ニタビラコノ名ヲ冒シテ前条一種ノ看ヲナセ。草形並冠毛ノ有無熟實等。大ニソノ態ヲ異ニシ。ソノ全ク別屬ナルヲ昭然タリ。學者宜ク訂視熟考スベシ



蘭葉園尤可證

按以下二種共ニタビラコノ名ヲ冒シテ前条一種ノ看ヲナセ。草形並冠毛ノ有無熟實等。

大ニソノ態ヲ異ニシ。ソノ全ク別屬ナルヲ昭然タリ。學者宜ク訂視熟考スベシ



ヤブタビラコ

草形コオニタビラコノ如シメ微大。陰地ニ生ズルハ殆ドオニタビラコノ如クナ  
 レ氏。ソノ莖ヲ出スヲコオニタビラコト同ク。初メ地ニ塌ノ漸ク擡起シ。ソノ分枝  
 花ヲ開ノ形ホコオニタビラコト一般ナレ氏。重複多キ葉十數片ナルヲ。オニタビ  
 ラコニ同ジクノ花稍小。僅ニ二分許ニメ實硬ニ冠毛ナク。花後葉開ルニ至ツテ形  
 頗ル短ノ殆ト圓尖。子熟ルニ及テ放開スルヲホコオニタビラコニ同シフメ子ハ  
 更ニ濶短。附花弁兩莢郭大圓

按載前条下



草木全書  
 卷之十五  
 十九種一  
 ヤブタビラコ



シヤカタラズイセン

ハギナデシコ

初生ノ形ハ略知母ノ如ク。後莖ヲ抽ク。三尺餘。葉腋枝ヲ出シ。夏ニ至テ頂上花ヲ  
 ツク。辰後漸ク開キ。未後ニ至テ閉ヅ。萼十葉披針狀ニメ。尖リ。花缺筒子亦重疊鱗狀  
 全ク正開シ。萼尖ソノ周圍ニ出テ恰モ星狀ヲナス。故ニ「セルゲンスタール」大白ノ  
 名アリ。色紫。柱頭黄粉ヲ撒布シ。殆ト金線ノ如クシテ美ナリ。附郭大一花 實熟スル  
 二至レハ。柱頭分裂糸ノ如クノ撒狀ヲナシ。糸間齒糸ヲ以テ錯綜スルガ如ク。又雌  
 蛛網ヲ結ブ如キノ殊標アリ。鐸氏云。性肝胃及胸中ノ熾熱ヲ治シ。煎湯トシテ善ク  
 服胸痛ヲ退ケ。又ソレニ糖ヲ加ヘテ痰熱ヲ治ルノ良劑ヲ製ス。又自然汁ハ愈創ノ  
 効アリ

第三種

タラコボシ

ホトリホリニホ

*Thlaspi perfoliatum*

種

フレイマラーナ

*pyralis bokshuan*

ボックスバール

蘭



シヤカタラズイセン

三十一

五木并葉



啓蒙形状ヲ親衆亦通知ス。故ニ畧之。花形大概薊類ト趣ヲ同フシテ。雄刺更ニ長ク  
 尖頭微ク鈎ル。故ニヨク物ニ固著ス。以テ莢實硬邦大固。雄刺一倍固半其状ヲ詳ニ  
 ス。主用藥鏡キリツセン之下ニ在リ可見

昇一種

オレンチム

ナツク

ゲムチ

キリスセ

*Antium lapa*

*gemma*

*kligan*

ヨローテ

キリスセ

雄

*groot kligan*

雄



計圖七本  
 全草半葉ニ以  
 二葉者ナク  
 正ニマテ  
 花葉細  
 似テ掌形  
 山形



ヤマゴボウ

ウラジロ

山苧菜

山原陽地ニ生ス。根葉牛房葉ニ似テ短小。タビ五六ノ缺刻尖起ヲナス。又缺刻深メ殆ト掌状ヲナスモノアリ。簇葉間莖ヲ抽ク。二三尺葉ヲ互生ス。形楕圓ニノ尖リ。質厚剛邊縁尖起嵩様ヲナシ。面深緑背白色。秋稍上分又穂ヲ結ビ向側點頭。己ニメ正立シテ花ヲ開ク。形牛房花ノ如ク。刺尖銳ナレド彼ノ如ク鈎状ヲナサス。刺鱗共ニ褐紫色ヲ帯ブ。花黄ノ形亦牛房ト一般ナレド弁ノ暗紫色更ニ深ク冠毛茶褐色。全草牛房ニ似レド短小ニメ花穂ハ及テ微大ナリ又白花ナルアリ 附 穂刺一

倍圖小花本然圖

アルシチニハ

ヘルツナク

アルロセ

キリスセル

*Arctium lappaceum*

*Arctium alpicum*

*Arctium lappaceum*

按藤林普山本条ヲ以テ林氏第一種藥用ノ品トス非也





原野ニ多ク生シ。高三四尺。四五尺。花アリ。葉大薊ヨリ稍葉ニシテ白斑ナシ。莖葉  
 共ニ刺アリ。梢上長ク枝ヲ出シ。每頭一花アリ。色淡紫ヲ常トス。深紫。紅。白等亦往々  
 自生ス。薊類多種ナレバ。花色ノ変態主トシテ。此種ニアリテ。玩花家所裁ノ種々ナル  
 枚舉ニ暇アラズ。惣テ薊ノ莖ハ。重疊鱗次シ。ソノ鱗ニ大小狹闊ノ異アリ。此種ハ鱗  
 狭長ニシテ上ニ粘リアリ。花ハ筒様五裂。兩莖冠毛等似類一般ニシテ。ミナ實礎ヲ具ス。  
 以一倍圖示其狀

按 *Var. lucida* 及 *Var. ovata* *Petal.* 前ノ註タルコトハ勿論ナレド。ソノ類多種ニシテ

此の當ノ種名ヲ不得。春氏 *var. lucida* *abundant* ノ名ヲ舉テ薊ト譯ス。今林氏

ノ所説ヲ聞ルニ。簡略ニシテ。只莖上多ク短梗ヲ分チ。每頭花アルノ殊標ヲ舉ルヲ  
 ミレバ。主トシテ大薊クサスモノ、如シ。故ニ余本条ヲ以テ姑クソノ一種ニ収ム






ヤマアサヒ

オニアサミ

大薊

啓蒙大小薊ノ形状分別ヲ詳説ス。故ニ略之。概ルニ此種ハ山中ニ多ク。葉強ク根葉  
 ニハ葉面ニ白斑アリ。葉尖ノ刺亦剛シ。八九月花ヲ放ク。形小薊ヨリ小ニシテ淡  
 紅紫ニシテ。一枝ニ多花連リテ小薊ノ一枝一花ナルガ如クナラズ。葉亦小ニシテ粘リ  
 ナク。全花ニシテ完花。生殖部亦同シ。勢州鈴鹿山邊ニ莖并ニ葉背等ニ紫色ヲ帶テ葉  
 面ニ白斑ナキ一種アリ。附小花一倍圖。

説詳小薊下






喜永年間初テ得之。或云舶来種ト。莖高四五尺。葉本深ク莖ヲ擁シ長大殆ト一尺ニ及ブアリ。形質ハマアザミノ如ク。光澤アル氏缺刻深カラス。大波紋ヲナシテ一見鱗様ノ如キ着アリ。肋脈白色。脈ニ沿フテ白斑アリ。邊縁齿様尖鋭剛刺アリテ莖葉共ニ毛ナク。葉厚強莖様ニノ尖亦利刺ヲナス。花色淡紫。花莖ノ状常様ニメ苞色白

第二十種

- |                         |                     |                |                |
|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| カサネ                     | カサネ                 | カサネ            | カサネ            |
| <i>Carduus marianus</i> | <i>Lichtholaima</i> | <i>Lythrum</i> | <i>Lythrum</i> |
| カサネ                     | カサネ                 | カサネ            | カサネ            |
| <i>Lythrum</i>          | <i>Lythrum</i>      | <i>Lythrum</i> | <i>Lythrum</i> |




オホアサミ



ハマアザミ

海邊沙地ニ生ル一種ノ大薊ニシテ葉肥厚光澤アツテ邊緣ノ刺尤モ利ク。秋花アリ  
 大薊ニ同ノ微大色淡紅紫ト白色トノ二種アリ。共ニ根長ク形斗房根ノ如ク味  
 亦煮テ食フニ堪エ故ニゴホウアザミノ名アリ

種名未詳





ヤハズアサミ

エロアサミ

飛塵

春莖ノ抽キ三五尺。葉小薊葉ニ似テ刺多ク。莖ニ莖羽ニ似タル皮起四五道アリ。葉ノ如クメ又刺アリ。夏花アリ小薊花ニ似テ小。色ニ紫白ノ二種アリ花莢ノ形薊ノ常様ニ外ナラス

按ニ鐸氏ノ *Leaf*

*Willa by tel.*

ナシ者本条ノ如ク又物印満亦似類敷種ヲ


載ス林氏ノ可藥ノ種中亦的當品アルニケレト未タ考ヘズ姑期後日





山林樹下ニ多ク。宿根苗ツ生レ高三五尺。根葉ハ柄アリテ。形或ハ羊蹄葉ニ似テ。缺刻鋸齒アリ。或ハ缺刻頗ル大ニメ鱗様ノ如キニ至ルアリ。柄ニ小薊葉ノ如クメソノ状一ナラズ。梢葉ハ柄ニ流レテ少ク莖ヲ擁ス。こナ邊縁刺アレハ大薊ヨリ軟ナリ。故ニ野人嫩苗ヲ食フテナアザミノ称アリ。八九月梢葉腋長ク枝ヲ出シ多花ヲ開ク。花莖ノ形色大薊ニ似テ微ニ向側ス。又初生ノ際白毛茸々。後漸ク減スレハ全ク無ニ至ラス。葉縁ノ刺尤軟ナルノ一種アリ

種名未詳ナラス





原野水側湿地ニ生ス。葉ハ小薊葉ニ似テ岐又深ク刺多ク。根葉ハ色深緑滑澤ニシテ中筋白ク。嫩ク大薊ノ形色アリ。苗高サ一二尺。ハ九月莖頂淡紫花ヲ開ク。一莖一花。或ハ葉腋一二枝ヲ別ナ花アルモノアリ。花皆旁ニ向フテ雜首ノ形ニ似タリ。故ニ先輩約ノ叙名中ノ雜頂草ヲ分テ此品トス。遠州ニハ一種形全ク同フシテ花點頭セザルモノアリ

第一種

カルヂノース

ニニコガラフアニス

按 *Carduus hircocappatus*

ワサノフシラキ

ドーロ

ローレン、薊ノ標

者ニヨク當レドモ吾郷邊ニ見ルモノハ中筋白道ノミニニ他ニ白斑ナキニ  
 嫌アリ



本草綱目卷之二十三  
 薊ノ標  
 四十五  
 草木全書





卷之十五  
○十九圖(四)

四十三  
平木全茂



マアザミ

伊吹溪湖ニ生ス。形若英ニ似テ大ニ。葉厚ク軟ニメ毛茸ナシ。里人常ニ採テ食用ト  
 ス。故ニ往々家園ニ栽テ食料トス。秋枝梢ニ熟頭花ヲ開ク。サハアザミノ如クメ  
 更ニ大ニメ色淡紅紫。木曾古澤ノ邊ニモホアリ。故ニ尾州ニテミヤザハアザミノ  
 称アリ

種名未考

卷之十五

○十九圖(四)

平木全茂







山中陽地ニ生ス。根葉ハ住々。鱗林ノ缺刻アツテ。ヒゴタイ或ハタムラサウニ似テ  
 狭小。葉心茎ヲ抽クヲ二三尺。脚葉ハ披針狀ニノ本ニ二三ノ深缺ヲナシ。疎細ノ鋸  
 齒アリ。柄ニ至テハ全ク披針狀ニノ缺刻ナシ。柄上數節ヲ分チ每頭花ヲツク。形々  
 ムラサウノ如クニメ。葉鱗ノ頭ニ更ニ圓鱗様ノ細花鱗ノ如キ色アル一花ヲツク。  
 コレ此種ノ全花ニテ完筒等ニメ。花形タムラサウヨリ差小ニメ。筒口五裂一側ニ  
 殊標トス。並ヒ向テタムラサウノ星開ナルト不同。亦此種ノ殊標色淺紫。雄蕊暗紫。心葉白色。以郭  
 大一圖示諸事

セリナトコトク 第十一種  
 アーラ  
*Justicia amara* 葉  
*bitter magbala* 葉

按林氏所說披針狀葉ノ語ニ在テハ微嫌ナキニアラサレド。葉狀葉ニ味苦ク的當ナシ。假令  
 正品ナラガレモソノ一種ニ外ナラズ。林氏云微毒及フノ骨痛ニ煎服ニテ利アリ





キツ子アサミ

泥胡菜

原野ニ多ク自生ス。全形タムラサウニ略似テ。葉背軟細白毛アリ。春莖ヲ抽キ多ク  
 枝ヲ分チテ直上ス。故ニセンボンヤリノ名アリ。花ノ形色タムラサウニ似テ稍小  
 兩莖冠毛赤ソレト趣ヲ同スレト。全花ニテ完筒子ナルノ異アリ。又一種白花ナル  
 アリ。共ニ萼鱗様ナレト。下側ノ鱗ハ頗ル圓ノ不尖。背上一ニ堅起ナル一序アルノ殊  
 標アリ。附 一全花 二萼鱗背上有堅起者共部大圖

セルラトニラ

セントウロイデス

按 *Leucanthema* ノ属ニ可収殊ニ第十三種 *Centaurioides* ノ如クナレドモ  
 所説簡ニノ難決





ミヤコアザミ

全形ヒノヒゴタイ又ハキクアザミノ如クナレド。葉ノ缺刻深メ且脊列シ。殆ト緒  
 録ヲナス。キツ子アザミノ如クノ背彼ノ如ク白カラズ。稍重ニアツテハ披針狀  
 ニノ鋸齒アルノミ。茎葉共ニ短毛アツテ被テ。秋梢上枝ヲ分チ花アリ。形色キクア  
 ザミノ如クナレド。花筒圓ノ頭五裂シ。此種ノ殊標尤。色淡紅紫。約暗紫ニノ柱頭又  
 シテ淡紅。冠毛淡褐ニノ本ハ紅紫。附全花一倍圖

第一種

モルトラトユラ

チルカトロリア

フルウエニ

サードグアラド

苗

西勃氏所定

*Senecio tinctoria* var. *arschii* Nagel & Schmidt





キクアザミ

草状花形ミヤコアザミノ如クナレ。葉本廣ク末尖リ邊緣大缺刻アツテ頗ル前葉ノ態アリ

按亦前条ノ一種ニ収ムベシ



シロ

八里山ノ奥ノ山ノ麓ニ生ス

ハシノ山ノ麓ニ生ス

ハシノ山ノ麓ニ生ス

ハシノ山ノ麓ニ生ス

ハシノ山ノ麓ニ生ス

ハシノ山ノ麓ニ生ス



ホクチアサミ

茎高ヤニ尺許。脚葉ハ本澗クノ未夫リ。梢葉漸ク狭ノ披針状ヲナシ。質尤厚強韌淡  
 アルヲキクアサミヨリ甚ク。面深緑色背帯白。秋花アリ形色キクアサミノ如ク。萼  
 ハ彼ニ比スレバ微膨ル。全花ミナ宛筒子花ニ冠毛微ク黄褐色ヲ帯フ。葉枯レ  
 バ黒色ニ変ズ。此種奥州本宮山ニ多ク生シ。土人採テホクチトナス故ニソノ名ア  
 リ附 全花一倍圖





漢種白木

白木若木共ニ葉質剛ク。邊縁纖細齒頭刺毛アツテ鋭リ。花形亦一樣ノ穂ヲナシ。萼  
鱗形重疊。萼ヲ圍テ魚骨狀ノ大小數葉アリ。小花ハ筒様五裂。略筒筒ノ花ノ如ク多  
數ノ聚簇ニナリ。實硬麥粒狀ニメ滿面白毛アリ。冠毛茶褐色。中心一柱頭蝶鬚ノ  
如キヲ概標トス。只雄莖ノ形ニアツテハ二種一般ナラズ。白木ニ在ツテ他ノ聚成  
花ノ如ク輪様ニメ十九細ノ常態ヲ具シ。花弁柱頭共ニ紅紫。雄莖淡黃褐色。草履  
ル大ニメ殆ト三尺ニ超エ。葉亦大ニメ脚ニ在テハ小葉三或ハ五七ヲ以テ鱗様ニ排  
出シ。梢ニ至テ、三或ハ一トナル 附全花部大圖

アタラクチナリス

按 *atractylis* ノ族ナルベケレ氏未詳種名





草白木ヨリ稍小。葉卵圓披針狀ニメ柄ニ流。柄アツテ互生。葉白木葉ト同クメ邊縁ノ齒更ニ細密。其細葉シ難ヲ以テ揭印葉一箇。新芽ニ軟白毛アリ。今官園所載ニ二種アリ。甲ハ脚葉ニ三五岐アルヲ交エ。乙ハ脚稍共ニ無岐。全葉葉骨葉ノ形等白木ト同ク。尺全花白色ニメ。雄莖白木ノ如ク輪様ヲナサズ筒中ニ沿ミ。五細莖上ニ淡黄ノ葯アツテ年ノ裂本ニ臨ミ。他ノ筒体花ノ莖ト同クメ十九細ノ常態ニ非ス。草状花形白木ト同ク。特リ此雄莖ノ形不同ヲ以テ之ヲ異族ト断シ難シ。故ニ今列于此。附 一全花 二實破年柱 三開花筒見雄莖共部大圖

アタラクナリス

*atractylis lanceata*

春氏


アタラクナリス

ノ下林氏雄莖ノ論ニ不及レバツノ當否不詳レ氏姑從春氏說






諸処山中ニ自生ス。当高二三尺。葉ハ大抵三或五小葉ヲ以テ鱗様ニツキ。胡枝子葉  
 又ハ月半花葉ノ如ク。梢上ニアツテハ住々一葉ナルヲ交ニ。春初出ノ芽ニハ白毛  
 多シ。柄木ニアツテハ針様ノ數托葉アリ。花形莢狀ハ全ク前条種ニ同クメ。色ニ白  
 ト淡紅ノ二種アリ。此草葉形白木ノ如ク鱗様ヲナシ。花亦紅色ノモノアレバ。之ヲ  
 白木ノ一種ニ収ムベキモノ、如クナレバ。根形氣味ノ相同シカラザルニヨツテ  
 先輩己ニ之ヲ蒼木ト断ス。今雄莢ヲ按スルニ白木ニ非レバ。ソノ蒼木タルヲ断然  
 タリ。先輩ノ明断右可賞





木曾産蒼朮

脚葉ハ往々多岐ナルヲ交ニレ氏。大抵無岐ニメ殆ト漢種ノ蒼朮ノ如ク。タ、葉狹  
 長無柄ニノ。漢種ノ卵圓披針狀ニメ有柄ナルト同シカラズ。花形ハ一般ニメ淡紅  
 ト白色トノ二種アリ附印葉ニ圖示鋸齒之狀



此一葉圖

五十三  
 草木全載



啓蒙形状ヲ詳説ス故ニ略之。花形薊類ト同ク細筒様ニメ五裂。雄蕊弁中ニ在ツテ。雌蕊長ク上ニ五テ頭又ナラズ。共ニ深黄ニメ紅線紅暈アリ。實稜倒蛋形ニメ四稜アリ。ソノ中心花ニ於テハ冠毛アリ。ソノ毛毛筆様ノ短小ナルモノニメ織長毛ニアラズ。ソノ邊緣花ニアツテハ。ソノ毛ナク全ク裸子ナリ。今ニ筒ノ未熟實並ニ全花一倍圖ヲ附シテ。各々示其状。阿須氏云。實ハ下利ノ能アリ。又粘液ニヨル胃病胸病ニ稱譽アレ也。方今ニアツテハ多ク貴重セス。

第一種  
 カルタムニス チンクトリニス  
 ゲラターチ サツフルール  
*Casthamis tinctorum* 華 *gubana* *lapplost* 蘭





住々原野ニ生シ。圓莖高三四尺淡緑ニシテ斑ナク。葉ハ綠色節ニツイテ兩對シ。形大  
 麻葉ノ如ク邊緣粗鋸齒アリ。株幹ニアルハ多ハ三裂ニシテ殆ト三葉一帯ナル如ク。  
 稍葉ハ多ハ無裂。全草佳香アリ。秋枝梢ニ細花ヲ撒状ニ開ク。萼鱗様。一房内大低五  
 完筒子花ヲ收ム。色淡紫又白色ナルアリ。花莖ノ狀。郭大二圓ヲ以テ示之。林氏云。肝  
 藏ノ病黃疸水腫等ニ普ク用ユ。又「ブールハー」ハ浸割ト為シテ間歇熱又持久ノ  
 骨瘍ヲ治シ。又蒸劑トシテ寒腫ヲ消散ス。

第十三種  
 エニトリニム カシナロニム  
*cupatarium canthidium*、*cupatarium*、*cupatarium*  
 エニトリニム シニセ  
 按春氏ハ林氏第八種ノ *cupatarium*、*cupatarium*、*cupatarium*  
 閱ルニ穩當ナリガタク。十三種ノ形狀。林氏方茎ト云ハ他ノ諸書  
 西國ニナ田莖ナル如シ。并ニ佳香アルヲ等想  
 テ本条ニ的當ナルニ不如。故ニ改之。鐸氏阿須氏物印滿等可併證





前条ノ一種ニノ赤原野ニ生ス。葉長クノ岐ナク桃葉ニ似テ鋸齒深ク。又三尖ニナ  
リテ蘭草葉ノ如キモアリ。茎ニ淡紫細斑アリ。茎ト共ヒ毛茸アリテ香少シ。花白色  
亦前条ニ同ク。世白ノ二種アリ

按此条種又次条種共ニ前条ノ同族ニカ、ル。諸書ツノ多種ヲ舉ルアレバ。各々  
的當ノ種名アルベキモ。余未考









夕ウコギ

狼把草

水旁下湿ノ地ニ多ク高二三尺。莖此方葉對生、形卵圓被針狀ニシテ粗鋸齒アル三箇  
 或ハ五箇排生シ、梢ニ在テハ單一葉ヲナス。秋枝梢ゴトニ花アリ。莖重複別ニ有柄  
 十余ハ細葉アツテ莖ノ下邊ヲ圍ミ、殆ト繖狀ニヒラク。此等葉ハ此種ノ殊標ニシテ  
 外葉ノ狀ヲナシ、花ハ鬼針草ノ花ト同ジケレド、星糸ナク、夕ウコギノ完筒子花ノミノ聚  
 簇ニナル。ツノ形十九細ノ常套ニシテ筒様五夫外及ノ黄色。一柱上ニ出テ又頭黄色。  
 二雄共合シテ柱ヲ抱キ、紫黑色ニシテ黄粉ヲ吐ク。膏礎扁長ニシテ頂ノ兩側ニ各一刺  
 アリ、刺ニ細毛アツテ逆ニツク。熟後衆子開テ刺穂ヲナス。ソノ子ハ扁長ニシテ頂上  
 ニ刺又ヲナシテヨク物ニ鈎著ス。附 一全花 二開花筒見諸事共郭大圖 三  
 子一倍圖

林一樓

ビラン *tripartita* 華

ビラン *tripartita* 華






上条一種

弘化年間ノ舶来ニメ。護ニドレケルフルノ名ヲ傳フレルツノ類ニ非ス。方茎高二三尺。葉對生。脚ナル者ハ形桃葉ノ如クノ粗鋸齒アリ。梢ナル者ハ三箇以テ一葉ヲナス。狼把草葉ノ如シ。秋葉腋枝ヲ出シ又分シ花ヲツク。大一寸許。卵圓五弁或ハ七弁。缺筒子様ニメ白色無蕊。心花ハ完筒子様。形色惣テ狼把草花ト同ク。實礎葉熟實ノ形ハ鬼針草<sup>モミダヤ</sup>ノ如クニメ稍小ナルヲ以テ刺毛三或ハ四。莖ハ上条ト同様ナレ。莖葉小ニメ殆ト外莖ノ看ヲナス。此種葉形上条ト同ノ。花實ハ次条ト趣ヲ同フス。

第九種

ヒルノミルニ  
 Hilan's milkweed  
 按林氏所載ノ葉狀ニアツテハ些異アレ也。花實ノ形吻合ナレバソノ種タルニ論ナキ如シ。故ニ断然ソノ名ヲ下ス。又本条并ニ鬼針草等ハ。雌莖及實礎ヲ具セサル星弁アレ也。林氏ノ例ニ從テコ、ニ列ス

スチーニカサット  
 多トナート  
 多トナート





センタグナ

鬼鏡草

原野ニ多ク生ス。莖方ニノ葉對生。一柄三又。每又披針狀様ニノ粗鋸齒アル。三葉ヲ排  
 生シ微ク種葉ノ態ワリ。秋末枝梢毎ニ花ヲ開ク。萼重複。外者及メ萼葉ノ如ク。内者  
 潤ノ長シ。心花ノ形狼把草ノ如クナレド。外縁ニ卵圓ニノ兩葉ヲ具セザル。黄色ノ  
 小星瓣五片アリテ。大ニ五分許ノ花ヲナス。實硬稜アツテ扁ナラズ。頂上ノ刺毛四或  
 ハ五ツノ鈎翹アツテ物ニ著キ刺毬様ヲナス。トホハ一般異ナシ

葉十種

*Silene pilosa* 唯

*huainia grandiflora* 蘭

按林氏所說ノ萼形ニ於テ些嫌アレド。フノ品タリ一疑ナク春氏亦已ニ決之





細葉セングダサ

全形セングダサヨリ稍小ニシテ。葉細裂重輪様ヲナス。大ニ同ジカラズ。外葉葉形  
又ナスノ異アツテ。花實差小ナルノミ

ハハ種

*Belonia bipinnata* 種

ラカローニニ

*Indochinensis* 種

タビヤ

印葉園可證





ヤブタバコ

天名精

根草地ニ就テ叢生。形烟草葉ニ似テ狭小。長尺許ニメ。鋸齒皺毛臭氣ホアリ。夏秋ノ  
 間莖ヲ抽ク。一ニ三尺。枝ヲ分チ葉腋毎ニ短梗一花ヲツク。一種數花叢生。スルモノアリ。葉鱗様數  
 重ニ次シ。葉邊細小數葉ヲ交ヘ。一莖中葉多ノ黄色完筒子花ヲ盈ツ。筒子ノ形常態  
 ナレ氏。筒下實礎、上邊實礎ノ下底ニ。淡黄緑白色、細珠ヲ滿布スル。アリ。コレ  
 此種ノ殊標ニカ、ル。以テ大圖示之

第二種

カレシニユム

アプロクタイナス

*Carpesium abrotanoides* . 雜

ラッフスターゴド

カラীগブルーム

*opstana kwayblum* . 藪





ガシクビサウ

狗兜菜

草形略天名精ト同シクシテ。花ノツキ方異ニ。葉腋枝ヲ出シ枝頭ニ稍大ナル一花ヲ向側或ハ向地ヲ開ソノ状烟管頭ノ如シ。故ニガシクビサウ、名アリ。勢州菘野山ニハ小葉ニメ高穂ニ一尺許ナルアリ。又水曾ニハ尤大ナル一種アリ

第一種

カルンシユム

セルヌーム

キニツケンド

カラエガフルーム

*Carpogon caruam.*

*Knitka Kuyghlan.*






シヤブレンサウ

天名精一種

山中陰地ニ生ス。茎高一二尺細長ノ三五枝ニ分レ葉ヲ互生ス。形披針狀ニノ微鋸  
 歯アツテ糙滑ナル。殆ト雞兒腸葉ニ似テ剛ク。天名精葉ノ柔毛アツテ軟ナルト  
 同ジカラス。秋葉腋ニ細穂ヲナシテ花ヲ開ク。穂本數片ノ鱗樣萼アリテ細碎ナル  
 多金花ヲ環簇ス。子室麥粒狀ニメ禰。上ニ筒撮五裂ノ淡黄花ヲ開ク。葯黃褐柱頭白  
 色ニメ天名精花トソノ趣ヲ同フス。後尖頭子ヲ以テ穂ヲナス 附 一金花ニ  
 半熟實共郭大圖

按前条ノ属ニ可収モノ、如シ種名未詳



草木圖考 卷之十五





草木圖說前篇卷十五



愆齋飯沼先生著

草木圖說 全部凡四十冊

前帙草之部廿冊木之部十冊後帙草木之部

大日本平林莊藏板





草木圖考  
製本所  
慈齋贈石次主著

尾州名古屋本町通七丁目

永樂屋東四郎



三部

江戸日本橋通一丁目

同 日本橋通二丁目

同 芝神明前

同 浅草茅町二丁目

同 横山町三丁目

大坂心齋橋通北久太郎町

同 心齋橋筋安土町

同 博労町

同 安堂寺

同 南久太郎町

京都鉄屋町通姉小路上

同 三條通高倉東二入

書物

須原屋茂兵衛  
山城屋佐兵衛

岡田屋嘉七

須原屋伊八

和泉屋金右衛門

河内屋喜兵衛

河内屋和助

河内屋茂兵衛

秋田屋太右衛門

伊丹屋善兵衛

俵屋清兵衛

出雲寺文治郎

問屋



