

草木圖說前篇

草部

其編上

十八

布

植物

植物

二一八

學號

4

3

植

470,3
537
Vol 18

彦立校

中草
印章

草木圖說前篇卷十八目錄

二十綱上 雄萎附雌萎

第一目ニ雄萎

ララン

小ラシ

青カンラン

玉鈴蘭

ヤキバラン

ホウサイラン

キンリヤウヘン

ホクロ

石斛



卷之二

ラサラン

シカウラン

黄花石斬
ベクコクラン

チケイラン

八画ラン

ナギラン

カシンノキラン

大葉エウラクラン

ボウラン

シラン

クハクラン

コラン

キンセイラン

草木目録 卷十八日 種
リウキウエビ子

エウラクラン

ムカデラン

トクサラン

ガンゼキラン

エビ子

夏エビ子

コクラン

一葉ラン

同白山産

ミヅチドリ

大サギサウ

ヤマサギサウ

トンボサウ

木葉トンボサウ

シカウラン

ナゴラン

フウラン

カヤラン

エウラクラン

ムカデラン

トクサラン

ガンゼキラン

エビ子

リウキウエビ子

コクラン

一葉ラン

ヨケイラン

トケンラン

トケンラン

チドリサウ

チドリサウ

チドリサウ テガタチドリ

同山産

ツバキサウ

キンギンサウ

サギサウ

モヅトンボ

小葉トンボサウ

シカゴサウ

卷之十八

目錄

同一種

子ナバナ スナバナ ウタバグサ スバムシサウ クモキリサウ

デンバイサウ

サハラン

トキサウ

ヤマトキサウ

スマラン

キサンラン

イハチドリ

ヒナチドリ

同一種

ミヤマウツラミサウ

シユスラン

アツモリサウ

クマガエサウ

コアツモリ

又一種

大垣

草木圖說前篇卷十八

大垣 慈齋 飯沼長順著



草部

第二十編 上 髮英合體

吉野山
Gion



蘭ノ種類甚タ多シ。本邦所産ノ者ハ建蘭^{ツクシラン}也。寒ラン等ニソノ各品人種
類多シ。孰中建蘭ヲツノ魁トス。一莖三四葉稀ニ五六葉長二三人。夏末新苗ヲ生シ
次々花茎ヲ抽ク。大抵一尺餘有梗ノ五七八九花ヲ著。無葉ニメ花五瓣唇槽一
瓣共ニ色淡黃ニメ微綠ノ葉ヲ帶ヒ。又瓣心唇槽心葉等ニハ紫色ノ斑点アリ。花香
尤ツヨク。一花開ケバ滿堂馥郁クリ。此品幽姿清韻衆草ニ卓絕シ。真ニ盆種ノ最上
他ノ比スベキナシ。花心ニ柱様ノ一心葉アリテ唇槽ニ臨ミ。柱頭ニ帽アリ。即テ頭
房^{ホウ}ナリ余之ヲ帽ト名ノケ。一之ヲ排レバ瓶ナ落チ。下ニニノ黃藥アリ。四ノニ序^{シキ}トナ
ル繖茎アツテ殼腔内ニツク。子室ハ蒂ニメ中ニ細碎ノ寶礎ヲ蓄フ。凡ソ蘭類ノ兩
葉各種ニアツテ形色些異ナルモノアルモ。大概此狀ニ外ナラズ。ソノ他花形大抵
如是五瓣ニノ唇槽瓣ヲ具スルノ品ハシラン。エビ子ノ難ミナ其趣ヲ同フス。故ニ
余之ヲ瓶蘭ノ蘭葉ノ名ヲ下シ。以テ汎ク他品ヲ明スノ条ニ用ユ。寒地ニ在ツテモ
往々實ヲ結ブ。形獨頭蘭ノ實ノ如クメ年ヲ経テ熟ス。附一雌蕊二排帽露藥
共鄭大圖

エシントルム
エシントルム

テーザンラーダ
テーザンラーダ

ホームブリーグ
ホームブリーグ

西勃氏所
西勃氏所

Gymnadenia conopsea. 蘭

Gymnadenia conopsea. 蘭

ノラン 潭蘭

建蘭ニ比スレバ葉幅微ノ端ノ葉柔葉本垂

レ易シ花形大異ナシ



卷之十八

平林集

小ラン シテサキラン

草形建蘭ノ如ニノ小葉長一尺餘幅三分許。七八月花アリ。一莖二三花。莖至テ細ク
花鱗建蘭ヨリ稍小ニノ黃暈少々殆ト白色。紅紫班條鮮明ナル。頗ルホウラシノ
如。而ノ清香馥郁タル。建蘭ニ優レリ。真ニ机案上ノ清觀タリ。生殖部状異アルト
ナシ



卷之二十八

草蘭

立春

初冬ニ至テ花ヲ開クヲ以テソノ名アリ。南紀并兩國暖地ノ處タニアリ。ソノ產地ニヨツテ大小種々一ナラザレ也。梳スルニ葉状漳蘭ニ似テ蓋小ニノ者レ烏キヲ以テ常トス。花ニ大小アレビ瓣ミナ狭メ長ク。香建蘭ニ比スレバ微ニメ梳スルニ建蘭ニ及バス。花色亦種々アリ。淡黃綠色ナルヲ青カレラン。紫紅ヲ帶ヲ紫カシテン。ソノ紫羞徹ク紅色多ラベニカシラン。又青クメ縫ニ帶紫ナルヲヨゴレハソノヨゴレナル者ハ花瓣稍潤シ。本條所圖即チ是レナリ。所添ノ一花ハ紅カシランノ
瓣形ヲ示ス



卷之二

五才辨

花辦ヨゴレヨリ狹長。色淡黄緑睿槽ニ紫斑アリ


青寒ラン

卷之二

二十一

六

五才辨





大葉寒ラン

或云袖来ナリト。全形常種ノカンランヨリ長
大。葉闊シ長ニ尺ニ餘リ。質白ランニ似。花六
ノ瓣毛狭ク。色淡黃白。唇槽神ノ尖淡紅ニメ紅
紫点アリ



卷之十八

立本草

百品考曰。繁蘭ト同取ニ唐山ヨリ渡ル。葉ノ長サ尺餘幅廣シテ少シ垂テ直上セズ。
深緑色ニシテ光アリ。津蘭ノ如シ。繁芽ノ狀。色白シ。秋花アリ。幹細ク青白色。花葉蘭
ト同形ニシテ潔白ニメ香氣最高シ。蘭中ノ上品ナリ。

玉鈍蘭



卷之二


三編一

五本新

五本新

五本新

素心蘭
此亦前年唐山ヨリ舶來ス。葉玉鈍ヨリ幅狹シテ細長ナリ。又草蘭ノ葉ニモ類似レ
リ。秋花ヲ開ク。潔白ニシテ玉鈍ニ同シ。幹茎トモニ青白色玉鈍ニ似レリ。清香頗郁
トノ品諸蘭ニ優レリ。蘭中ノ魁ト称スベシ。



卷之十八

二十一

金種邊

ヤキバラン


コンリンザイ

金種邊

建蘭コランノ一種ナリ。葉質建蘭ニ同シテ。葉端ノ尖ヨリ四五寸ノアヘタ兩邊ニ黃白色ノ縁アリ。花ハ六七月ノ間ニ開ク。高サ尺許幹紫色ニメ。花黃綠色。舌ノ如午瓣ニ紫色ノ細點アリ。香氣ヨシ。又此一種ニ銀邊ナル者フ。古金輪コジンル、葉質漳蘭コラニメ。銀邊干ルヲ玉花ト云。俱ニ葉端ノ尖ヨリ四五寸ノ間。兩邊潔白ニメ。鮮明ナリ。其内ヨ、ソリンハ。發芽ノ取ヨノ銀邊潔白ニメ。金稜邊ノ成長ノ後ニ現ル、ニ異ナリ。秋花ヲ開ク。瓣ノ兩稜モ潔白ニメ。葉ト同シ。香氣モ高クメ愛スベシ。

緑葉中白色ノ間道アルモノ。コレヲシマラント云。ワノ葉質又白色ノ潔白帶黃木

ニヨリ花戸種々ノ花ヲ下ス。今一キセズ




ありサクシ 茂蘭 紫蘭

葉状ハクチニ似テ長六幅一寸餘長二三尺。色深緑質厚ノ光澤アツテ能ク直立ス。早春花ヲ開ク。花寒ヨシノヨコレナル者ノ如クノ更ニ暗紅紫ヲ帶ズ。香微ニシ清韻ソシ。



形歲蘭ノ如クメ稍小葉微
薄フメ尖銳根邊詰ヲハテ
摩スレバ鐵鍬法アリ。花歲
蘭ト同取ニ開キ形色亦同

フメ稍小





キンリヤウヘン 千葉シエラン 紫蘭


葉風蘭ニ似テ根茎ノ葉緑色ニノ斜ニ垂レテ直
上セス。一窠七八葉株生シ。三月頃花ヲ開ク。莖
長一尺餘。二十餘葉ヲ桃葉ニツク。瓣大トラバ
色淡黄緑皆ニメ邊縁ヲ桃葉ニツク。瓣大トラバ
氣絶テナシ。一種花蒂青色ナルアリ。花戸之ヲ
ホウメイラント云



ホウラン

風蘭

葉他ノ蘭類ニ比スレバ右狭長ニメ大差ナシ。面滑澤ニノ光アリ。中筋一道ノミニ
メ他ノ條脉ヲ不見。一窠四五葉。ソノ莖ノ出ルマ互ニ相集リ逆ルヲ以テソノ長ル
ヤ正直ナリ難シ。初冬花アリ莖短クノ直立セス。盆外ニ偏垂ル。故ニ鉤リモノトシ
テソノ看最佳シ。苞葉莖共ニ淡黃白色微ニ帶紫暈。花白毛瓣に紅紫ノ斑條アツ
テ鮮美尤可觀。只純テ香十キヲ減ハ根線條硬ノ長ク延ニテ鬚毛アリア。他ノ蘭類
ノ根ト同ジカラス。一種春ニ至テ花ヲ聞フモノアリ春ホウラント云。葉狀花形同
シケレハ辨中ノ虹暈少キノ異アリ



シテアリ。野中、山野にて見たり。根出葉一葉、下垂て、葉身狭長、先端鋸歯状、葉縁に毛がある。花茎、高さ四十センチメートル、葉より高く出て、花序、花数枚、葉より下垂す。花は、花被片五枚、花被片の間に雄蕊二個、花柱、子房、花被片の間には花被片の内側に子房が位置する。花被片は、花被片の外側に花被片の内側に子房がある。花被片は、花被片の外側に花被片の内側に子房がある。

小文字

風



ホケロ 春蘭一種

山野ニ多々自生シ。眾ヨク通知ス。葉狭長ニメ。剝ク。指ヲ以テ邊縫ノ隙スレバ。棘沙ナル。ハクランノ如シ。莖頭少々一花形。花ト同シケン。奇端緑色ニ。香至ア微ク殆ド無カ如シ。ヨク実ア結ブ形。建蘭ノ實ト同レ



子種

十六

王本樂

卷之十八

立本作業

石斛

通名

山中巖上ニ生ス。莖木質ノ如クニノ小高五七寸。每節一葉形披針狀ニメ。葉ノ先アリ。初夏ニ舊莖、新節上毎ニ花ヲ開ク。一或ハ二形。白及花ニ似テか。白色ニメ。粉紅ラ
帶ブヲ常トス。稀ニ紅暈深クノ殆ト淡紅花ナルアリ。柱頭帽下ニ薬アツキ。長蒂子
室トナリ。後突ソ結ブ皆ノ形。ミナ蘭類ノ常套ニ外ナラズ。近世此品甚ニ風蘭ノ類。
ニ草形葉狀ノ異品多々アリテ。好度之徒玩弄者モ盛ナリ。其種多クハ一枚ノ変態
ニ出テ花實ノ異アルト鮮シ。故ニ總テ略之シテ載ス。

第二十七

エバーデンドルム
Epidendrum moniliforme 罗

ケッテングアフチフ
Habenaria hamata 蘭



通志卷之十八
本草 十二
山中巖上ニ生ス。莖木質ノ如クニノ小高五七寸。每節一葉形披針狀ニメ。葉ノ先アリ。初夏ニ舊莖、新節上毎ニ花ヲ開ク。一或ハ二形。白及花ニ似テか。白色ニメ。粉紅ラ
帶ブヲ常トス。稀ニ紅暈深クノ殆ト淡紅花ナルアリ。柱頭帽下ニ薬アツキ。長蒂子
室トナリ。後突ソ結ブ皆ノ形。ミナ蘭類ノ常套ニ外ナラズ。近世此品甚ニ風蘭ノ類。
ニ草形葉狀ノ異品多々アリテ。好度之徒玩弄者モ盛ナリ。其種多クハ一枚ノ変態
ニ出テ花實ノ異アルト鮮シ。故ニ總テ略之シテ載ス。

黃公本草

卷之十八

本草 十二

十七

本草 十二

黃花石斛

卷之十八

主。伏產。ノ。莖葉常鐘ニ。大異ナケレ。氏節上細。莖ヲ出シ。分叉シテ三五花ノ開。

略同シ。フシテ色淡黄緑。

按未見西書載此種者



卷之十八

二三編一目

雀髀斛

ラサラン

バツコララン


茎石斛ノ如クノ差太フノ短ク。多ク並ニ連生スルノ形態^{オサヤ}ノ態アルヲ以テソノ名

ツ得。莖多ハ二節。梢頭ニ葉對生シ形石斛ノ葉ノ如クノ稍大。三月中心一梗ヲ出ス

一寸許。二小鱗葉アリテ上ニ一花ヲツク。形石斛花ノ如メ小ニタ白色。密櫛瓣心黃

褐色

按上条ノ属ニメ種名未詳



林木同美ニ附キシム

二小鱗葉

時同ノ外ニ此苗ニ對ケテ

此苗ハ

ノ葉ノ形アリテ其葉形狀相合

アリ

其葉一葉裏ニ葉脈二小半斜ニ互生發

アリ

其葉一葉裏ニ葉脈二小半斜ニ互生發

アリ

其葉一葉裏葉脉入喉丸と呼ぐ。脉毛則實脉毛ニノ型ニ者數脉アリ。葉毛細弱

アリ



ムギラン

麥斛

卷之十八

五十一

一茎一葉莖葉粒ノ如クメ粗フ。短ク淡黃綠色ニメ豎ニ數株綴アリ。葉卵圓披針
狀ニメ厚ク。中心一道アリ。夏莖側ニ一梗ヲ出シ一寸許。上ニ一或ハニ二花ヲツク。
簇一弁翼ニ弁翼下ニ二小弁併テ五弁。翼ハ末細メ尖リ長ク突出シ。蜜槽弁ハ小ニ
メ深ク潛ム。ソノ狀石斛准牌斛ノ花トハ稍異ナリ。兩莖並子室ノ形ニアツテ、大
抵相同シ。花ニ紅白二種アリ。所圖ハ紅者ハ葉莖共ニ暗紫メ葉アリ。附一全花
二心黃並約

按亦同族ニ収ムベシ



シカウラン

根大葉麦解

一茎一葉麦解ノ如ノ大ニ。葉ノ長四五寸ニノ厚シ。稀ニ一莖二葉ヲ生スルアリ。夏莖側細莖ヲ抽クノ五七す。莖間ニ二轉アリ。秋ニ至テ莖頭無香ノ五六花ヲ継生ス。每梗一小披針狀葉アツテ護之。梗三四分。花蘭花様ノ五瓣。翼狹長寸餘ニノリ。旗ハ小ニメ亦尖ル。兩間ニ二小瓣中位ニ蜜槽瓣アリ。形範狀ノ如クノ上ニ曲リテ柱ニ對ス。柱ハ蘭様其体ナレ瓦別ニ膜様片アツテノノ背ヲ彼ニテ。薦ハ柱頭ニ潛ム。態テ淡黃褐色ニメ淡紅紫ヲ帶附去花瓣看柱與蜜槽瓣即大圖。



前条種ノ如ク鬚根上爲圓珠狀ノ一莖。塊根ノ如ク立テ項上ニ一葉アリ。長三四寸。
形叶葉ノ如ク。色淡綠ニメ一茎アリ。葉本ニ四片ノ葉アリ。軸中一片差長ノ尖鋸殆
ド葉ノ如シ。晚秋葉心ニ沿フテ一花梗ヲ出ス。太サ萎瓣ノ如ク扇。兩側瓣削稜ヲナ
レ。頂二十條花ヲ以テ二寸餘ノ序總狀ツナス。花ハクモキリサウノ花、如メ羞小
一大唇五細弁ソ以テ成ル。ソノ三弁ハ形披針狀ニメ邊緣外反シ。唇下ト柱後トニ
アリ。又二弁ハ系ノ如ク細メフノ兩側ニ垂ル。色淡黃帶褐。柱葉クモキリサウト同
織。以御大葉經年不枯レ。一度花アレバワノ故莖ニ再ヒ花ヲ不出。コクランノ
類ニ同シ。又此種芽ヲ出ス。トむ曉シ。故ニ花亦曉レテ冬ニ至テ初テ盛ンナリ。草形
シコウラン又ムギランノ類ノ如クナレバ。葉形同シカラス。又花形ニ在テハクモ
キリサウノ如ナレバ。別ニ一鍾ニメ前条種ノ族ニ収ムヘキモノニアテズ。

按亦モジラムノ属ナルベキモノニアテズ

エビデンンドルヌ



好葉木本

名類蘭

四國並南紀寺ノ古木或ハ叢上ニ生。葉鈍披針狀ニノ甚タ厚ク。潤六七分長四五寸一根四五葉ヲ極トス。夏根側花莖ヲ抽ク。五七寸。有梗六七花ノツク。略蘭花如クタ。蜜槽瓣下ニ短嘴アツテ前ニ勾ルヲ以テコノ特標トス。蕊テ白色ニノ淡緑葢アリテ。下側ノ二瓣ト蜜槽瓣トニ紅蟹色ノ斑点アリ。又微香アリ。一種小葉者南勢ニアリ。葉長一寸餘幅四五分。花亦同形ニノ小ナリ。附一葉体。二葉共鄭大圖

按種名未詳



琉球入西山ニ産ス。草名護蘭ノ如クノ豊大。姪年久シキモノハ脚下葉脱シテ莖粗

キ一指ノ如ク高二尺ニ超エ。夏葉間處々ニ花茎ソ出シ數花房ヲナシテ開ク。形亦

ナゴランノ花ノ如クノ微大。黃色ニノ赤褐ノ斑アリ。柱同様ニノ短ノ。萼瓣尖リ香

ナクノナゴランノ清遠ナルニ劣ル。附柱体弱等部大圖。



卷之十八

風蘭

正木草

暖地走木樹上ニ生ス。葉狹長ニテ厚ク劍脊アリ。大ナルハ長四五寸。左右互ニ抱擁シテ。十數對ニ余リ。六月葉間ヨリ一莖ヲ出シ。四五葉ニ分レ。每頭一花。白色ニノ瓣狹長。旗三瓣上ニ並ヒ。兩翼側ニ下垂シ。蜜槽瓣三尖心葉ヲ兼フ。共蘭様ニゾ嘴アリ。長クノ勾ル。清香蘭ノ如ノ微ナリ。近世葉状花形ニ些異アル數十品ヲ出シ好事ノ徒玩尋覓レシ。今枚舉ニ暇アラズ。附芸体等約郭大園

Limeloen tacea. 春武

リモドキ

タヒカ



卷之十八

三本草

ナギラン

南紀山中ニ生ス。一窠ニ葉形針状ニ厚潤質報春蘭ホウサイランノ葉ノ如クニメ短ク脚長ク葉ヲ幅エテ六七寸。ソノ潤葉ノ处略竹柏チキョウノ葉ノ如シ故ニソノ名アリ。夏根際莖間ヨリ一莖ヲ出ス。五六葉ニ分レ毎頭一花。形小ランノ花ノ如ク。外二瓣毛細ク色白質淡黃董アリ。内二瓣齊槽共ニ白色。齊槽瓣尖リテ僅ニ及シ裏面紅紫斑アリ。清勝愛スペキモ香ノ可賞ナシ。心葉ノ形建蘭ト同フシテ只帽上粟紋アツテ色蒼褐。蕊ノ色反テ淡黃ナルノ異アリ。



ナギラン

南紀山中ニ生ス。一窠ニ葉形針状ニ厚潤質報春蘭ノ葉ノ如クニメ短ク脚長ク葉ヲ幅エテ六七寸。ソノ潤葉ノ处略竹柏ノ葉ノ如シ故ニソノ名アリ。夏根際莖間ヨリ一莖ヲ出ス。五六葉ニ分レ毎頭一花。形小ランノ花ノ如ク。外二瓣毛細ク色白質淡黃董アリ。内二瓣齊槽共ニ白色。齊槽瓣尖リテ僅ニ及シ裏面紅紫斑アリ。清勝愛スペキモ香ノ可賞ナシ。心葉ノ形建蘭ト同フシテ只帽上粟紋アツテ色蒼褐。蕊ノ色反テ淡黃ナルノ異アリ。

ナギラン

南紀山中ニ生ス。一窠ニ葉形針状ニ厚潤質報春蘭ノ葉ノ如クニメ短ク脚長

老樹上ニ生シ。披針狀ノ小葉互生シ。鱗様平扁ニ並フ。櫟樹葉ノ如シ。葉間線根ヲ
出シ中道ニ並ヒ下ツテ殆ト束聚スルガ如クナリテ樹皮ニ掛リツク。夏小葉間ニ
細織ノ一花莖ヲ出シ長ニ三寸。有梗四五花ヲ開ク。形ナガラン花ノ如クメ瓣短ク
色淡黄ニメ。蜜槽内紅細点アリ。生殖諸部蘭類ニ同シ。一種小葉ニメ紅紫細点ヲ滿
布シ花色帶紅ナル品アリ南勢ニ生ス。ベツラン又ベニカヤラント云。

按己下五種全形各異ナレ。托葉質花形ソノ趣ヲ同フスレバ共ニ同類タルモノ
如シ。六ニ西名未詳。



卷之十八

○二十一日

カシノキラン

カヤランノ大葉ナルモノ、如シ花形亦同シ

如シノ花形下

色及葉之葉付

如シノ花形上

色及葉之葉付



新山寺跡土ニ生バナウツハシガルモニヤアリトヒテ甚大ニ其花之少人ニ

卷之十八

二十一

卫ウラクラン

モミダラン

ヒアフギラン

深山老樹上ニ生ス葉厚クメ小略ムカデランノ如クノ差大ニシ夫ル。七八葉密接

互生ス花形次条ト同シ故ニ略之



同上
根出葉葉厚クメ小略ムカデランノ如クノ差大ニシ夫ル。七八葉密接
互生ス花形次条ト同シ故ニ略之

大葉エウラクラン

余亦詳產地。或云江州山中老樹上ニ得ト。形前条ノ如クメ大ニ大抵四五葉ヲ以テ
一株ヲナス。葉尤厚ク邊緣絞薄。裏稍葉中心一茎ヲ出ス。二三寸。暗紫色ノ細碎花
ヲ綴リテ穗ヲナス。每花一片ノ細針苞葉アリ。花尖卵形五瓣三大ノ蜜槽辦併テ六
瓣。心黃蘭様頭黃色。附全花莖大圓。



葉大リテ葉之葉縁絞薄。裏葉中心一茎ヲ出ス。二三寸。暗紫色ノ細碎花
ヲ綴リテ穗ヲナス。每花一片ノ細針苞葉アリ。花尖卵形五瓣三大ノ蜜槽辦併テ六
瓣。心黃蘭様頭黃色。附全花莖大圓。



ムカデラン

卷之十八
二十一日

南紀山中ニ産ス。莖粗赤ノ如ク樹皮上ニ蔓延シ。葉互生長二三分幅五釐ニ足ラズ。
指圓ニノ扁面ニ一滑條路アリ。葉間處々ニ線根ヲ出シ以テ樹皮上ニツク。夏秋ノ
際葉腋ニ二三分ノ梗ヲ出し花ヲ開ク。形エビ子或ハチドリサウノ花ノ如クメ至
テ小帽一翼大小四瓣ミナ淡紅色。蜜槽瓣大ニメ本ニ二尖起アリ。半唇状ヲナシテ
亦尖リテ白色。心葉蘭様帽等黃体紅色。距アリ短ノ蜜槽瓣后ニ出ツ。附金蕊部大

圖



卷之二

又子股

正木



南勢南紀等ノ古木上ニ生スルチクランフウラン等ノ如シ。老タルモノハ長ニ

尺許ニ至ル。葉互生形圓長等ノ如クノ四岐不凋葉老レバ漸ク枯腐シテ茎ヲ長ス

ル。石斛ノ如シ。夏莖上花ノ開ク五瓣淡綠略蘭花ニ似テ小ニノ香ナレ。寒暑易長

ニメ暗紅ノ密点アリ。葉状亦略蘭類ノ如シ。附一帽。二觀帽見药圖。

ニジマツヒラム
Pholidochelone rotundata
チレス
春友



一根數莖ヲ集生シ。莖粗サ小指許高一二尺。葉互生シ。本鞘様ニ莖ヲ包ミ形略コク
ラシノ葉ノ如メ大。秋二三ノ脚葉間ヨリ花莖ヲ出ス長ナ尺許。す余ノ葉葉アツテ
互ニ擁之。梢ニ至テ漸ク小。梢葉間毎ニ一花ヲ出シ向上テ開ク。形蘭花ノ如クメ大
五六分。披針狀ノ白質黃暈アル五瓣葉露糟弁柱体等ノ狀略蘭花ノ如メ香ナシ此
品秋花莖ヲ出シ冬土窖中ニアツテ初テ開花ス。根粗ノ線様亦略蘭根ト同シ。

所屬未詳



シラン 白及

春芽ヲ出シ四五葉ニ介心。葉形エビ子ノ如クナレヒ稍狭長ニメ脚筒ヲナレテ上
リ。葉心一茎ヲ抽キ玉六ノ紅紫花アツク。一穗白花ナルモノ又花五瓣ニゾ無事。蜜
槽ノ傳長メ下ヨリ心葉ヲ抱擁シ。心葉長ノ扁。背隆起腹凹陷溝フナミ。雄蕊ソノ頭
ニ位シ鱗状帽アツテ内ニ黃蕊ヲ貯フ。蕊ニツニ分レ又各四令スルトケイ。クハク
ラシ等ト同シ 附葉傳蕊等那大圖

按此品新芽ノ葉心ニ花茎ヲ出スヘハ。全クエビ子ニ同フメ葉脚筒ヲナシテ上
ルトハケイト同シ。故ニ全体ケイト同クメ稍小ナルノミ。又花形葉状ニ在ツテ
ハケイクハクラン等ト一般ノ趣ヲナス


リモジニナム ストライアトユム
Lindernia striata 春氏 西勃氏、*Philenorium* 二属ストス





ガ・ン・ゼ・キ・ラン ケイ

暖地ノ産ニノ南紀ニモ亦自生アリ。根トナ福ニノ葉脚筒福茎ノ如ク立ト六七十
ニノ。葉ヲ開クト白及ノ如ク。葉形亦白及ニ似テ差大ニメ冬不凋。春ソノトキノ半
脛ヨリ花茎ヲ出シ長サ天餘。上ニ數花ヲ開クトハクラント同シク五瓣ニメ形
略クハクランノ花ニ似。又色金黄審槽ノ口邊緋褐ニメ紅紫ナラズ。子室蕊状亦大
抵アノ趣ヲ同フス。畢竟クハクラント同一類品ニカル。一種葉ニ黃斑アルモノ
アリホシケイト云又ソノ斑細ナルヲ金ケイ稱



鵞頭參
根一寸許。莖葉合生。根生於莖上。根頭有黃色毛。全形大如馬齒。冬最外一層葉間有花芽抽出。春發芽。葉長。夏秋生枝。葉上生茎頭十許枚。細小如米。葉長五寸許。葉面有白粉。葉緣有鋸齒。葉脈有橫出者。葉狀如馬齒葉。根頭如馬齒頭。



处々山中往々自生シ。寒地所産尤多シ。草状ケイニ似テ筒体低フメ葉潤短。冬凋ミ春芽ヲ出ス。葉赤タ全ク開カサルノ際ニ中心花茎ヲ出しテ花アリ。形ケイノ花ノ如ニメ差小。蜜槽体短フメ唇差ヒロガル。草ノ大小ニ二種アリ。草ノ大小花ノ色多種アリテ既花家ノ銘名甚タ多シ。概スルニ草ニ大小ニ二種アリ。ソノ小ニノ葉弱ナルフ花テノサニビ子。追道尤ソノ差大ニメ副キヲ草ニ卫ビ子ト称メ分之。又蜜槽瓣大ニメ裂積多キヲ天サルメント云。タノ色純黄ナル者特リ吾北山ニ出。花戸之ヲキサルメント称モ貴重ス。今コ、ニサルメントニノ一花ヲ併セ圖ス木曾山中ニアツテ弁潤姫ニノ蜜槽弁大ニメ尖鋭嘴亦大ナルモノト産ス。名府ニ之ヲコラント云。ソノ形一殊態アレハ亦本条ノ一種ニカヒ。惣テエヒ子ノ顎種々アレハ生殖部ニ於テハ一般トス。故ニ詳ニソノ詳狀ヲ記ス。似類ノ子室ハ蒂ニメ蒂中突起ヲ取ム子室ノ頭五弁心ニ出テ短筒様フナス此之ヲ蜜槽体トシ。ソノ下邊前ニ挺出スル一弁之ヲ蜜槽弁トス。筒内ノ邊尖鱗形ノ一行之ヲ帽トシ。帽ヲ排スレハ内ニ薬アリ。子網ニ方之ハソノ本嵌合ノ一茎ニテ左右ニ分レ。左右又各二分シ每茎各ニ薬ヲ戴ク合テ八薬トス。花被未衰モ僅ニ老レバ則帽薬共ニ脱シテ一凹腔ヲ餘スヲ見ル。筒弁ハ雌雄兩蕊ノ交接生殖フナスノ機アル處ニカヒ。ソノ状蘭類ノ蕊柱ト蜜槽体ト

離レテ相臨對スルト同シカラザレバ。ソノ用一般トス。嘴ハ長ク蜜槽体ノ後ニ出テ又蜜槽弁ト相連接ス。各以詳圖示之

エヒンドルコム
モルヲラスム

春氏

甲瓣 ひ蜜槽体 西帽 丁蜜槽弁 戊子室
口嘴 去帽見 雄蕊部 大圖




天

天

方茎山

コラン


木曾山中ニアリ。草状エビ子ト同フシテ花辦差や瓣短ニメ琉球ニビ子ノ花ノ如クノ小。白質ニメ淡紅紫暈アリ。蜜槽大ニメ尖銳。嘴亦大ニメ尖ル。足ビ子縕中ニテツテ顔ル異態アリ。名前ニコランノ名アツテエビ子ノ種中ニタツ。蓋シコランノ名ハ名前玩花者流ニ出ルモノナラシ



上ビ子ノ類ニノ草茎小ニメ花開ト曉ンテ六月ニ至ル。草状大異ナケレ此花豈ヲ
出スコクハテシノ如ク。最外一重ノ内ニ在ツテ。エビ子ノ葉心ナルト同ジカラズ。又
花瓣狭長ニメ尖ルヲ以テ一種慾アリ。花色種々アレ。此エビ子ノ多ガ如クナラズ。



木曾山中ノ産。全形夏エビ子ノ如ノ差小。四月脚葉間ヨリ花茎ヲ抽ク一尺許ニメ
花アリ。瓣長ノ尖リ三瓣大ニ二瓣差小ナレバ。夏エビ子ノ狹細瓣アルガ如クナラ
ベ。黄緑睿瓣黄色喉ニ褐赤ノ條アリ。夏エビ子中ノ一瓣花蓋早ク瓣形異ナル
ツシテ。名府ノ玩花家分之ニキンセイランノ名ヲ下スモノナラン。




リウキウエビ子 クハラン

卷之十

正本

暖國産一メ呂卿ニテハ土窖ニ入サレバ寒ニ堪ヘズ土窖中ニナハ冬猶葉ヲ保草
状ニビ子ニ同フメ稍大ソノ花茎ヲ出スヤエビ子ハ葉心此種ハ夏エビ子ト同ク
最外ノ一葉内ヨリシ花ヲ開クト晚夏ニメ夏エビ子ヨリ晚シ花色紅紫白ノ三種
アレモミナ純色ナラズ生殖部異ナシ



卷之十八

五木之類

サ、バラン

ス、ムシサウ或ハ白及等ノ如ク。葉五ニ抱テ出別ニ莖ナク。葉白及ノ葉ノ如クメ
潤短縱道深クメ聚積ヲナシ。色淡緑脚暗紫ヲ帶ブ。葉背縱脈亦然リ。大抵四五莖
中心一花莖ヲ出ス。一尺餘方ニメ條道アリ。莖上疎ニ有梗毛ヲ以テ長穗ヲナス。
苞六瓣形飛鳥ノ如シ。一瓣伸ヲナシ下側ノ二瓣ハ翼。莖下ノ二瓣長瓣ハ脚。后出ノ
一長瓣ハ尾心黃首ヲナス。瓣ミナ反捲色淡緑ニメ暗紫暈アリ。心黃蘭様ニメ淡黃
緋色帽ヲ掛スレバニ黃鶴ヲ見ル。根塊水仙ノ類ノ如ク。葉枯宿根經年。此品南紀那
智山多ク性少ク畏寒。



竹林樹下所在コレアリ。產地ノ寒暖ニヨツテ大小一ナラズ。世人漫ニ琉球ト稱スルモノハ最大。南紀產汝之吾邦北勢等ノ者ハ最小ナリ。大小不一ニ形狀異ナシ。葉ハサハランノ如メ冬凋ガ邊緣波紋不平。葉脚茎リ色ミ一莖三四葉。心一莖
莖ヲ抽キ高六七寸。疎穗花ヲナス。亦サハランノ如ク。但花辨ニ差暗紫黑色ヲ帶
フルノミ。故ニコクランノ名アリ。莖葉凌冬ケモ一度花アヘハツノ莖復花ヲ出サ
ズ。花後莢ヲナシテ寔ヲ結グ。略春蘭ノ如シ。年ヲ経テ葉漸ク衰落シテ莖不枯。裸
ニノ肥厚多腋大指ノ如ク。長三四寸。小者モ二三寸ニノ細シ。三四節アツテ青翠。莖
一度落シバ復葉ヲ出サズ。節上更ニ莖ヲ出シ蘚苔ヲナシ。苗本線根ヲ出シ終ニ地ニ
下テ新葉ヲナス。根ノ則亦ヨク芽ヲ出シ花ヲツク。故ニ數年ニノ多莖並列手指
ノ並ブカ如ク然リ。根線様蓋レコノ莖ハ塊根ノ地上ニ出ルモノニメ。崔理解石斛等ノ
莖ニ於ルガ如シ。兩芸蘭様如那大國



道道所産コクラン

卷之十八

三類一目



卷之十六

本草

一葉ラン

北地深山幽谷ニ生ス。一葉一莖。葉ハ柄短ク形橢圓ニメ夫。長二三寸幅二寸許カタク

リ葉ニ似テ薄メ小。縱道横紋アツテ頗ル綱様纹ラナス。葉側一花莖ヲ抽ク。四五


寸。根上二莖。莖間一莖。頂ニ一花ヲ開ク。形蘭花ノ如クメ差小。色淡黃綠ニメ春槽管

瓣白質ニ紫点アリ。葉亦蘭様。後實ヲ結フ春蘭ノ實ノ如クメ小。根線樣蘭根ニ似テ

細小



木曾山ノ溪間ニ生。一葉一花茎ノ形。略一葉ランノ如ナレ。葉脉彼ノ如ク綱紋ヲ
ナサズ。一葉ニ添フテ生シ高二三寸。莖梢二三花ヲ開キ。毎花一小葉アツテ護之。
花形亦一葉ランノ花ノ如ナレ。色淡紅。弁葉ノ形一様ナラズメ同族ニ叔メガタ
シ。始ク後日ノ精検ヲ期ス



コケイラン

サ、エゼ子

深山幽谷ニ生。根塊球ヲナシ一根ニ葉。狹長卵様ニメ尖鋸一尺餘。條道アリヲ瀧ヨリウス。春葉側一茎ヲ生ヘ高一尺餘。疎ニ有梗花ヲ五生シ穗ノナス。五瓣略蘭花ニ似テ小黃色ニノ微褐ヲ帶ヒ。蜜槽白色。瓣本兩側ニ各一小裂片アリ。蕊亦蘭様ナレヒ帽緒ノ薬ノ頭上ニ繁ルノ形ニアツテハソノ趣ク異ニス。故ニ以郭大圖示之。



サイハイラン

山中樹陰或溪澗水側ニ生ス。根球様ニメ一根多ハ一葉。間マ二葉ナルモアリ。形エ
ビ子ノ葉ノ如クメ長ク。春末葉側ニ一茎ヲ抽ク。花數多也。一側ニ垂下シ穗ヲナ
ス。四五寸。花細長五弁。審措一弁。形トケンランノ花ニ似テ微大。色淡黃帶褐唇ニ
紅紫斑アリ。心音亦蘭梯和州多峯ニ産スルモノハ底色紅レ。



トケンラン

吾北山幽谷ニ生ス。根球塊ニメコケイランノ如ク。一窠ニ葉形サハイニシノ如ク。ノ差小。背ニ紫点アリ。房ニ紫点ナリ。葉側一茎ヲ抽ク。花餘珠ニ有梗花ヲ五生ス。花ユケキラニヨリ大ニ瓣狹長ニメ尖リ。黄色ニメ微褐ヲ帶ニ紫細点ヲ滿布ス。萼槽瓣稍大ニメ白色鮮明。



新山幽谷ニ生ス。根球塊ニメコケイランノ如ク。一窠ニ葉形サハイニシノ如ク。ノ差小。背ニ紫点アリ。房ニ紫点ナリ。葉側一茎ヲ抽ク。花餘珠ニ有梗花ヲ五生ス。花ユケキラニヨリ大ニ瓣狹長ニメ尖リ。黄色ニメ微褐ヲ帶ニ紫細点ヲ滿布ス。萼槽瓣稍大ニメ白色鮮明。

ヒトツホクロ 京同名 チヨクリウセイ 名古屋
アリ

三

五木

深山幽谷陰地ニ生ス。一撮一葉柄長一二寸。葉卵圓披針狀長二寸許。幅六七分。表深綠色ニメ光澤。五縱道アリテ。中筋上ニ一ノ白道アリ。背紫紅色ニメ銀脉淡白。根圓尖ニノ雄子ヨリ大ナリ。葉側纖細一茎ヲ出シ長七八寸。至細鱗様ノ二三葉ヲ互生シ。梢頭穗ヲナシ碎細花ヲ經ル。後實ヲ結フ蘭實ノ形ニメ小。

所屬系詳



卷之十八

正本草

テガタチドリ



チドリサウハ深山溪間ニ生シ。葉エビ子ノ葉ノ如クメ狹小。ニメ質柔滑茎ヲ抱テ互生シ。梢ニ至テ愈々小。莖高尺餘春夏ノ陰莖頭ニ穗ヲナシ花ヲ開ケ。花リウキウエビ子ノ花ノ如クメ小。三小弁兜ヲナシ。二大弁翼。唇槽一弁併テ六弁。毎花一小狹葉アツテ護之。色大抵淡紅紫。或ハ濃或淡或殆ト白色。兩葉ノ形略エビ子ニ同ク。根形小指ノ如クメ小ニメ尖長。數塊直下ス。此種產地ニヨツテ種々不一。本条所圖ハ草稍大ニメ根ノ數多ク。並列十余ニメ恰モ手指ヲ並フルガ如シ。花戸曹吉豹獄ニ得テ自ラテガタチドリノ名ヲ下ス。余ハ之ヲ吾北山ニ採ル

ラチネリア
Catfishia
エヌキスコライド
アーチー
groota_hanckeliana
マムカヘン

按チドリサウ類ノ解大サギサウノ下ニ詳ニス宜併考フベシ

卷之二

本草


追道所產ノチドリサウニ種々アリ。

大ナルハ高ニ尺許小ナルハ一尺餘ニメ葉ニ

長短廣狹花ニ大小色ニ淡紫或ハ白等ノ不同アレ也。

概スルニ上条種ト同一族ニカヽル然レソノ根形ニ差異アリテ多クハ線様ノ粗短ナル者ノ横ニ延ビテ上

条ノ手指形ニ並ブガ如クナラズ。今ソノ根形同様品中ノ三種ヲ舉グ



草上条種ヨリ小ニメ花却テ大ニメ色差淡



卷之十八

五本草

葉大ナラズシテ花大ニ瓣ミナ尖銳ニメ色差濃唇ニ紅紫ノ細点アリ根形前条種

ト同シ

白山所産キドリサウ

按 フルシス 第三族四族ホノ下ニ林氏鑑氏共ニ數種ヲ載レバ 本邦所産ノ中種
名的當ナルアルベキモ 余未ダ考ヘス



葉大ナラズシテ花大ニ瓣ミナ尖銳ニメ色差濃唇ニ紅紫ノ細点アリ根形前条種
ト同シ

卷之十八

二十號一目

立本草書

立本草書

茎高カラサレニ葉普常ノチドリサウヨリ長大。

花數多カラズシテ差大ニ。五瓣ニメ翼好テ後ニ反シ。蜜槽瓣及ヒ嘴ハ長ク色共ニ白フメ微綠ナ帶ア。ソノ形略サキサウノ如ノ極大。且多ク連リ開クア以テツレサギサウノ名アレ。根形サギサウ。

如ク珠塊ナラズ。線條ノ大ナルモノニメ。太サト指ヨリ差細ク長クシテ多條直下シ。略チトリサウノ指様ナルモノニ追シ。附兩蕊共審薄連郭大圓明雄蕊狀。

按花形ニヨリテツレサギサウノ名アレビ亦チドリサウノ族ニ収ムベキモノ、
如シ



此物根莖之葉不常ニニシテ葉
花葉之葉之葉如是者也

花葉之葉之葉如是者也

卷之十八

五木等

ニツチドリ

ジヤカウサギ

水澤湿地ニ生ス。莖二三尺葉狹長ニテ尖鋸茎ヲ色テ互生シ。梢ニ至テ漸々小。莖頭
疎穂ヲナス。三四寸白花ヲ綴ル。形チドリサウノ如メ小翼唇共ニ橢圓嘴差長ク。

メ帽不長。毎花細長一葉アツテ擁之。花ニ佳香アリ故ニジヤカウサギノ名ヲ得。根
線様ノ粗短ナルモノニテ。太者小指許ニノ。長數寸十數條拂ニ地中ニ延ブ。


第八種

按 *Orchis hypoleuca*. 罂 *Ophrys hypoleuca*

Habenaria hypoleuca. 蘭ノ形狀并ニ佳音アリ。殊ニ

阿須式ノ圖ニ通ケレモ。根形同シカラサルヲ以テ。

的當ト断シカタシ。或ソノ一種トゼンカ



キンギンサウ

卷之十九

莖高一二尺。葉披針狀。長五六寸幅寸余。厚。緣端好。外反。色淡綠。形狀總テツレサキサウニ似。粗大。葉ノ本細。ノ柄様。ナシテ莖ヲ包テ五生シ。梢上細。肉胞ヲ密簇シテ二三寸ノ穗ヲナス。花五弁略チドリサウニ似。テ差小ニ。嘴ナク。子室亦同様ナレ。心葉ノ状ハ。正ビ子類ノ如ク。帽アツテ内ニ二雄蕊ヲ藏。チドリサウ類ノ直ニ雄蕊ノ露スカ如クナラバ。根長キ鬚様ニメサキサウチドリ草ノ類ト同カラズ。又莖經冬不凋。別ニ莖ヲ出シテ次年花ヲツクル。前説二草トソノ趣ヲ異ニスレバ。一族ニ収ムベカラザレ如ニメ。所屬未考。產所不詳。或ハ云海外產ナリト。附一全花一倍圖。二排帽露ニ雄蕊。三心葉密增共郭大圖。



遠別勢州等ノ山崖原野ニ生ス。莖高尺余大ナルハ二尺許ニ及ブ。葉披針狀ニ幅寸許長三四寸。淡綠ニノ白線邊アリ莖ノ擁ノ互生シモニ至テ漸ク小。梢上花下ニ在テハ全ク葉ノ状ヲナス。花ノ形色殆ト鷺毛玉鳳花ト一般。蕊レヒ小瓣ノ數多。一瓣帽ヲナシ帽下ニ小瓣帽側ニ瓣唇。一大瓣ニメ三裂合シテ六瓣ニタサギサウニ一大瓣二小瓣ナルト同ジカラズ。又ソノ唇瓣ノ剪裁サギサウニ比スレバ差淺キノ異アリ。又蜜槽後側細長一筒尾形ヲナシ。子室角様ナル等ハ全クサギサウニ同ク。又生殖部ノ状亦略同シケレバ。色白ノメサギサウノ淡黃緑色ナルニ不似。根ハ塊様大サ姆指ノ如クノ短ク。莖下ニ二箇相並ビ。塊ニ鬚ナク別ニ數條ノ細線根ヲ添フ。

ヨルシス
orchis. 蘭

マツバランコロイド
luteola

ヲ考ヘズ物印滿
ヨルシス ゼニ ハスチス
mekis Japonica
マツバランコロイド
luteola 蘭ノ名下ニ所載ノ圖。惟テ木条ノ形ト同ク。只細糸ニ些異アルノミナレバ。假令同種ナラザルモ。ソノ一種タルニ論ナシ

按ヨリシスノ種類尤多シノ故難分明ナリ。故ニ今林氏ノ說ヲ領略ノソノ要ヲ示ス。左ノ如シ林氏所說ヨリシスノ概據ヲ據ルニ。ソノ記述タルミナ尾アリ。雄蕊纖莖ニノニ。ヨレヲ被ニ小膜片アリ。破綻ノ時ニ見ユ。ソノ薦タル被籠ナク。只纖糸ノ卷縫上ニ花粉ヲ滴布ス。ソノ種三十四之ヲ大別シテ四族トス。第一ハ尾花兜ニ出ル者。按ニ「アルシム」ノ尾タル多クハ蜜槽ノ一端ニ出ワ。独リ第一族ノ尾ハ花兜ニ出ルヲ以テ分之。ソノ旗下ニ三種ヲ舉ケ。二種ニ詳固ヲ添フ。據之ニ木邦ニ約當ノ品ヲ示ト見ス。第二根塊様ニノ全折セザル者。此族ニカル種亦モ多ク。欲武阿須氏等各數圖アリ。當ノ品ハ。木邦ニ於テ未ア見ズ。特リ大サギサウノ根形ノノ族中ニ入ルベキアリノミ。此族ノ根ナルベキノ考アリ。木邦先輩ツバノ方モ一ツ以テ。ヨリシス。此族ノ根形等亦様ナラズ。氣味粘滑亦同ジカラ。ザーバ從々ガクシ。金近政大サキサクハ根ヲ取リ加法製造ス。形色氣味粘滑船來ニト一般真ナクベ。ソノ功用亦同セカラベキ「セリ」也。然レヒ保之ノ足キ未試驗。第三根舌折指様ナル得ズ。只其多ク自生スルノ地ヲ接待入心ノヨラ候ソ。第三根舌折指様ナル根形未據明者。此条下ニ林氏ニ種ヲ舉ク。者ヨリシス。第四根線様結束スル者。諸氏ノ圖ニ此族ヲ舉ハラ見サ。尾トンガアリヤ。第五根形未據明者。ナ約當ノ品ヲ未得。

此草生山中及平野間。根莖有毛。葉子狀如竹葉而長。葉全緣。花淡黃色。莖高一尺。葉長八寸。根入藥。味辛。性寒。無大毒。可解熱毒。其根亦可作藥。但不可多食。恐傷人。亦有大毒。故用者慎之。其根亦可作藥。但不可多食。恐傷人。亦有大毒。故用者慎之。其根亦可作藥。但不可多食。恐傷人。亦有大毒。故用者慎之。其根亦可作藥。但不可多食。恐傷人。亦有大毒。故用者慎之。



卷之二
草部
苦參
苦參為苦參之根也。生山中及平野間。根莖有毛。葉子狀如竹葉而長。葉全緣。花淡黃色。莖高一尺。葉長八寸。根入藥。味辛。性寒。無大毒。可解熱毒。其根亦可作藥。但不可多食。恐傷人。亦有大毒。故用者慎之。其根亦可作藥。但不可多食。恐傷人。亦有大毒。故用者慎之。其根亦可作藥。但不可多食。恐傷人。亦有大毒。故用者慎之。其根亦可作藥。但不可多食。恐傷人。亦有大毒。故用者慎之。其根亦可作藥。但不可多食。恐傷人。亦有大毒。故用者慎之。

山間沮洳ノ地ニ生ス。春苗ヲ生シ一根一莖。葉幅三四分長三四寸背ニ稜アリ。色深緑。莖高一人許細ノニ三葉ヲツケ。梢ニ二三花ヲ開ク。萼三片花亦三瓣ニス。二弁上ニアリ形心臟状ニノ上尖リ邊ニ細鋸齒アリ。下唇ノ一瓣ハ即密槽ニメ本細ク末大ニノ三裂。ソノ中者ハ細ノ長ク。左右ナルハ末廣ク扇面ノ如ク邊端剪絶石竹花弁ノ如シ。弁後別ニ一筒アリ此ヲ嘴トス。赤端扁ニノ僅ニ兩尖ヲナス。全体白色而飛鷺ニ似クリ。故ニワノ名ヲ得。子室角様。心葉中ニ位シ雄蕊兩側ニ居コレソノ似類花菖ノ常態ナルヲ以テ以郭大圖示之。根珠塊大ナ指頭ノ如ク白色黃褐ヲ帶フ。珠ニ鬚ナク別ニ數條ノ鬚根アリ。后ニソノ端ニ白珠ヲ生シ次年ニ及テ苗ヲ分ツ

圖符第一 揭示兩蕊郭大圖

甲 心葉前面微々有栗紋
乙丙 兩雄蕊所位之處而有薄膜包其蕊。其莖細而未端有白色一珠。莖及珠者無被膜直可見甲符 第二排出雄蕊見全形。其蕊二裂而面有淡黃粉滿布

第二 排出雄蕊見其全形郭大圖薦二裂片而面滿淡黃點莖纖細末有一箇白珠

按本條ノ花形草狀ヨルシスノ屬ニ外ナラザレ氏。西書中ニ於テ未タ的當ノ種名ヲ不得。又ソノ根形ニヨレバ第二族ニ可収品ノ如クシテ獨ニ齒單九様ニ相並ノ常套ニ背テドモ其結塊タレニ二ナケレバ。今コニニ収ム根ヲ乾末シ試ルニ。形色氣味粘滑殆ト大サギサウノ根ニ同フシテ共ニサレツブニ代用スベキ者ノ如ノ。而テ世人ノ麥門冬ヲ用ルニ優ルト遠シ





薑生葉小而厚承葉亦小葉細長狀如姜子
根生葉大而厚承葉亦大葉圓闊狀如姜子



淺山原野向陽ノ地ニ生ス。一莖七八寸方ニノ二三葉ヲ互生ス。下者形披針狀ニ、狹長。上ニ至テ僅ニ五七分。梢ニ淡綠色ノナ許花ヲツク。細長五弁齊槽ノ一片ト嘴トア以テ成ル。子室角様概スルニトンボサウト同様ニノ微大。根指様ニノ細ク四五顆ヲ以テ横ニ延ク。

國符弟一 去花并齊槽嘴等。見全額郭大圖

弟二 檢雄蕊以弟一鏡視之

甲淡綠如米粒為藥。開之内叔白色多細珠子。莖細纖而末端有蓋狀黃色滿刺毛者。蓋雄蕊在頰側耳搖之凹道中。莖從其小溝道下。耳之下側見黃色者即是。其狀與鷺毛玉鳳花甚大同小異。故亦揭示之宜保考。

按ニ以下所列ノ數種ミナ林氏ラルシス、今ニ訛ク處ノ第三第四ノ族中ニ叔々ベキモノ、如シ



卷之十八

二十種一百

平本草

モツトンボ

アヲサキサウ


好テ山足溝地ニ生ス。細莖高一尺四五寸。狹長葉莖ヲ包テ互生シ。稍ニ至テ漸小。上三十數花アツタル。形トンボサウヨリ大ニタ。帽翼共ニ淵短ニメ尖リ。唇細メ長ク中間兩側ニ岐アツテ殆ト十字ノ形ヲナス。嘴ハ長ケレ氏唇ニ不及。總テ白色淡緑ヲ帶ブ未換根形姑缺



モツトンボサウヨリ大ニタ。帽翼共ニ淵短ニメ尖リ。唇細メ長ク中間兩側ニ岐アツテ殆ト十字ノ形ヲナス。嘴ハ長ケレ氏唇ニ不及。總テ白色淡緑ヲ帶ブ未換根形姑缺

モツトンボサウヨリ大ニタ。帽翼共ニ淵短ニメ尖リ。唇細メ長ク中間兩側ニ岐アツテ殆ト十字ノ形ヲナス。嘴ハ長ケレ氏唇ニ不及。總テ白色淡緑ヲ帶ブ未換根形姑缺

山足陰湿ノ地ニ生ス。高一尺許。脚ニ二葉近ク互生シ。殆ト相對ス。形圓長五六寸幅寸餘。色淡綠帶白ノノ上ニ細葉五六ヲ互生シ。梢上一寸余ノ穗ヲナシ。三四分ノ細小花ヲ綴ル。形チドリサウノ如ク。翼唇共ニ卵圓ニノ尖リ。帽嘴ハ小ニノ白實淡綠ヲ帶ズ。根線條ニノ長ク横ニ延ク。



二葉近ク互生シ。殆ト相對ス。形圓長五六寸幅寸餘。色淡綠帶白ノノ上ニ細葉五六ヲ互生シ。梢上一寸余ノ穗ヲナシ。三四分ノ細小花ヲ綴ル。形チドリサウノ如ク。翼唇共ニ卵圓ニノ尖リ。帽嘴ハ小ニノ白實淡綠ヲ帶ズ。根線條ニノ長ク横ニ延ク。

卷之十八

二十

正木本草

小葉トンボサウ

赤樹陰ニ生ス。莖々細ク高一尺許。脚ニ狭長ノ一葉アツテ莖ヲ包ミ。上ハ至細針状ノ五六葉ヲ互生シ。梢上一二花ノ經ル。形前条種ノ花ノ如クノ微大。嘴尤長ク背後ニ挺出シ。恰モ蜻蜓ノ狀ニ似テ色淡緑白色。



大葉トンボサウ

トシホサウ中ノ一種也大ナリモノニメ。初生ノ際ハ二葉相對ルカ如ク尋常種ニ彷彿タレニ。莖断ク伸テニ天許ニ至リ。上ニ花ヲ開クノ時ニ至ツテハ葉モ莖ニツキテ止リテ立生シ。二大葉止狹長ノ數葉アツテ梢ニ至ツテ食小莖ニ高ク線條アツテ三四稜アルガ如ク。花下ノ小葉花ノ形色等ハ常種ト同フノ差大。但根ハ粗ク小指ヨリ細アメ長ク。地中ニ入ルツレサギノ根ノ如ノ差小。常種ノ根ノ長クノ横ニ延クモノト大ニ異ナリ。



卷之十一

二十一

正木鼎

ムカゴサウ

又カゴサウ

溪間陰地ニ生。莖高一尺餘三四葉ヲ互生ス。形シレサギサウニ似テ小。又大葉ノトントンボサウノ如クノ潤短。夏稍上締リナシラ多花ヲ綴ル。細碎ニメ且闊展セド。六

緑色ノ圓點下ニ白色ノニ小片アヒラミルノモ。強テ捺開スレバ。帽三片翼二片共一綠色。唇一片白花。心中ニ二艶薬アリ。嘴ハ粗短ニメ亦白色。根線様粗短ニノ横ニ延ク附一金花ニ接開見辛形共亦大圓。

按ムカシムカゴサウノ族ニ外ナラズ。トンボサウムカゴサウノ二名。從前サス处方明ナラズ。今此種ノ花形尤小ニメトンボノ形ニ遠キヲ以テ。専ラ此種ニムカゴサウノ名ヲ下ス。





原野ニ多ク。葉狹長山慈姑葉ニ似テ短ク。夏簇葉間一莖ヲ抽ク。一二尺。三五ノ葉
葉アリ。莖梢無梗花ヲ並置ノ穗状クナス。子室角様毛葉一葉。花六瓣ニメ上三年兩
側各一年。共ニ鮮紅色。下唇兜様一年白色ニメ蜜槽クナス。又一種草茎小ニメ全花
白色ナルアリ。花ミナ一侧ニ向ツテ並ヒ。而メ莖右旋ス。故穗状子挿シテ糾束ノ如
シ。因テ子ナバナノ名アリ。兩蕊大略白及ノ類ノ如クナレハ。些異ナキ。未観故ニ
製一倍圓明之根細指様ニノ線根ナシ。附一腹面柱排帽見焉。二背面柱。三
全花共一倍圖。

Liparis ultricincta マクシナシコロイド

蝶氏

Orchis speciosa マクシナシコロイド

物印滿

按草形根狀ヲ略取スル。 マクシナシ *Orchis* ノ第ニ族中ニ外ナラザル如ク。而メ林氏ノソ
ノ種中ニ於テ未タ此種ヲ見得ズ。始ク後日ノ再檢ヲ要ス。

卷之二

平本草

前条一種

葉粉條兒葉ノ如キニ小葉相對スルノ中心ヨリ一莖ヲ抽ク三四寸。半披針狀ノ
二小葉ヲ互生シ。梢上總アナシテ花ツツク。形略モナツリノ花ニ似テ。三、半披針狀
弁上ニアリ。入尖三裂ナル。弁下ニ叢テ蜜槽ヲナス。嘴アリ前ニ曲ル。弁色紅紫鑿
槽弁白色尖紅葦アリ。嘴ハ色淡紅子室角様。此種駒ケ嶽ニ産シ六月開花ス。附一
全花 二心共 三排帽見鷺大郎大圖

按鐸氏前条種下ニ更ニ小ナル一種ヲ舉ノ或ハ此種ヲサスカ



フクバクサ


タカノハ

山中陰地好テ巖石ノ上ニ生シ。珠根附ト地上ニ淳ニ下ニ懸頸根アツテ地中ニ引キ。珠側ニ芽ヲ出シ新苗ヲ生ス。下ニ二三ノ葉アツテ色之。葉上槽圓ノ二葉相抱テ對開ス。故ニフタバクサノ名アリ。按蘭ノ「テウエーブラ」ニモ亦曰意葉面縱道著ニユニ又タカノハノ名ヲ得。邊緣心凹波紋ノ狀ヲナシ中心線稜アル一莖ヲ抽ク。高キ者一人許有梗花ヲ以テ疎穗ヲナス。花多キハ十數ニ至ル。ソノ花タル五瓣形恰モ飛鳥ノ如ク。大ナレハ寧槽弁ニメ体トス。ソノ下ノ二細弁ハ翼。下側ニ垂ル、纖細二弁ハ脚。後ニ反スル一細弁ヲ尾トシ。心葉ヲ首トス。心葉ハ蘭葉祥ニノ帽長ク前ニ挺出シ帽下ニ二ノ卯圓黃蕊アリ。ソノ類ニスベムシサウ。クモナリサウ。チガバナサウノ三種アルヲ丸ノ如シ

甲
スベムシサウハ草就中大ニメ莖高一尺許。花亦大ニノ色淡暗紫ト青トノニアリ仍テアラグモノクロゲモノ称アリ。槽弁ニ道ク相並ビテ。尖僅ニ密槽弁端ニ出。此種ノ殊又一種莖微ヤ高クメ花却テ小ナルアリ。形色一般。人或ハ此種ツクモナラズ其株根タモチリサウト同シカラズ西モナリサウハスベムシサウヨリ稍小ニメ高五七寸。花亦小。密槽弁潤短ニメ微クコクランノ花態ニ似テ。兩翼密槽弁端ノ下ニアツテ。樽ニ丸右ニ挺出ス。コレ此種ノ殊

標此種ニハ花色淡暗紫ト青トノニアリ仍テアラグモノクロゲモノ称アリ。手ガバキサウハ左小ニメ高四五寸ニ過ズメ花小ナラズ密槽弁差狹ノ長ク兩翼左長クメ密槽弁ニサク間リテ並ニ長ク密槽弁尖ニ挺出ス。種ノ時標亦色ニ青黒ノ二種アリ。

接以上ノ三種。ナ根塊ニ地上ニ並出シテ。ソノ傍側ヨリ萌芽ニ新苗ヲ生スルヲ常トス。ノノ塊根ハ舊茎ノ殘ツテナル處ナリ。林氏ノ「*Tulipa*」クサヒトケ蘭ノ第七種以下。此塊根アルモノニメ。即鐸氏ノ「*Tulipa*」クサヒトケ接^ナ*rechte* ^{クサヒトケ} *spatula*。ナルモノト同シトスルタ見レハ。本条ノ類ミナソノ種タル「不容疑。葉狀根形吻合ナレ压。但花形ニアツテ異異アツテ。研華ノ數種本邦所產ノ品ノ花形ト全ノ同キモノヲ不得レバ。ノ第幾種也ト云」ラ不得レビソノ *Nodulus*。ト断スルニ害ナシ



卷之十八

二十九

平木年譜

チンバイサウ

ミヅモラン

深山陰地ニ生。葉形クモナリサウノ類ノ如クナレ。二葉殆ト相對メ平扁展開シ且葉面ニ光澤アルアツナ差ヤソノ態ヲ異ニス。葉心茎ヲ抽ク口入許稜條アツテ鱗片ノ小葉四五ヲ互生シ。夏梢上穗ヨナシテ花り開ク。形ヤトシボノ花ノ形ニ略似テ差大ニノ色淡綠。根ハ線様ニシテ地中ニ引キテ前条種ト同じカラス

扶蝶氏ノ *Gentian* *stellata*

ゲントウ
ナツユイチラ

又 *Gentian* *panell* — *canella*

スランデル

ココイド

園ニ吻合シ又林氏ノ *Gentian* *stellata*

オブリス

ナツユイチラ

ノ第四第五種ノ内ノ如クナレニ

未タ其決ヲ得ズ




サハラン アサヒラン ラクラン

朱蘭

山澗溫洳ノ處ニ生ス。一根一葉形較長披針狀ニノ葉本莖ヲ擁シ。中心一莖高七八
す。梢頭點頭一花ヲ開ク。形未開ノ白及花ノ如ク。色紅繁子室下ニ細小ノニ鱗葉ア
リ。根ハ珠様ニノ白色。

按ニ亦 アサヒラン 珠根ノ族中ニ可収モノ、如シ
己下ノ三種草狀大ニ相似タレ氏花形根狀各珠標アルモノ、如クナレ氏モタ
ソノ精檢ヲ缺ク姑クゴ、ニ列シテ後日ノ決ヲ俟ツ



サハラント同處ニ生シ。形畧同様ナレバ。葉稍潤短ニノ中心一莖高六七寸。一花天
ニ向テ開キ。色サハランヨリ淡フノ微ク開展シ。子室ノ下一小葉アツテ護之



ヤマトキサウ

山野乾原ニ多ク。形略トキサウノ如クニメ葉尤潤短。花稍小ニメ開展セズ。白色二
ノ紅色ヲ帶バ。根ハ指様ニメ小ナル二三塊ヲ横ニ地中ニ延キ。前条種ノ珠様ナル
ト同ジカラズ



卷之十

二十圖一百

本草辨

此三種ハ同属ニメ。ミナ葉卯圓披針狀ニメ莖ヲ擁ノ互生シ。瓣膜著クシテ剛ク莖

高一尺餘。春夏ノ際梢上十數花穗アナシテ開ク。子室角様。眞体柱様。根ハ粗キ線様ニメ指様ナラザルヲ概標トス。ソノ各種ノ殊標ニ在テハ。スダランハ好テ山間湿润

地ノ處ニ生シ。葉本潤フノモ毛狹尖。莖脚ニ紅暈アリ。花點頭シテ頗ル開展シテ。瓣
尖リ色深黃。唇白質ニメ紅点鮮明ナリ。キサンランハ葉差長ク絶黃色上ニ向テ開

キ。瓣頭尖ラズ盤口ニメ展開ニ至ラズ。按ニ其形鈴ニ似タルハワノ生ズル。山中ニアツテ湿润ノ處ヲ好ヘズ。白サンランハ溪間樹陰ニ生シ。形スダラ。ト同メ草

差齊小ニメ花白色

セラビアス
Lapiedia pellata 春氏

按林氏

セラビアス
Lapiedia pellata 蘭ノ屬ニ七種ヲ挙グ。就中ソノ第一種

ブローディ

セラビアス
Broderia ラバテ輝氏ノ *edulis* *alit* *mysticella* ト催セ。又物印滿ノ

エリオド

セラビアス
Eliodora *ting* *maculata* ト名下ニ所舉ノ六種等ノ圖說ヲ併セ考ルニ。ソノ品キサン

ラシス

セラビアス
Rhynchostylis 白サンラン 輝氏ノ圖ハ全ク白

サ

セラビアス
Sarcochilus *glossy* *rhizoma* *lanceolatus*

等ニ外ナラズ。フノ種ヲ分ツヤ。葉


卷之十八

タウラン

平本井葉

花五瓣印圓ニテ不尖管口開展セズ。蜜槽瓣亦短フノ倣ニ紅條アリ。下ニ短管ヲ出
ス。柱形龍様頭西淡黃ニメ白色ノ長糸アリ。附 蜜槽瓣本然國美柱邦大爾。

キサンラン



卷之十一


五本草

ハクサンラン

ギンラン

樹下陰地ニ生シ。全形キサンランノ如クナレ。莖葉共ニ短小。葉差潤短ニ。高大ニ及バ。莖頭花クツク。亦キサンランノ如ク上ニ向て。五年尖銳齊横弁潤短ニ。短嘴アリ。色純白ニ。心ニ微ニ淡黃点ア見ル。附一葉伸正面二同側面共部

大圖




向阳巖石ノ間ニ生ス。莖高五六寸。三四葉莖ヲ挿シテ互生シ。形狹長。梢ニ十許花ヲツク。形略イハランノ如クノ微大。嘴長ノ黃柱様ニテ淡緑ノ薬アルニ雄蕊並ヒツキ。薄膜ヲ以テ被フ。

按ニ已下ノ三種共ニ同属ニシテ異種ナレ。氏西書中未ダ此族ノ名ヲ載ルヲ詳ニ
セズ



前条種ノ如ク岩石ノ間ニ生ス。莖高三四寸。一莖一葉形卵圓披針狀。稍ニ六七花ヲ
互生シ。每花一小葉アツテ護之。花色淡紫。小弁上ニ被ニ。蜜槽一弁大ニメ四裂。嘴
アリ甚々短。



卷之十

二年編一目

平木集

上条一種

ヒナキドリ花戸

北勢山中ニ生ス。一莖一葉高ニ三寸。イハラシヨリ葉微大ナレ。花茎不高。花亦多方
ラズ。蜜槽弁梨細タ夫リ。嘴微ク長シ。



卷之十

二十無一百

又一種 ヒナラン 花戸 クモラン 同

亦北勢山中ニアリ。花形前条ト略同シケレ。凡小ニシテ展開セズ



ヒナラン



ミヤマウツラ カモメラン

山中樹陰ニ生ス。莖地ニ布テ三四寸。葉卵圓ニメ互生。質厚ク色緑白ニシテ白斑故ア
リテ鷦又ハ鷦ノ斑ニ似タリ。梢上莖ヲ抽キ花ヲ開ケ下條シユスラレノ下ニ説
カ如シ。此類葉状花形種マアレ凡ニ二三種ヲ出スノミ。

所屬未詳



大田

管子草科。管子草属。日本原产。


花淡紅色。葉卵圓形。莖直立。葉互生。花頂生。



管子草科。管子草属。日本原产。

花淡紅色。葉卵圓形。莖直立。葉互生。花頂生。

ミヤマウツラノ一種。葉色暗緑ニメ隠々光テ葉ツガ如キモノ。花戸之ヲシユスラ
ント云フ。草形ミヤマウツラニ異ナラズ。花亦同シク。五弁ニメソノ上ナルニ弁相
接メ一弁ノ如ク。一小弁アツテ背上ヲ被ヒ。左右ニ弁アツテ保テ五弁以テ向側苞
ヲナス。別ニ形古様ニノ厚キ一弁アツテ心葉ニ對ス。心葉蘭様子室角子各花一小
葉アツテ護之。全花白色淡紅褐暈アリ。附一帽二瓣帽見雄蕊。三腹面共部
大圖



前

茶一種

草狀葉質シユスランノ同類ナレ。花形異ニメ三四花簇生シ。シユスランノ長ク
穗状ヲナスト同カラズ。又花大ニメ長寸餘。葉一翼二蜜槽一合メ四弁。色大抵淡黃
褐。旗弁ノ邊緣審槽弁等白色。兩翼ノ状亦頗ル同ジカラズ。翼体柱状ヲナサズ薄
細長ニメ亦ニ裂シ。二翼体上ニ並ニ線尾ヲナシテ心葉ノ又股ニ及ブ。帽亦薄ノ長
ク覆テ蕊ノ線尾ノ上ニ引ク。心葉腹面陷洞ノ状亦不同。以略圖示之。子室并尖葉苞
葉ノ形ニ在ツテハタゞ大小ノ異アルノミ。此種葉面ノ斑点ニ種々アリ今略之
附 甲帽 乙雄蕊屬 丙々心葉線 丁腹面陷洞側面共一陪圖



南勢老木上ニ生ス。葉状花形前条種ト同ジカラザレ氏。熟視スレバ其趣ヲ同フシ。

生殖部亦同ケバソノ一種タルニ論ナシ 附一倍圖花

前条一種



東北國ノ深山ニ生ス。莖高一尺余。卵圓ニテ尖銳ナル四五葉莖ヲ色テ互生スル。略萎縮ニ於ルカ如シ。點頭ノ一花ヲ開ケ。無葉。四弁形卵圓ニテ尖リ。ソノニ者ハ差狹ク共ニ白質紅縫アリ。弁下ニ一蜜槽ヲ垂ル。ソノ形クマガエサウノ如クナレド。圓ノ上邊ニ一ロヲ開キ。蕊ソノ内ニ掛ル。ソノ色赤クマガエサウニ同シ。兩蕊ノ狀亦同シ可保見。根鬚様ニゾクニガエサウノ横生ト同ジカラズ。

第一種

シナリバチニム
Spathipedium cataphractum 罗
フユーゼリウム フロウエ スクーン



山陰樹下ニ生ス。莖高一尺餘ニメ。微纖毛アリ。根上ニ簇アツテ色之。莖頭ニ葉近ク

相對シテ傘状ヲナス。形圓扁ニメ。継理著明。邊縁不齊波紋ヲナシ。中心一莖ヲ抽ク
「二三寸」。一小鱗葉アソテ點頭一花ヲ開ク。無葉ニメ。四弁蓋ヲナス。形卵圓披針狀
ニメ。尖銳。淡黃緑色ニメ。本ニ暗紫細毫アリ。弁下ニ一大蜜槽アリ。形橢圓ニメ。差ヤ

扁側ニ向テロヲ開キ。弁縁内ニ巻テ殆ト貝子ノ形ノ如ク。白色ニメ。裏ニ紫色ノ毫
條アリ。ソノ色外ニ透見ノ黒斑アル如シ。子室柱狀略蘭葉様ニメ。柱頭サク開テ漏
斗ノ如ク。雄蕊ソノ兩側ニツキ。药鍼レバ扁圓尖ニメ。各内側ニ向フ處ニ黃蕊粉ヲ
擁ス。薬ノ上邊耳アリ。下邊ニ風領腺アリ。上面一帽アツテ兩葉ヲ被フ根ハ横ニ長
ク延テ处々ニ苗ヲ分生ス。甲帽乙柱頭丙蕊表面丁蕊内面戊耳己風

領庚子室

按ニ此品 *Sympetrum* ノ第二種ノ類ナルベケレ氏的當ナラズ故ニ春氏新

種名リ下スニ至ル

Sympetrum capricorne 春氏



東北深山寒境ニ産ス。一莖塊ニ二寸許頂ニ心臟状ニメ尖リタル無柄ノニ葉ヲ相

對シ。中心一寸餘ノ細梗ヲ出シ一花ヲツク。長スルニ從テ漸ノ下ニ向て曲テ葉下

ニ載レ。槽ニ向テ苞ヲ開ク。披針状ノ四弁ス以テ上下左右ヨリ一帽ヲ據ス。帽囊狀

ニノ下ニ向テ一ロヲ開キ内ニ兩葉ヲ収ム。雄者、上ニノ長ク雌者下ニ在ツテ短ク。木

一休トナツテ角状ノ子室ニ接ス。角中至細ノ多子ヲ収ム。ソノ状略蘭類ト同ソ又

一態ラナス。此品尤異様ニノ大ニ他トソノ趣ヲ異ニス。ソノ帽狀アツモリサウニ

アル處ノ帽狀ニ稍似タルヲ以テコアツモリノ名アリ。所圖ハ御嶽山上ノ產他處

ニ産スルモノハ帽微ク紅色ヲ帶フ。附著杜郎大園

按亦シアツモリノ第二種ノ一品ニ可収モノカ

シアツモリ

草木圖譜前編卷十八



草木圖說前篇卷十八



