

草木圖說前篇 草部

廿一編

二十

新植	
除	除
二	一八
0	
學	馬 滋
校	中 醫

植三

470.3
S37
Vol 20

彦立校

本草
中藥部
印章

圖說前篇卷二十目錄

第二十一綱

一 株有雄花有雌花

第四目 四雄英

イラクサ

マオ

ヤブマオ

アカソ

クハクサ

エノキグサ

オキホコリ

クチナハジヤウゴ

ムカゴイラクサ

クサマオ

同雄者

ラセイタサウ

ツルマオ

ミヅ

ミヤセミヅ

同二種

サシシヤウヅル

セシニンコク

ヒユ

フウキサウ

第五目 五雄共

オナモミ

第八目 多雄共

秋海棠

ゴワ井

ミクリ

第九目 雄共上方下合為一體

タウゴマ

ハゲイトウ

フヂゲイトウ

イヌビエ

ムマノミツバ

クワ井

アギナシ

ウリカハ



第十目 雄共為輪

カラスウリ

ニガウリ

キウリ

マクハウリ

タマゴウリ

ボウブラ

ヒヤウタン

スゞメウリ

第二十二目 有雄本有雌本

第四目 四雄共

ハウレンサウ

キガラスウリ

ヘチマ

シロウリ

ヒメウリ

スイクハ

カモウリ

ゴキヅル

第五目 五雄莖

アサ

カラハナサウ

第六目 六雄莖

ナガトコロ

菊葉トコロ

ヤマノイモ

カシウイモ

第十一目 多雄莖

ヤマアサ

第二十三目 有雄花雌花雌雄兩全花

第一目 一株

カナムグラ

マルドコロ

同一种


ナガイモ

アマチヤヅル

シユロウサウ

コバイケイサウ

バイケイサウ



草木圖說前篇卷二十

大垣 愨齋 飯沼長順著



草部

第二十一綱

一株有雌雄花

モソイキア
Monsokida

ムカゴイラクサ ギョクシニクサク 江戸 名古屋 葛麻一種
 圓莖高二尺。皮粉フノ莖ノ如ク。葉狭長五六寸ニメ組鋸齒アリテ。略スナイチコ
 ノ葉ニ似テ。面ニ細刺毛アル下葉麻ノ如クナレバ。彼ノ如ク剛カラズ。故ニ刺軟甚
 シカラズ夏葉腋ニ零余子ノ如キ細珠一或ハ二三ヲ生ス。割之ハ粘滑液アル下亦
 ムカゴノ如シ。花雌雄異侍ニメ多クハ一幹中ニ雜リ。或ハ幹ヲ異ニスル下アリ。雌者
 ハ梢頭ニ細莖ヲ出シ。每梗三花ツ、並ヒツク。子室扁圓ノ莢様ニメ頭曲ツラ毛ノ
 如キ一柱ヲ出シ。圓扇ノ如キ二片ノ萼アツテ兩側ヨリ挾之。雄者ハ稍葉腋毎ニ細
 莖ヲ出シ。多ク枝分シ細花ヲ点綴ス。花被卵圓五片綠色ニメ五雄莖アリ。藥白色。花
 大廿一分ニ足ラズ。ソノ狀前条種ト同シ後實ヲナス亦大同小異今附部大圖詳之
 一種細葉ナルアリ。高一尺許葉長二寸ニ及バス 附 一雄花 二雌花共部大圖
 挾前種ト同屬ニメ種名未詳



クサマオ

苧麻一種

山野ニ多ク。草狀苧麻ニ彷彿タレ氏。莖枝ヲ分ツテ多ク。且莖柄氏ニ毛茸少ク殆ト
 無カ如ク。葉互生。形苧麻ノ如クナレ氏。本ノ処ノ圓ミ多ク。苧葉ノ殺キタルガ如ク
 ナラス。梢葉ニ在テハ二種共ニ同形ナルアレ。又質微ク薄ノ糙澁少ク背ノ白色亦
 淡ク。花形同様ナレ氏。花莖枝並多ク花体差小ナルノ別アリ。實熟ノ苧實ト同形ニ
 メ差小ニメ毛亦少シ。此種苧ノ一種ナレ氏。皮ノ強韌苧ニ及ハズ。故製布ノ用ニ供
 セズ

按ニ前条ノ属ニメ種名未詳



ヤブマオウ 葎麻一種

原野ニ多ク莖直條多ク枝ヲ分タズ。高三四尺。葉對生形圓尖鋸齒粗大。先ニ至テモ大ニ尖頭殆ト缺刻スルガ如シ。莖葉毛ナク葉質厚強韌滑。而深緑背淡緑也。根頗ル長クノ紫色ヲ帶フ。夏毎葉腋一花莖ヲ出。長四五寸枝ナク直立ノ穗ヲナシテ花ヲ綴ル。雌雄異幹ニシテ。雌者ノ圓尖ノ實礎トシ有毛ノ一粒ヲ載クモノ二十許。聚族ノ一球ヲナス雄者モ略同様ナル如クナレド。至小ニシテ短毛ヲ見テ分明ナラズ。附一寸部大圖 按ニ此種葎麻ノ一稜ナレド雌雄異幹ノ別アリ

papavaceae *scutellaria*

按ニ林氏 *scutellaria* *imptulata* ノ下ニ此圖説ヲ出ス的當也其ナシ



形状前条種ニ同クシテ花形差異ナリ。此ニ前条ニ詳ニス



山野ニ生ル小灌木ニシテ。高三四尺多ク枝ヲ分チ皮色帯紅ニシテ葉アリルヲ以テ
 薺氏採テ苧麻ノ用ニ代ヒテアリ。故ニアカフノ名アリ。葉有柄對生大缺刻アツテ
 三尖リナス。ソノ中位尤狭細邊縁然テ不齊ノ粗鋸齒アツテ細脈著シ。夏梢葉腋各
 ニ三寸ノ細梗ヲ出シ穂ヲナシテ花ヲソク。雌雄異株ニシテ。雌者ハ。柄葉腋。雄者ハソ
 ノ下。雌者ハ。細柱擯。一珠ヲナシ。每粒翅毛様アリ。柱ヲ且シ。雄者亦擯。葉
 四重糸盤形ノ四片黃葯ノ四葉アリ。又五弁五葉ノモノ任々文レリ。實熟ノ扁ニシ
 圓尖。ヤブマ石ノ實ヨリ微大ナリ。附一雌花。二雄花共郭ナシ。

二十十カ スミカク
artisia pectata 春氏 西勃氏

按 *artisia* 種 *beaulandii* 種 *acalypha* 種 *subtilis* 種
 未タ確認セザレド本各並次条ノ花梗直條否合ノ形。又莖葉刺毛十キ一葉。
 ヤブマカト同シクレバ共ニ *subtilis* ノ族ニ收ルヲ優ルトセン事宜考



春氏採
 アカフ

ラセイタサウ

春宿根苗ヲ生シ高二三尺茎硬ク灌木ノ如ク皮ニ毛アリ頗ル強シ葉對生
スルヲ形楕圓ニ尖リ又ニ尖或ハ三尖ナルアリ邊縁細齒アリ葉脈網狀細密面ニア
ツテハ凹窪溝道ヲナシ背ニ浮テ網狀ヲ現ス茎葉共ニ糙澀柄本上ニニ針狀褐色ノ
腺様苞アツテ相對ス夏無岐長穗花ヲ開クイヤブマオト同シ然レモヤブマオハ
雌雄異幹此種ニ在ツテハ同幹ヲ梢ニ雌脚ニ雄穂ヲ出スノ異アリソノ雌球ハ
三四ノ軟莖中ニ許多ノ实礎ノ聚ルニ成ル实礎ノ形是粒ノ如クノ小一柱白
色少ク勾リテ纖毛アリ 附一雌球ニ实礎并柱郭大圖

按テノ一種 *nettlekind* ノ族ニ收ムベキカ



雄

雌


ニ



ツルマオ シキンドウ フツマダサ共尾州

駿州原野路傍ニ多クアリ。茎地ニ塌シテ長ク蔓延蔓植ス。葉對生。形披針狀長一寸餘幅五六分。短柄ニノ三縱道著ク。背葉ニ茎微ク糙波等ナリテ紅紫色ヲ帶ブ。七八月葉柄相對スルノ上每細小花ヲ多ク纂簇ス。ソノ花雌雄異体。雄者ハ一分餘ノ梗アツテ上五出シ。各一片苞アツテ一雄莖ヲ色ム。苞綻テ莖出。頂ニ白色ノ蕊アツテ黄粉ヲ吐ク。雌者ハ雄花ノ下ニアツテ小ニテ殆ト見エ難シ。推子狀ニノ五縱道アル。苞ヲ以テ推子狀ノ實礎ヲ色ミ。翅楯ノ一柱ヲ吐ク。後熟ノ黑色光沢アリ。附一雄花 二雌花共郭大圖

所屬未詳



丑ノキクサ

アミカサ、ウ

田間廢園ニ多ク生ス。高一尺許。莖細ノ皮ニ等質アリ。葉心截状ニメ尖リテ鋸齒アリ。叶畔^{チヤ}叶ニ似タリ。故ニソノ名ヲ得。柄頗ル長クメ互生。根際ニアツテハ^{チヤ}々々對生ス。莖葉微糙淡。夏每葉腋一細莖ヲ出シ。頂ニ圓尖ニメ微鋸齒アル一小葉アリ。ソノ中心ニ雌雄兩花ヲ擁ヒテ。殆ト苞ノ用ヲナス。ソノ葉半合メ展開セズ。形アミカサノ態アリ。雌花ハ弁ナク圓尖三起アル萼様ニメ頭ニ柱アリ。本ニ三ニメ未分裂刺毛ノ如ク。体上瘡癩并ニ細刺毛アリ。萼側ニ一梗ヲ出シ。上ニ十許ノ雌花ヲ簇生ス。圓形四弁淡黄白色。弁尖紅暈アリ。中心白色ノ萼十許ヲ具ス。其數不符分明諦視今以五倍圓雌雄兩花ヲ併セ示ス。更ニ以七八倍圓一雄花ヲ示ス。其向阳肥地ニ生スルモノハ。莖葉大ニメ高二尺許ニ及ヒ多ク枝ヲ出シ。一莖一花或ハ二花ヲ連ス

所属未詳



蕨沢陰濕ノ地ニ生ス。莖此方ニノ節アリ高一尺許。葉滑多液色淡緑白ニノ紅暈アリテ皮ニ帯アリ。葉形草麻葉ニ似。小ニノ柄アリ。每節對生シ枝ヲ分テ。秋ニ至テ葉葉腋ニ短梗アル多細花ヲ簇生ス。ツノ花雌雄異体ニノ雄者ハツノ片側ニアリア。白質淡黄緑暈アル指圓ノ苞ニ或ハ三或中ニ三五ノ白莖ヲ見。雌者ハ。綠色ノ柄長トル子室ノ頭ニ三五ノ白毛アル如シ。ツノ盛花ノ取ハ共ニ至細ニノ諦視シ難レ氏。雄花已ニ衰ヘ子室微々長ルニ至レバ。莢狀ノ二苞アリテ。麦粒狀ニノ尖ニ褐毛ヲ戴ク子室ヲ擁スルヲ見ル附 一雄花 二子室即雌花 三半熟實

按已下六種。莖葉共ニ柔滑肥厚多液ニノ。莖ニ苧様ノ皮アリテ。花ミナ葉腋ニ擯簇シ。雌雄異体ナルト一般ナルヲ以テ。之ヲミツノ一族トス。ツノ花タル。細碎ニノ肉眼晰然ナリカタキ品ノレ氏。率子苧麻ノ常套ニ外ナラズ。西書中未タ此族ヲ載ルヲ見ザルヲ以テ。コ、ニ列々シテ後ノ考ヲ期ス



路傍陰湿ノ地ニ生ス。ミツノ一種ナレド。葉ノツキ方クチナハ上戸ノ如ク。葉茎ノ
 一片ニ面ノ互生排列シ。又枝ヲ出ス。茎葉ノ質ミツト同フノ紅暈ナク。皮ニ軟ナル
 苧アリ。秋葉腋ニ多花球ノ如ク簇々容布ス。ソノ花雌雄異ニシ。雄者、唇様ノ花被内
 ニ白色ノ莢ヲ見ル。ソノ莢幾箇ヲ以テ常套トスベキヤ未ダ諦視スルコトヲ得ズ。雌
 者ハ淡緑ノ圓柱体ニシテ。頭ニ二ノ白毛アリ。己ニシテ柱腹裂ケテ兩圓尖頭ノ子室ヲ
 露出ス初メ綠色ナレド次第ニ紅變ス。ソノ花形ミツト略同シケレド。彼ノ二莢内ニ
 一子室ヲ抱クノ如クナラズ。又彼ノ雄花外側ニ位スルガ如クナラズ。二花間離供
 列スルホノ異アリ 附 一雄花 二雌花 三老裂子室露出共郭大圖



一 二
 三

ミヤブミツ


山原陰地ニ生ス。莖葉ノ形實惣テミヅノ如クノ微大。高ヤ一尺餘。葉尖鋭ニシテ面ニ少ク軟刺モアリ。秋葉腋細莖ヲ出シ。横ニ延テ又方シ細花ヲ点綴シ。ミヅノ花ノ摺葉スルト同ジカラズ。花体至細且白質淡黄緑華アルヲ以テ。ソノ形色ヲ訂視詳明ヲ得ガタシ。蓋シ亦雌雄異花ニノ。雄者ハ。四弁四萼白萼ナルガ如クナレ。雌者ハ。以テ二鏡大莖ヲ。雌。唯者、實礎柱状ヲ訂視スルコトヲ不得。戊午ノ秋再檢シテ雌花ヲ見ル。処ハ即圖ノ如シ。又庚申ノ秋檢ノ雄花ヲ見ルニ。苞ニニノ萼亦ニナルコト晰然タリ。孰レヲ正トセン姑併記レテ俟後日之斷




卵葉
見筋
脈

山中溪側陰地ニ生ス。莖斜ニシテ直主セズ。葉加條葉ニ似テ互生排列シ色黃綠。四月花アリ雌雄異幹。雄者ハ葉腋寸許ノ一梗ヲ出シ。頂ニ多花簇生球ヲナス。花被五裂。裂每裂背ニ一小鈎刺アリ色淡黃綠。雄葉五ニノ白筋。中心ニ疣瘰軸柱アリ。雌者ハ無梗ノ一簇ヲツク。惣苞扁圓十餘ニ大裂シ。内ニ衆多ノ指圓實現ヲ充テ。各頭茹ノ如キ白粉ヲ戴ク。此種間ニ雄花莖ノ柄葉間ニ雌花ヲツクルモノアリハ。異幹ヲ必トスベキニアラズ

附 一雄花面 二雄花背 三雌花一簇四一子共部大圖



莖葉前条種ト同フシテ。秋ニ至テ莖腋毎ニ零余子ノ如キ珠根ヲ生ルノ一種アリ。
ソノ花實ノ詳状ハ未タ檢シ得ザレド。記シテ後檢ノ基トス。附珠根部大圖



形状衆ノ所通ニ故ニ畧之。ソノ葉色ニヨリテ「馬車紅」「馬車草」ト様綿ノ別アルヲ啓
蒙辨之。ソノ種ニ十毎葉腋ニ細碎花ヲ簇生ス。雌雄異花ニシテ各卵圓披針狀ノ三花
被ヲ以テ莢ヲ包ム。雌者ハ子室卵圓ニシテ頭ニ裂内ニ一扁子ヲ収ム。雄者ハ黃藥ノ
三雄莢ヲ以テ假柱ヲ擁ス。又稀ニ二莢ヲ全ク具スルモノヲ交ユ。部テ雌花多ク雄
花少クメ十中ノ一ニ不及 附 一雄花 二雌花共郭大圖

第四種

アムステルダム

Amaranthus tricolor

ナリコーロ

種

Quilleyia

ナリコーロ

amaranthus

種

按林氏 *Amaranthus*

ノ下ニ三雄莢ト五雄莢ノ二種類ヲ併ス。故ニ今亦從

其例共收五目下



セシニコク 老翁殿

海外種ヲ傳ヘ、春子生シ莖高三四尺。葉卵圓披針狀ニシテ互生。葉柄穂ヲナシ下垂ス
 ル一二三尺。莖ノ如ク細碎花穂ト点綴ス。花雌雄異ニシ。中間ハ多クハ雄花ニシテ雄者ハ
 卵圓披針狀ヲ五年々下ニ又一葉アリ。トモ共ニ紅色ニシテ雄花ヨリ小也。五雄
 葉薄淡黄色。雌者ハ弁差小ニシテ子室種子狀。頭三尖色亦紅。子ハ扁圓ニシテ色淡黄白
 白以テ穀ニ於テ食フベク。葉ハ蔬菜ノ用ニ供スベシ。一種葉形同フモ花色黄白ナ
 此アリ。花形同シケレモ子室ノ頭短毛筆狀ヲナスノ異アリ。附 一雄花 二雌
 花 三黄白色者雌花共郭大圖


第二十二種

Amoranthus

Carolinus

pyramidalis

amoeranthus



傳言フ亦舶來種ナリ。前条ノ一種ニノ葉卵圓ニノ尖リ。葉面暗紫ノ斑暈アリ。背
 ニブツテハ淡紫暈ヲ見セ。二種アリ。甲者莖淡黃綠色一ノ紅紫ノ線條アリ。穂多ク
 枝ヲ生シ枝亦垂ヲ分チ。傾歪ナレト下垂ニ至ラズ。且花ノツキヤウ一族ノ間少ク
 疎ナリ。雌雄花共ニ形セシニコクノ花ノ如クナレト。葉狭ノ尖リ。暗紫色ニノ緑
 色ヲ帯ビ。センニンコクノ紅鮮ナルト不同。又雌花ノ形亦異ナリ。乙者莖紅色ヲ紫
 ビ穂ノ枝少ク。ソノ状畧センニンコクニ似レト。彼ノ如ク下垂ニ至ラズ。且花色甲
 者ヨリ深ケレト。暗紅ニノセンニンコクノ鮮紅ナルガ如クナラズ。二種共ニ子黒
 色ニノセンニンコクノ子ヨリ微大。附雌雄二花部大圖
 按甲乙二種甚ク相似レト些異アリテ林氏所舉ノ二種ノ別甲乙二種ニ的當ナ
 ル如シ

甲者 第二十一種

Amaranthus Cruentus 葉

Bladiju amaranth 葉

乙者 第二十種


Amaranthus hypochondriacus 葉

Paryschi amaranth 葉



俗間ヒヤウト呼ビ載テ食用トス。苗雞冠ニ似テ高三四尺。葉五生。形圖ニノ頭ニ微
 四アリ。葉腋芽梢上穂ヲナシ細花ヲ綴成ス。花三弁ニノ水ニ一弁アツテ昔々様ヲチ
 シ。雌雄異体ナルノヲ等。惣テ葉ゲイトウト同シ。此品數種アリ。ソノ莖葉青色ナル
 ハ白苧。又紅色ナルハ紅苧。紫色ナルハ紫苧。紋色雜駁ナルハ五色苧等ノ異アレシ。
 花形ニアツテハミナ相同シ。今紅苧ニヨツテ一圖ヲ載ス。附兩花部大圖

按林氏 *Swartz's Herbarium* ノ第六以下。可奉ノ數種苧類ヲ言フモノナレシ。各々凡
 常ノ種名ニ於テハ。余未定得姑期後日之考



イヌビユ


野苧

路傍田間ニ多ク生シ高サ一尺許。莖葉白苧ニ似テ小。夏秋ノ間枝頂毎ニ穂ヲナス
 一二三寸ニテ細小花ヲ開ク。形白苧ト同ノ亦小。附兩花郭大圓



深山陰地ニ生ス。莖高一尺許。葉卵圓披針狀ニシテ粗鋸齒アリ。面深綠色背淡。柄頗ル長ク。數葉一処ニ攢簇散布シ。一莖中大低二三層ヲナス。葉質厚ク莖類木様ニシテ剛カラス。略シヤマシキミノ質ノ如ク。四時不凋。冬ニ至テ梢上短穗狀ニ花ヲ開ク。最下ノ二三花ハ。雌性ニシテ子室扁圓。頭ニ裂片ヲナシテ厚クシテ反卷シテ白色。正中縦ニ一道アリ別ニ弁ナシ。萼鱗狀相重リ内ニ子室ヲ包藏ス。ソノ他ハミナ雄性花ニシテ亦花弁ナク。只柱狀ノ四葉白葯アルノミ。附雌雄二花郭大圖

其族未考



本草綱目卷之二十一
 二十四
 平林全載

オナモミ

蒼耳

春實生シ。茎高三五尺。葉ハ茄葉ニ似テ尖リ。大缺刻及ヒ尖鋸齒アリ。有柄ニノ互生。茎葉共ニ短毛アリ。長月莖頭疎穂ヲナシテ花アリ。雌雄異花ニノ。雌者ハ本。雄者ハ末ニアリ。雌者ハ子室桃葉珊瑚ノ實ノ如クノ小。本末共ニ細ク全体刺毛アリ。頸ハ二尖起ニノ每尖暗紫色ノ糸様莖ニ條アリ。熟スルニ至レハ。長四五分硬刺アツテ衣服ニ粘着ス。雄者ハ至細花聚簇ノ球ヲナス。一花ヲ諦視スレバ。筒様五尖内ニ一柱アリ。柱頭五ノ細長葯ヲ聚ム。暗紫線條アツテ淡黄白粉ヲ吐ク。又五葯ノ中心ニ短軸アリ。阿須氏云。葉味苦峻ニノ實ト共ニ茶汁収瀉排泄ノ能アリ。新搾汁及越後斯刺ハ。血ヲ清潔ニシ腫腫及疼痛ヲ治ス。又子未半ヲ以テ治熱ノ松葉トナスアリ

第一種

キナシキニユ

ニトルニリユ

Thymonanthus

エウロセ

virgipichu

キリナース

klifis

蘭



山中陰地ニ生ス。形ミツバセリノ如ニノ香同シカラズ。葉鋸齒深ク尖鋭不齊。莖硬ノ紋脈網ノ如クニ分明ナリ。莖葉ヲ抽ク一ニ尺。梢上枝ヲ分テ每頭十數ノ細花。發生シテ繖狀ヲナス。一繖中頂ト兩側トハ全花ニメ。ツノ他ハ七八ノ雄花ヲ支ユ。兩花共ニ萼尖鋭披針狀ノ五葉。ツノ下ニ針狀ニメ頭勾リタル毛様ノ多細葉アリ。花ハ五弁白色。頭鋭鏡ニメ内ニ曲ル。全花ニアツテハ。二柱長ク上ニ挺出シ。五雄莖弱淡黃褐色。雄花ハ稍小ニシテ。萼下ニ只二三ノ小片葉アツテ全花ノ下ニ居ス。花後種ヲナシテ實ヲ結ブ。林氏ハ五網二目ノ下ニ列シ且云ク根ニコンタラエルハノ香アリテ。下利祛痰利水ノ能アリ。附 全花雄花部大圖

オニミツバ トニ *Atractia major* 華 ホローテ *groote plantain* 蘭 オニミツバ *phacelia - nutkaii* 錫丹 オニミツバ *var. bicolorata* 錫丹

按此種全花ト雄花トノ二性花ヲ開テ殊性アリ。林氏ハ五網二目ニ取ルモノ種ナル如ク。故今假ニ取テ此



春宿根苗ヲ生。高二三尺有柄數葉ヲ互生ス。莖葉共ニ柔軟多液。葉心散狀ニテ扁。末
尖リ本クリコミ。邊縁不齊ノ鋸齒アリ。面綠色背淡。莖柄共ニ淡蒼綠色ニメ紅暈アリ。
葉腋枝ヲ分チ。秋梢葉腋ニ花梗ヲ出シ數梗ニ分レ。每頭花アリ。雌雄異株。雄花ノ
間ニ徑々雌花ヲ交ユ。花圓長四弁。二者大。二者小。雄者ハ。無萼ニメ花心ノ一莖細分
黃莖ヲ点綴シテ雄狀ヲナス。雌者。蒂三角形。萼實ノ如ク。上ニ花弁ヲ冠ス。雄花ニ
此スレハ差小。中心一柱三岐ニカレ。頭各又ミラ黃色。花梗ミナ粉紅海棠花色ノ如
クメ美ナリ。附 一雌莖 二雄莖

ハゴニア フクリンクワ *begonia obliqua* 一 雌莖
ハゴニア ハケイフデラーダフ *schubleria begonia* 二 雄莖



クワ井

慈姑

吾郷水田中ニ多ク植之。又溝瀆小河ノ中亦多ク生ズレド。本然ノ自生ナルヤ。種子ノ流レテ生スルニカ、ルヤ不詳。肥大ナルハ。葉柄高ク三四尺ニ及ブ。葉ハ未尖リ本ニツニ分レ。莖ノ状ノ如シ。莖間莖ヲ抽キ高サニ尺余。梢上一処ニ三花ヲ綴リ。數層ヲナス。又肥タルモノハ。下層ニ枝ヲ生シ花ヲ開ク。唯雄異花ニメ。雌者ハ下層。雄花ハ上層ニアリ。萼圓尖三葉。花白色圓尖三弁。雌者ハ。子室綠色。扁圓莢様ニ細刺毛ヲ滿布シ。雄者ハ。多莢ニメ大低二十余。短莖長莖莖色。二重ニ次シ。外者短ク内者長ク。中心ニ三角状ノ扁片十余ヲ簇生ス。蓋シ密槽ニカ、ル。鬚根ノ端圓塊根ヲ生シ。晚秋初冬ニ至テ採テ食料トス。皮色ニ青白ノ二種アリ。青者ハ形微ヤ長ク質微軟ニシ。味甘ク。白者ハ。形正圓ニメ質微ヤ硬ク味微苦ヲ帶ブ。啓蒙ニ塊根ノ有無ヲ以テクワ井方モタカノ二種ヲカツ。吾郷ニアツテハタゞ一種ニメ。無根ノオモダカナル品ナシ。姑ク他日ノ摘ヲ期ス

サギツタリマ

エドリス

pagitana

西勃氏

ナギツタリマ

サキツテホリア

pagitana pagitopolia

スミツブネチナク

ナルコイ

pitblala piktensis

按林氏書中ニ此品産地ニヨツテ葉ニ大小狭濶ノ異種アルヲ云。又淺泥中ニハ。根鬚様ヲナシ。深泥中ニ在テハ可食塊結。徑々掌大ニ及フヲ等ヲ云ハバ。吾々ワ井。ゴワ井等ノヲ惣テ云モノ、如シ



卷之三

三十九

平林堂藏



卷之三


平林堂藏

水田中ニ多ク自生ス。形クワ井ノ如クノ小高僅ニ二三人。葉細花亦稍小ニ。生植部ニアツテモ一般異ナシ。根塊ハ至テ小ニ。大ニモ無患子ニ起ヘス。小ナルハ豆粒ノ如ク。ソノ形ヲ訂視スバクワ井ト同シカラス。別種タルニ論ナシ。亦據テ專ノ食餌トス。一種草狀根形一般ニ。冬、花弁細小重複毬狀ヲナスモノアリ。花戸之ヲ八重オモダカ又クニガモツカト云。即チ本条ノ重弁ナルモノニカス。又據ニ従前所稱ノオモダカノ名ハ。サス処何ナル品ヤ未詳。或ハクワ井ノ花葉ヲサスノ名ナルト。若否ハ本条ヲサスナラン。本条ノ根塊至小ニクワ井ノ著キカ如クナラザルニヨリ。クワ井ノ根塊ナキモノヲオモダカナト云フノ説ニ違シ。尙識者ノ考ヲ俟ツ



山足池邊涯洲ノ処ニ生ス。全草ゴワ井ヨリ差小ニメ。葉尤狭細尖長ノ異アリ。花莖ニ於テハ一般異ナシ。秋冬ニ至テ。茎下鬚根ノ上ニ圓尖ノ扁片黒褐色ニメ尖アル細塊鱗次重疊シ。後分折シテ各々一苗ヲナシ。鬚根ノ端ニアツテハ。更ニ一塊アルナシ

按此品草形花状ニアツテハ。ゴワ井ノ族タル分明ナレ氏。根形ニ在テハ全ノ別ニ一奇態ナレハ。之ヲ同族ト断シガタケレ氏。本邦ニ於テ他ニ似類ノ品アルヲ不聞。西書中亦此族種ヲ載ルヲ見ザルヲ以テ。姑クコノニ列シテ期後考





ミクリ 黒三稜

止水或ハ小流中ニ生ス。葉蒲葉ニ似テ彼ノ多肉三稜
 葉間差ヲ抽クニ三尺。數葉ヲ五生シ頂頭球状花
 フ以テ穂様ヲナス。雌雄異体。雌者ホニアツテ矢抵三球
 圓柱上ニ麦粒状ノ實礎ヲ滿布ス。柱頭側ニ而テ眉ノ
 如ク。雄者ホニアツテ十許。亦圓柱上ニ無數ノ雄蕊アリ。
 短莖ニノ色淡黄。附兩葉郭大團

Pragaria nuttalliana 種

Pragaria nuttalliana 種

按此式ニ花様枝ヲ分クト不分明ノニ圖ヲ奉クワノ
 本条ノ如ク枝ナキモノニ *Pragaria nuttalliana*
 ガラス 又 プラタナノア
Pragaria nuttalliana ノ名ヲ下ス

水田中ニ生。葉狭長四五寸中三四分ニノ厚ク。黒三稜ノ質ノ如ク。數量簇生ノ心ヨ
 リ夏秋ノ際ニ莖ヲ抽ク。頂ニ三五花ヲツク。雌雄異体ニノ雄者四五分ノ
 梗上ニ一或ハ二花。或ハ梗上更ニ又分シテ一層ヲナシ。三四ヲ開クモノアリ。萼三
 片花三圓弁ニメ白色。莖ニ二十四茎ニノ短約黄色。雌者雄梗ノ本ニアツテ無梗多ク
 ハ一花。萼様圓球軟刺毛柱アリ

按 *Sagittaria peltata*、ノ属ナルベキモ種名未詳



タウコゴ

苧麻

春分種ヲ下シ、節高一丈余。莖直上枝ナク。圓ノ空洞竹ノ如ク、葉ヲ互生ス。大サ一尺余。形八角金盃ノ葉ノ如ク、七或ハ九ニ裂テ、屏止アリ。秋梢上或ハ節ニ對シテ花莖ヲ出ス。五七子。細梗上ニ花ヲ多ク。雌雄異テ、雌者上端者下ニ位ス。雄花ハ莖五片内ニ多ク、裂片ハワッテ、黄粉ヲ吐キ、唯花ハ葉三片子、空圓夾ニシテ、柔毛アリテ、紅色又頭ノ三柱ヲ出ス。後實ヲ成ス。三匹テ、三子アリ。形雲実ノ如ク、白黒ノ斑アリ。搾テ油ヲ採ル。油ニ燻下ノ性アルヲ諸書詳ニ述ベシ。世多ク其用ニ供ス。木邦ニ於テハ專ニ印色ニ合セ用ユ。



リシヌス

・コムムニス

羅

ゲメー子

ウランドルボーム

げんせ

ポルポルボーム

蘭



三十三
五木正茂

カラスウリ 王瓜

啓蒙所説形狀頗ル詳ナリ。雌雄異幹ニシテ夏葉腋ニ花アリ。雄花ハ短梗上筒様萼アリ長二寸餘。木細ノ末漸太ノ上縁五ノ爪様片ヲナス。花漏斗様ニシテ五裂。披針狀ニノ邊緣分裂纖細糸ノ如ク。雄蕊三莖筒腹ニ出。三葯相接ノ軸圓淡黄色ニシテ花心ヲ塞ク。葯狀一種ノ態アリ。郭大一葯圓等ヲ載テ其狀ヲ明ニス。雌蕊ハ長梗上ニ支粒形ノ裸子宮。上一寸餘ノ筒様萼アリ。花弁ノ形ハ雄花ト同ク筒裡ニ四ノ假雄蕊アリ。子宮上一柱頭三裂淡黄色ニシテ花喉ニ至ツ

第三種

ナリコサニヤムス
コロンリナ
コロムリフ
ハルアールム

Trichogonites culumensis 羅 *Konkumitz haarblau* 蘭


按瓜接王瓜ノ内熟レテ正當トセン余未能定記ヒテ後賢ノ決ヲ俟



キガラスウリ

枯樓

亦啓蒙ニ詳説ス故ニ略之。王瓜ノ一種ニシテ雌雄異幹。花形王瓜ト略同シケレドモ等
 彼ニ比スレバ差々短ノ萼葉細長。又花弁ノ形頭廣ノ兩ツニ大別シ。分裂糸様王瓜
 ヨリ差粗ニシ。殆ト洛陽花ノ形ノ如ク。柱頭三箇ノ形。王瓜ト異ニシテ圓細長ナル等
 ノ異アリ。雄莖ニ在ッテハ王瓜ト全ク同シ



キガラスウリノ花ノ形ハ王瓜ト略同シケレドモ等
 彼ニ比スレバ差々短ノ萼葉細長。又花弁ノ形頭廣ノ兩ツニ大別シ。分裂糸様王瓜
 ヨリ差粗ニシ。殆ト洛陽花ノ形ノ如ク。柱頭三箇ノ形。王瓜ト異ニシテ圓細長ナル等
 ノ異アリ。雄莖ニ在ッテハ王瓜ト全ク同シ

ツルレイシ ニガウリ

苦瓜

藤蔓諸瓜ヨリ小ニノ軟。葉略西瓜葉ノ如キ缺刻アツテ。六ナ三四寸。每葉類アリ。葉腋花ヲ生ス。梗長ノ細ク。中間ニ一小偏葉アツテ護之。花五裂大ナ六七分ニノ黄色。雄蕊三茎葯屈曲様ニノ。熟莢ノ如シ。瓜長三五寸。経ニ寸許。皮ニ疣瘻アリ。初緑色漸黄熟スレハ赤ヨリ開裂シ。内ニ指頭ノ如キ紅肉充満ス。每箇一枚アリ。形木鱉子ノ如シ。肉味甚甜シ。一種ナガレイシアリ瓜長一尺ニ余ル

第一種

モノモルナキ

バルサミナ


momordica balsamina 羅

バルサミナ

balsamita psinhibita 葡

モノモルナキ

按コノ条下ニ圖載スル。瓜哇ノ所謂 *Pappan* ナル者本邦西産ト全ク一般





絲瓜

方菱線條アリ。葉大抵五起。缺刻深フメ尖銳。糙澀ナレハ短毛刺ニモ胡瓜キウリ越瓜ウツリ等ノ如ク甚シカラズ。萼鐘狀五出ニメ尖リ。花壺ウツリ盛花ニ似テ黄色。雄花ハ莖五莖ニノ莖略屈索様ナレハ。他種ト一様ナラズ。雌花ハ株心一粒頭又形ノ三箇ヲ戴キ。柱本ニ淡黄色ノ尖頭ナル六小片ヲツテ之ヲ擁ス。子室長クノ指ノ如ク小。後瓜ヲナス長二八許。一種長ヘチマナルハ三尺或ハ五尺ニ及フト云

第四種

モモルチカ

ヒツバ

Momordica lappace.

ニゲルチカ

Cycloschiza longipes.

キウリ

胡瓜

葉大低五尖。南瓜葉ヨリ小。蔓ト共ニ短刺毛多ク。葉筒楯ニシテ狭長ノ五序ニ分レ。花
 鐘状五尖。形跡南瓜花ノ如クノ小。總ニ一寸許ニシテ黄色。緑子室圓長ニシテ刺毛ヲ載
 キ。細珠粒ヲ滿布ス。雄花ハ黄色杯楯ノ林心ニ一柱立チ。上又狀ノ三葯ニテ併接レ。
 雌花。柱上ニ三莖アツテ。上兩室狀葯ヲ以テ併合シ。頂ニ尖形ノ三序ヲ載キ。腹間ニ
 尖體ヲ三珠ナル等。名狀シガタシ。故ニ各々以テ大圖示之。此種瓜形ニ長クシテ短ク
 明。熟色ニ黄アリ白アリ。又脚葉腋ニ早ク雌花ヲ開キテ實ヲ結ブ等ノ多種アリ
 コロミス 番七鏡
Cucumis patulus 瓜 蔓子
guboru 荷 コムコメル
permomus 荷
 按阿須氏西載ノ兩莖ノ圖説ニ於テハ。余カ所撰ト符合セザルヲアレバ。春氏西物
 氏已ニ胡瓜ノ訳アレバ。疑ヲ容ルベキニアラザルヤ





シロウリ越瓜
學形胡瓜
綠尖頭黃樣之瓜(越瓜)

樣ナルト同キク。茎紫ノ刺毛胡瓜
同ク。葉背ニ密ク毛生シ。花微大テ中
頭胡瓜ノ如ク長ク。雄花ニ林縁扁
ナルニ茎五十。上ニ密状ノ黃粉ヲ以テ
得合ニ。頂ニ尖頭ノ三片狀開ニ軸圓
ノ三箇アリ。雌テ胡瓜雌存ニ葉ト
同ク。只取間ノ尖頭珠ト軸圓ノ異
アリ。ミニ。彼ニ存テハ雌トナリ。是在
大雄トナリ。若モ奇リ。謂フニ雌花
ハ五様ノ林心ニ柱立チ。上ニ壳様ヲ
頭五起ク一物ヲ戴キ。又殆ト雄
花ノ如ク在索様ノ黃粉頂ニ尖裂ク
一序アル起ノ玉茎ソノ林縁ニ立テ。
此即假長。今今全圖等ニ雌雄様ノ一茎ヲ合ワ
ト見セタ。昔ノ郡大圖ヲ以テ示之



Lucanella Composita. 春氏

三十九
三本并流

蔓柄短利テル。甜瓜ヨリ少クノ。莖葉更ニ甚シ。花亦甜瓜ヨリ潤大ニノ黄色。莖葉
 状ニノ差大ナリ。雄花ハ梗長ク。雌花ハ短シ。雄蕊ニ莖葉屈索状ニノ頭ニ火起。林心
 ニ三ツノ圓珠状ヲナシ。雌花ハ一柱ニノ頭ニ筒相接シ色黄緑ナル等。越瓜ノ莖ト
 同シ。マクハウリノ名ハ。我邦真束村ヨリ所出心上品ナルヲ以テ。普クソノ名ヲ称
 ス。此瓜各地所裁ニヨツテ形状大小一ナラス。皮ニ厚薄或變積ヲナシ。熟スレバ大
 低黄緑ナレト。或ハ上ニ緑道ヲナスアリ。肉白色或、淡黄緑等アツテ。味佳惡種々
 アレト。概シニ越瓜ヨリ小ニノ。味甜美香味凡ナラス。故ニ往々ソノ香ノ或弱ニ堪
 へザルモノアリテ。他瓜ト格別ナルノ殊標アリ。子ハ白色甜瓜子ト同シ

第五種

コラミス

ソノ

メトリン

コムコムソレ

Cucumis melo

melaen komkomis

甜







本草綱目 卷之二十一 瓜 平水堂



ヒノウリ
ミカンウリ
金烏蛋
草蔓タマゴウリノ如クナレハ差大ニ景差長ク刺毛更ニ多ク強ク恰モ白ウリノ如ク葶鐘様ニノ尖長五出花黄色形白ウリ花ノ如クナレハ大小丸裂シ雄莖ハ五莖或六莖葯屈索様ニノ頭尖裂シ花心ニ菊ノ如キ五六圓起アルアリ瓜扁圓ニノ小色淡黄緑味略甜瓜ニ似テ淡子形亦同

本草綱目 卷之二十一 瓜 平水堂

タマゴウリ コノウリ 銀瓜
 蔓^{全葉}ヒノウリヨリ小。葉ノ缺刻尖起ノ状相似レテ。差短ク刺毛少ク強カラズ。花
 五裂黄色。越瓜花ノ如ク差小。雌雄両葉ノ形色亦全ク同シ。瓜楕圓ニ小恰モ雞卵
 ノ如クノ小。白質淡黄暈ヲ帯。味頗ル苦ク不堪食。



葉蔓越瓜ヨリ更ニ大ニ葉尖或ハ鈍或ハ鈍。邊縁或ハ鋸齒或ハ尖起等一様ナラズ。實頗ル厚フノ毛ナク。蔓柄刺毛アレハ越瓜ノ刺ナルガ如ナラズ。花大ニノ黄色雄蕊三莖屈曲状ヲ以テ併合。卷傘状ノ如ク。雌蕊ハ四様柱心ニ一柱主チ。上三又ニ分レ各頭黄色ノ長筒状ノ如キヲ戴キ。頗ル雄蕊ノ形ニ彷彿タリ。瓜形ノ大小圓長扁楕圓色ノ淡緑淡黄褐赤。又斑駁アル等ノ多種アツテ各々林呼アリ。啓蒙已ニ數種ヲ載セ林氏亦多種物印氏十數圖アレバ。彼此的當ノ種アルベケレハ姑ク缺之テ期後日

第五種

Cucurbita pepo - 瓠 *poriparu kalabas* - 蒟



乙 甲



卷之三十一
三十一
平水大生草



卷之三十一
三十一
平水大生草



カモウリ 冬瓜
 蔓葉共ニ南瓜ノ如ク大ニモ多毛ナレバ剛強ナラズ。葉腋花ヲ出シ萼洞短葉状五分下支シ。花圓頭玉粒赤黄色ニシテ
 絲ハ花ノ如ク雄莖ハ長梗三四寸。莖ニ莖葉屬索。花ハ梗短ノ僅ニ四五分。擗圓種子室ノ上ニアツテ一柱。頭奇
 頭鈎状黄色ニ三箇聚ツテ帽毛鈎状ノ如シ。附雌雄花共去并見各莖本然圖
 乙 甲
 春氏

本草綱目卷之六 瓜類 冬瓜

本草綱目卷之六 瓜類 冬瓜

ヘウタン 胡蘆

葉略南瓜葉ノ如クナレバ。尖起微ニノ間。一尖ナルモアリ。邊縁尖頭齒起ナキニアラサレバ。至微ニノ端トナカク。葉蔓共ニ軟毛アレバ。糞渣ヲナス。其実ノ大小ニヨツテ草ニ大小花亦大小アレバ。大ナルモ五寸ニ不及。夕ニ開テ朝ニ萎。白色頗ル可愛。雄花ハ。莖ニ莖ニテ莖屈索状。雌花ハ。林心一柱上ニ又ヲナシ。每頭又分恰モ莖状ノ如キノ莖。共附木然郭大ニ圖明其状。一雄莖全形本然圖。二雌莖郭大圖。三雌莖全形本然圖。四柱頭一又郭大圖。

第一種

コホルビタ

Cucurbita lagenaria

雌

フレスフツク

Sychnochiton kalobas

菊

附物印滿氏鐸氏
其可載的當本邦
所産者五圖以示
種名

三寸トヤウタニ 壹蘆




縮圖

Cucurbita longa,
folio molli flore
albo

セロナリヒヤウタニ 二三寸胡蘆

コホルビタ
ロンカホリサ
モルリ
フホレ
アルホ



本然圖

コホルビタノナカフクハ
Cucurbita lagenaria
annularis

シヤクヘウター

Cucurbita
retorta
formis

懸輪

コホルビタノナカフクハ

縮圖



ナカフクハ 紙

Cucurbita
longa

コホルビタ
ロンカ



縮圖

bract of pinn
strobilium caud
nodosa



縮圖

クモアルフクハ

ナカフクハ
ナカフクハ
ナカフクハ




溝畔湿地ニ多ク。方莖細蔓。卷鬚ヲ以テ物ニ纏フ。葉有柄五生。形玉瓜葉ニ似テ小ニ
 ノ長ク。微ニ三五起ヲナシ。周縁鋸止様ニ細起シ。各尖瓜様ノ細白点アリ。秋葉腋細
 莖ヲ出シ。穂様ニ多花簇生ス。萼尖長五片。花五弁。本卯圓ニノ未尖長。共ニ淡黄緑白
 色ニノ殆ト十弁花ノ如シ。雌雄異花。雌者ハ梗尤長クノ蒂アリ。鐘鉢ニノ瘡痕アリ。
 子室推子状。結頭二裂。五假莢アリ。後實ヲナシテ下垂ス。形枣ノ如クニノ尖リ蒂ト
 相半ス。熟ノ蒂ト分レ。内ニ苦瓜子ノ如キ黒色ノ核。二或ハ一又三ヲ収ルアリ。雄者
 蒂ナク柄上直ニ花ヲ兼ケ。花心ニ五雄莢ヲ立ツ。蒴緑色ニノ白粉ヲ吐ク。附雄花
 花子室蒂亦郭大圖

其族未考
 已下二種莢状十日ニ正當ナラザレ氏姑附于此宜再考



前奈同処ニ生シ。草亦相似タリ。葉形五起アレシ。殆ト三角ニノ鋸齒アリ。質軟ニノ微毛アワテ粗澁。晩夏毎葉腋ニ一寸許ノ二細梗ヲ出シ。各頭一花ヲ開ク。一ハ雄一ハ雌。萼鐘状ニノ細長五尖アリ。花輪根五裂白色。雄者ハ三莖扁圓柱ニ起リ。葯ヲ花喉ニ出ス。形ハ様ニノ黄粉ヲ吐。雌者ハ子室麦粒状ニノ扁圓柱アリテ一柱。頭淡紅色ニノ三起アリ。後実ヲナス。圓尖熟ノ白色内ニ卵圓ニノ尖リタル褐色ノ薄扁多子ヲ収メ。附一雄莖ニ柱

其族耋考



和名本種

其族大種



一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十


二十二細 有雄本雌本
ハウレンサウ

菰稜菜

春秋分ニ種ヲ下ス。葉一根ニ叢生シ。形末尖リ本左右一二尖ヲ出シ。肥厚淡綠色。莖高一二尺三角形葉ヲ互生ス。三四月ノ際。葉腋細莖ヲ出シ花ヲツク。雌雄異幹ニノ雄者ハ。花細碎簇々雜沓シ。一見只葯ヲ見テ花形ヲ詳ニシカタシ。細ニ檢レハ卵形綠色ノ四弁アツテ。長ク四雄莖ヲ出ス。葯持ニ綻ヒトスレバ。淡黃白色或ハ帶紅。開テ淡黃粉ヲ吐ク。雌本亦葉腋ニ花ヲ簇生スレバ。雄花ノ如ク雜沓セズ。三五聚リツキ扁ニノ略舟形ヲナシ。中心突起僅ニ開哆シ。四ノ白色針柱ヲ出シ。已ニノ兩尖銳銳利様ヲナシ。莢實或ハ蒴刺子ノ如キニ至ル。附 一雄花 二雌花 三莢熟實

共郭大圖

所属未詳




五十一
平木全成

草形啓蒙評説ニ衆亦可普知故ニ畧之。雌雄異幹ヲ葉狀ハ別ナク。莖花アリ。雄者枝梢ニ分又多穂ヲ
 ナス。莖ヲ五裂殆ト花存ノ如ク。淡緑白色ヲ微々紅線條アリ。莖五葉纖細ヲハ幼蟻ル火ヲ下垂シ。色淡緑破綻ノ淡
 黄緑彩ヲ出ク。雌者梢頭ニ圓体ヲ發生ス。諦視スルニ即チ苞ヲ以テ子殻ヲ包ム。苞頭夫鏡腹披テ褐色ノニ
 線柱ヲ出ス。一類毎ニ一蒂三葉ノ一柄及ヒ針狀ノ一葉アリテ護之。故ニ只重々層々何レカ長何レカ葉ナルコトヲ認
 メガク。ソノ差熟ルニ至ツテ折ク實タルコトヲ存ス。是以雌中無花ノ説アルニ至ル。蓋シ穀類ノ子室ヲ別ニ分ツテ
 假ニ異家トナト見バ。ソノ折然タリ一種葉形花同フ。蓋シ長大ニ高ニ大余ニ及ブモノアリ。蓋シ晚種
 ナルケ以テ下地スルコト十日モ晚ク刈取亦一月モ晚ルト云。邦俗之ヲ孰後ツト稱シテ早種ニ分ツ。又此種ハ刈挂テ蒸
 シテ皮ヲ剥ク以テムシソノ名アリ。ソノ下品ニノ只粗大ノ索又專ラ民屋席ノ索用ユ。余近隣岩手村ノ農夫
 某一日大麻ノ根苗ヲ取テ多ク啖フ。食者ミナ母醉昏冒スル半日或ハ一日許ニ漸醒覺ヒリ。何須氏
 云草味美ナラザルコト有毒草ノ味ノ如シ。或云之ヲ食料ニ充ツ。或ハ云不可食ト。邦人云ヨク男精ヲ増シ生
 殖ヲ助ルノ功アリ。又云人海飲食之ニ害ナシ。子ハ油様ノ粘液アリテ緩ク利尿シ。又如茶浸出尿道ノ痰ニ
 用ユ。

附雄花ニ雌花ニ割苞露子并莖共郭大圖

第一種 *Cannabis sativa* 雌 雄 *Thamne hemip*



啓安所記形状可見。茎線稜アツテ方稜。上ニ短鈎刺アリ。葉柄ホ然リ。葉ニ毛短刺モテツテ粗糙ス。雌雄異幹ニシテ雄者。夏秋ノ際葉腋ニ莖ヲ抽ク。一尺許。葉ヲ互生シ。葉腋毎ニ一花莖ヲ對生シ。長者二三寸分又シテ短梗花ヲ簇生下垂ス。萼披針狀ニシテ五裂五花弁ノ如ク。色淡黄ニシテ背ニ紫暈ヲ帶フ。萼五裂。萼筒様淡黄色ニシテ黄粉カ吐ク。雌者。花莖頭ニ簇生スル。一カラハナサウノ如ク。鱗形苞内ニ子室ヲ有シ。圓ニノニ柱。柱初ノ白色後紫褐ニ變シ。中ニ硬殼扁圓子ヲ收ム。附一雄花。二實礎共柱共部大圖 三熟子

按次条ノ一種ナレモ西書中此種ヲ説クヲ未見



カラハナサウ

葎草一種

北國山中往々コレアリ。藤蔓長ク延キ葉對生形心截狀ニノ夫リ。或ハ三尖起リナ
 シ鋸齒頗ル粗シ蔓葉柄ニ短刺モアリテ。葉被刺アルト葎草ノ如ク。雌雄異花形
 等亦略葎草ト同ク全ク同一族ニノタ、葉不同ノ差異アル一種ニカ、ル主用糸
 鏡ニ載ス。ウノ缺ルヤ葎草ヲ代用スベシ

Humulus lupulus

Humulus lupulus



五十四
 平水主茂

叢樹竹林中ニ多ク。葉山菜ニ比スレバ闊短ナルドコロニ比スレバ尖長セ或ハ丸ノ縫道アリ。葉脈珠根ヲ生スルコト。山菜ト同シケレバ形長カラスレテ瘡痕アリ。雄者葉脈一茎三四寸ニ多枝又ワ分チ有梗花ヲ以テ穂様ヲナス。花被鈍頭披針狀六出。色淡黄純白ニシテ六葉。葯淡黄。雌者ハ花枝ニ亞又ナク。無梗花ヲ以テ疎穂ヲ綴ル。種子室軸様ニシテ三枝一柱頭三裂。別ニ假葉ヲ添フ。後葉ヲナス形山菜ノ尖ノ如ク。内ニ扁子アリ根ハ横延形生姜或ハ菘菜ノ如ク。硬ノ表暗褐裏黄色ニシテ味苦ク食フニ佳ナラス。此種下条ニ比スレバ葉差尖長根亦横延ナルヲ以テナガドコロノ名ヲ下シテ別之。附一雄花ニ雌花共部大圖

Biolonia septimiloba 春氏 西勃氏

按林氏 *Tomus castica* 羅 *Kudryga thurina* 蘭ノ下ニ春氏ノ腊葉ニ由テ

日本種ノ雌雄ニ品ノ圖ヲ載ス。檢之ニ雌者ハ常種ノトコロ。雄者ハ蘭葉ノ品ニシテ花茎ニ枝又チキノ異アルノミ。由之觀之ハ林氏春氏所見同シカラズ。後賢宜考




五十五 草木全書

吾郷邊藪林中ニ多ク生ス。葉略前条種ノ如クナレ氏。多クハ扁圓ニメ微ク尖リ。縦脈十一
 ヲ常トシ小葉ニアツテモ大抵九ニノチガドコロノ九或ハ七ナルト同シカラズ。葉脈二三
 ノ細茎ヲ一処ニ出ス。長ニ三寸。徑々二三枝ヲ分叉シ。各無稜花ヲ以テ穂ヲナス。弁
 大小六片。形ナガドコロノ花弁ヨリ微ク尖長。初メ白色漸ク暗紅。老テ暗紫ニナル。

根圓塊多鬚大々拳ノ如ク。肉色
 白ク。味苦ケレヒチカトコロノ如ク
 甚シカラズ。余未檢唯花故ニ姑ク缺
 之

附金花並雄莖部大圖





五十七

五十七



菊葉トコロ 山草辭一種 已下二種共ニ雄本ニカ、ル

五十七

五十七



卷之三十一

草木部




山草部一

卷之三十一
草木部

ヤミノイモ ジ子シヤリ 野山藥

薯蕷ノ類ミナ藤蔓草薺ト同シク。葉形亦略同シケレド。對生シテ草薺ノ互生ナルト不同。又雄花ノ莖トテモ枝ヲ分クザルノ殊標アリ。本条ハ山中自生ノ薯蕷ニノ葉形不一レド。概ルニ家生ニ比スレバ稍長クノ岬起大ナラズ。零金子ノ形圓長ニノ珠塊ノ状ナラズ。根細長數スニ及ブ。ソノ根色ニ白ト。帶赤トノ二種アリ。白者ハ粘滑強ク味亦勝ル。花形菱状大抵ミナ同シ

ガリスコニア ヤガニガ
Liancaula japonica ヤミノイモ 薯蕷春氏



薯蕷ノ類

五十九

平水全表

ナガイモ

家山藥

家植薯蕷ノ義ニノ。自生ノ者トハ別種ニノ。ツノ族ニ種々アリテ根形一ナラズ今
 扱ノ共ニヤマノイモト稱スレド。ツノ根形ニヨツテ。ナガイモ。ツク子イモ。ダイコ
 クイモ。キ子イモ。イテウイモ。エドイモ等ノ名アリ。葉形花状亦各々殊標アルベキ
 モ。余未タ檢別セズ。葉腋ミナ零余子ヲ生ス。多クハ圓塊ニノ。ジ子ンヂヤウニ生ル
 長キカ如クナラス

身八種

ナラヌモア

マホシキホリア

ppolytipolia. ノ名ヲ掲ケラツ

按前条ノ一種ニカ、ル。春氏

ク子イモノ名ヲ下ス當否イカ、



葉莖共ニトコロニ似テ更ニ大葉形ナルトヨク葉ヲリ微長ナガドコロヨリ
 闊大ニメ。縦脈大抵九道。蔓上ノ珠根右大ニア圓ク。大ナル袖粟子ニ起ヘ根ハ
 大圓塊ヲナス。共ニ培養シテ食フニ味苦カラス。俗間云。食之ハ壯年ノ
 白髮ノ里變ヌキ。花莖未據缺之

黄獨 *Scopolia japonica* 根 赤武町定
 黄獨 *Scopolia japonica* 根 赤武町定



原野ニ生ス。草茎共ニ五爪龍ニ似テ小ニノ軟。色深緑ニノ紫ヲ帯ヒス。葉面花ニ背
 脉上ニ微々軟毛アリ。秋ニ至テ葉腋細茎ヲ生シ。又分レテ多細花ヲ結ル。葉鐘状五
 出。花五弁。々尖細長ニノ淡黄緑白色。此種雌雄異幹ニノ。雄者。花心ニ淡黄五約アリ。
 雌者ハ。花心。實礎ヲ見ル。扁圓ニノ三起アリ。各頭ニノ爪様柱ヲ出ス。後圓實ヲ結ブ
 附 一雄花全状 二等 三雌花全状共部大圖



ヤマアサギ

百品考ニ大青ノ考アフトテ形状ヲ詳ニ見。葉而長。背脈上ニ味。纖細毛アリ。每葉腋
 鱗形ノ小托葉アリ。早春葉腋毎ニ一二寸ノ花莖ヲ出。數花一処ニ簇生。數層互生シ
 穂状ヲナス。一葉下ニ尖卵形ノ一苞。披針状ノ數苞アツテ。十數ノ短梗花ヲ出ス。花
 被大ク二分許。弁指圓ニノ三裂殆ト三弁ノ如ク。色淡黃綠白。多雄莢。大抵ニ
 弁外ニ溢ル。約双珠形ヲ淡黃彩ヲ吐ク。此品雄雄異幹ニ。雌者梢葉腋毎ニ出シ。又ヲナシ。
 每頭一花。花被鱗様。三片。子室圓扁ニ筒併接シ。形椒實ノ如ノ扁。色深綠。二柱眉ノ如ク
 兩方ニ開キ。綠色ニノ頭白色。形雞冠ノ如シ。又ニ假莖アリ。色亦深綠。阿須氏云。性塩氣ア
 リテ大便ヲ通ルヲ以テ。水鏡劑ニ用ユ。又月經ヲ催進スルノ功アリ。又地方ニアツテハ之ヲ
 蔬菜ニアテ。食料トナス。附一雄花ニ雌花共部大圖

第三種
 ノルニヨリリス
purshianalis
 アシタヤ
annalis
 イマアサギ
gaurhyke
dingulkrani



六十三
 平木全載

第二十三綱 有雄花雌花雌雄兩全花
シエロナウ 蕙蘆 蕙葉蕙蘆

往々山中ニ生。伊吹山右モ多シ。春芽ヲ出シ數葉叢生シ。長一尺餘潤一二寸。夏月葉
間莖ヲ抽ク。二三尺小葉ヲ五生シ。上ニ枝ヲ分チ穂ヲナシテ花ヲ開ク。無葉六弁
々本厚ク末薄クメ紫黑色。子室三箇相接シ。頭外及シ。雄蕊六ニメ。約黃粉ヲ吐ク。此
種三性花ヲ交ヘ開ク。パイライサウト同シ。根形亦同シケレバ此種ニハ黑色標
毛ノ如キアツテ多ク根上ヲ包ム。一種花綠色ナルアリ又一種小ニメ尺許ナルア
リ或云白花ホアリト余未見 附全花部大圖

第二種

Stachys nigra

Stachys japonica

Stachys chinensis



六十四
平林山土蔵

深山ニ生。春早ク發芽シ茎三四尺ニ及ブ。葉莖葉ニ似テ大ニ。莖ヲ色トテ互生。莖頭枝ヲ方ナ穂ヲナシテ花ヲ細ル。無葉ニノ卵圓六弁大六七分。色淡黄白ニノ綠軍並ニ黄緑ノ條脈アリ。子室シニコサウト同フノ稍長ク。雄莖六ニノ葯黄色。亦金花雄花雌花ノ三性ヲ交ヘ開ク。主用載葉鏡藎蘆下 附兩莖郭大岡

第二種

Arctostaphylos alba . var . *Arctostaphylos nivalis* . var .





草木圖考卷二十

コバイケイ 蘇菘葎一種

前条ノ一種ニノ莖高二尺餘。葉稍狭小ニノ長ク。花同形ニノ亦差小。白色ニノ背ニ
 微綠暈アリテ綠條ナシ。ソノ穂本ノ枝花ニアツテハ。多クハ五弁五雄莢ヲ交フ
 按前条ノ一種西書中未見此種

草木圖說前篇卷二十



慈齋飯沼先生著

草木圖說 全部凡四十冊

前帙草之部廿冊木之部十冊後帙草木之部

大日本平林莊藏板



草木圖

尾州名古屋本町通七丁目

永樂屋東四郎

芝齋繪影夫主普

三部

江戸日本橋通一丁目

同 日本橋通二丁目

同 芝神明前

同 浅草茅町二丁目

同 横山町三丁目

大坂心齋橋通北久太郎町

同 心齋橋筋安土町

同 博労町

同 安堂寺

同 南久太郎町

京都鉄屋町通姉小路上

同 三條通高倉東江入

書物

須原屋茂兵衛

山城屋佐兵衛

田屋嘉七

須原屋伊八

和泉屋金右衛門

河内屋喜兵衛

河内屋和助

河内屋茂兵衛

秋田屋太右衛門

伊丹屋善兵衛

俵屋清兵衛

出雲寺文治郎

問屋

